

벨리노정

(방풍통성산건조엑스(4.6→1))

KGMP
우수약품지정업체

I-00

※ 이 문서는 이 약을 사용할 시에 필요한 주의사항을 기재한 것으로 이 약과 같이 보관 하십시오.

일반의약품
분류번호:219

벨리노정

(방풍통성산건조엑스(4.6→1))



Belyno Tab.

【원료약품 및 그 분량】 1정(470.29mg) 중

- 유효성분 : 방풍통성산건조엑스(4.6→1)(별규) 237.5 mg
- 첨가제(타르색소) : 황색203호(알루미늄레이크)
- 첨가제(동물유래) : 유당수화물(기원동물 : 소, 사용부위 : 우유)
- 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜신나트륨, 콜로이드성아산화규소, 폴리메틸렌글리콜6000, 히드록시프로필셀룰로오스, 히프로멜로오스

【성상】 노란색의 원형 필름코팅정

【효능·효과】 배에 피하지방이 많고 변비가 있는 환자의 다음 증상 : 고혈압의 동반증상(두근거림, 어지러움, 흉조), 비만, 무기, 변비

【용법·용량】 보통 성인 1회 4정을 1일 3회 식전 또는 식간(식사때와 식사때 사이에) 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성이 약에 함유되어 있는 대황의 자궁수축작용 또는 골반내 장기의 충혈작용에 의해 유·조산의 위험이 있다.)
- 2) 수유부(이 약에 함유되어 있는 대황 중 인트라퀴는 유도체는 모유 중으로 이행되어 영아에게 설사를 유발할 수 있으므로 수유 중에는 약물복용을 금하거나 수유를 중단한다.)
- 3) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이 약을 복용하고 있는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

다른 설사약

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.

- 1) 고혈압 환자
- 2) 심장병 또는 신장병(신장장애) 환자
- 3) 부종(부기) 환자
- 4) 고령자(노인)(일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 주의할 것.)
- 5) 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고 있는 환자)
- 6) 설사, 묽은 변의 증상이 있는 환자(증상이 악화될 수 있다.)
- 7) 위장이 허약한 환자(식욕부진, 위부불쾌감, 묽은 변, 복통, 구역, 구토, 설사 등이 나타날 수 있다.)
- 8) 식욕부진, 구역, 구토의 증상이 있는 환자(증상이 악화될 수 있다.)
- 9) 병후의 쇠약기, 현저하게 체력이 쇠약해진 환자(이상반응이 쉽게 나타나고 그 증상이 악화될 수 있다.)
- 10) 땀이 많이 나는 환자(땀 과다, 전신탈력감 등이 나타날 수 있다.)
- 11) 협심증, 심근경색 등의 순환기계 장애가 있는 환자 또는 그 병력이 있는 환자
- 12) 배뇨장애 환자(질한 및 증상이 악화될 수 있다.)
- 13) 갑상선기능항진증 환자(질한 및 증상이 악화될 수 있다.)

- 14) 지금까지 이 약에 의한 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등을 일으킨 적이 있는 환자
- 15) 당뇨병 환자(마황(에페드린 류)에 의해 글리코겐의 분해가 촉진되어 혈당이 상승할 수 있다.)

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우

- (1) 위알도스테론증 : 요량이 감소하거나, 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나, 두통 등(1일 최대 배합량이 감초로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고임), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로 관찰(혈청칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.)
- (2) 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.
- (3) 소화기계 : 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 복통, 설사 등
- (4) 피부 : 발진·발적, 가려움 등이 나타나는 경우
- (5) 자율신경계 : 불면, 땀 과다, 빠른 맥, 소변을 자주 볼, 두근거림, 전신무력감, 정신흥분 등
- (6) 비뇨기계 : 배뇨장애
- (7) 간기능장애, 황달 : AST, ALT, ALP, γ -GTP 등의 상승을 동반한 간기능장애(전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띄게 됨))가 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.

2) 1개월(변비에 복용하는 경우 1주) 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 장기간 계속하여 복용하지 않는 것이 원칙이나 부득이 장기간 계속하여 복용할 경우에는 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.
- 2) 자극성 완화제는 장기간 계속 복용시 약물에 대한 내성이 증가하고, 변비가 악화될 수 있으므로 1주 이상 계속 복용해서는 안된다. 만약 매일 변비약이 필요한 상태라면 원인을 조사하여야 한다.
- 3) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 대황의 사하작용은 개인차가 있으므로 용법·용량에 주의할 것.
- 4) 다른 한약제제 등과 병용(함께 복용(사용)) 투여할 경우 함유 생약의 중복에 주의해야 한다. 대황 함유제제와 병용투여 시 특히 주의할 것.
- 5) 마황 또는 에페드린 함유제제, MAO 억제제, 갑상선제제(티록신, 리오치온), 카테콜아민제제(에피네프린, 이소프레날린), 크산틴계제제(테오필린, 디프로필린)과 병용(함께 복용(사용)) 시 불면, 땀 과다, 빠른맥, 소변을 자주 볼, 두근거림, 전신무력감, 정신흥분 등의 증상이 나타나기 쉬우므로 감량하는 등 신중히 복용할 것.
- 6) 칼륨함유제제, 갑상선유제제, 글리시리진산 또는 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 티아지드계 이뇨제(트리클로르메타이아지드)와 병용(함께 복용(사용))시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용할 것.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것(사용 후 반드시 밀폐 보관할 것.)
- 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 3) 의약품용 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 500정 / 병

【소비자상담실】 080-597-1020

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염 또는 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 기타 자세한 의약품 정보는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(nedrug.mfds.go.kr)을 참조하시기 바랍니다.

【제조(의)자】 (주)아미달제약, 인천광역시 남동구 함박로 316 17B-2L

【제조자】 코스맥스(파마)주) 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 168-23

문서개정일 : 2019.02.15