

KKSU 의수제약(주)	
자재명	엘도르 캡슐 설명서
규격	138×175 mm
접지규격	35×35 mm
인쇄도수	1도 K100
작성(수정)일	2025.06.05
기타	텍스트-7pt 이상 / 모조지 70g

▶ 접지 후 모습



30캡슐/병 300캡슐/병



엘도르 캡슐
(에르도스테인)

KKSU 의수제약(주)

엘도르 캡슐 (에르도스테인)

Erdor Cap.

일반의약품
분류번호 222

【원료약품 및 그 분량】 이 약 1캡슐(394mg) 중
유효성분: 에르도스테인(별규) ······ 300,0mg
첨가제(타르색소): 청색1호, 황색203호
첨가제(동물유래성분): 캡슐제 중 젤라틴(기원동물:소, 사용부위:가죽 내피, 기원동물:돼지, 사용부위:껍질)
기타 첨가제 : 상 · 하부 연녹색 경질캡슐, 스테아르산마그네슘, 콜로이드성이산화규소, 크로스포비돈, 포비돈

【성상】
흰색의 분말이 들어있는 상, 하부 연녹색의 경질캡슐제

【효능 · 효과】
급 · 만성 호흡기질환에서의 점액용해 및 거담

【용법 · 용량】
성인: 에르도스테인으로서 1회 300mg을 1일 2~3회 경구투여한다. (먹는다, 복용한다)
급성 호흡기질환에 투여 시 연속으로 10일 이상 투여하지 않는다.

【사용상의 주의사항】
1. 다음 환자에는 투여하지 말 것
1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응이 있는 환자
2) 간경변 환자와 시스타티오닌 합성효소(cystathionine-synthase) 결핍환자(이 약의 대사물이 메티오닌 대사를 방해할 수 있다.)
3) 소화성궤양 환자
4) 중증(심한 증상)의 신장(콩팥)장애(크레아티닌청소율이<25 mL/min) 환자
5) 중증(심한 증상)의 간장애 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것
경증(경증상, 가벼운 증상) 및 중등도 간장애 환자(이 약으로 인한 이상반응의 증가는 관찰되지 않았으나 이 약으로서 1일 300mg을 초과해서는 안 된다.)
3. 이상반응
1) 사용량보다 과량투여(1일 1200mg이상)시 발한(땀이 남), 어지러움, 홍조가 나타난다.
2) 신경계 : 두통
3) 호흡기계 : 감기, 호흡곤란
4) 소화기계 : 미각이상, 구역, 구토, 설사, 상복부통, 복통(배아픔), 속쓰림

5) 피부 : 두드러기, 홍반(붉은 반점), 습진

6) 국내 시판 후 조사결과(조사종례수 : 캡슐제 3,303명, 시럽제 791명) 보고된 이상반응은 다음과 같으며, 이 약과의 관련 여부는 확실하지 않다. : 피로, 소화불량, 복통(배아픔), 위장장애, 설사, 구토, 두통, 신물이 올라옴, 결절홍반, 심계항진(두근거림), 얼굴부종(부기), 전신부종(부기), 가려움, 무력감, 몽롱함, 발진

4. 상호작용

거담제(가래약)는 기침약과 병용(함께 복용(사용))투여 시 기침 완화에 의한 기관지 내 가래 배출 곤란으로 기관지감염의 위험을 높일 수 있고 기관지 연축(뒤당김, 수축)을 야기할 수 있으므로 특히 주의한다.

5. 임부 및 수유부에 대한 투여

동물실험에서 수태, 태자의 배자발육과 또는 산후 발육에 대해서 어떤 직·간접적 유독성은 발견되지 않았으나 임신 중 또는 수유중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.

6. 보관 및 취급상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지 면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【포장단위】 30캡슐/병, 300캡슐/병

【부작용보고】

678-IS-02-250604

본 의약품은 KGMP적격업체에서 제조하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 경과 되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 보상받을 수 있습니다.

※ 2025년 06월 04일 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

※ 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하여야 합니다.

※ 사용기한이 지난 의약품은 사용하지 않도록 합니다.

※ 사용 전 반드시 첨부문서를 확인하시고 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 의약품 부작용 발생 시 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)에 피해구제를 신청할 수 있습니다.

【제조사】 **DASAN**  (주)다산제약

충청남도 아산시 도고면 덕암산로 381

【제조의회사】 **IKSU**  **익수제약(주)**

경기도 광주시 곤지암읍 독고개길86번길 38, 42
일부(보관소) / 02-416-1112~4 / www.iksu.co.kr