

## 가스모사® 씨알정

**GASMOSA<sup>®</sup> CR Tabs.**  
(Mosapride citrate)



【원료약품 및 그 분량】 '질 중

- 주요성분: 모사프리드시트르산염수화물(P) 15.87mg
- ※ 첨가제(중량률 기준): 유당(수화물, 소, 우유)
- ※ 기타첨가제: 경질화제, 구상제, 미감정생물유, 스테아르산가그네솔, 오메타-이탄색(CY-C-7000A), 저지한도이드로시발달소포, 포비돈, 히프크로멜로오XY2208, 히프크로멜로오XY2010

【성심】

## 흰색의 디원형 서방성 밀음코통정제

【효능·효과】

기능성 소화불량으로 인한 소화기증상(속쓰림, 구역, 구토)

【용법·용량】

성인: 모사그리드시트르산염무수물로서 1일 15mg, 1일 1회 경구투여한다.

이 알은 시방성 제지이므로 분수거나, 분해하거나 또는 씹어서 먹음해서는 안되며, 성제 전자를 삼켜서

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 부유하지 않 기.
0. 1억은 유당을 흡수하고 있으므로, 갈락토스 불내증(galactose intolerance), 락포 유당결핍증 결핍증(lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토스 흡수장애(gucose-galactose malabsorption) 등의 유전적 원인이 원인이라고 생각된다.
2. 이상발생
- 1) 오시미리치 피하조직 시정, 정상 이상발생  
기능성 소화불량 환자 33명, 38명 이상으로 한 무작위배정, 이중맹검, 횡단적, 병행 이상발생 시험에 총 12명의 환자에서 이상발생이 발생하였고, "빈혈"은 두 그룹 간의 비율에서 13.24%(9/68), "0.2" 대조군(9.38%)에서 4.29%(3/70), 3.24로 스스 다. 시험과 대조군 모두에서 중, 중, 이상발생은 보고되지 않았다. 이상발생의 인과관계는 배제할 수 없는 이상발생은 발현을 추적한 결과 시험군에서 2.94%(2/68), 2.71로 실시, 오시미리치 14.7%(1/68), 12.7%로 비교되었고, 대조군에서 보고되지 않았다.
- 2) 오시미리치 피하조직 시정, 일반적 및 3% 부위에서 보고된 이상발생  
998로 40.4%(20.4%)에서 이상발생이 나타났고, 주요한 이상발생은 설사, 연변(18%), 구강(0.5%), 내장(0.3%) 등이 있다. 이상발생이 없는 792로 30.3%(3.8%)에서 이상발생이 보였다. 주요 내용으로는 호산구증가증(1.1%), 홍시증의 증상(1.0%), AST(GOT), ALT(GPT), ALP 및 γ-GTP의 상승(각 0.4%)등 있다.
- 3) 중화한 기능성 소화불량 환자(0.1% 이하)  
국립기관, 기능성 소화불량 환자(0.1% 이하)  
미국인, 한자민, 아시아민, ALI, GPT, γ-GTP의 상승 등을 동반한 심각한 간기능장애, 황달이 나타나는 경우가 있고, 사망에 이르게 된 것으로, 증상은 관찰하고, 33명 확인하는 경우에는 즉시 투여를 중지하고, 적절한 치료를 실시한다.
- (2) 기타 이상발생  
대단중, 만성 투여하기 때문에 증후  
합계: 때때로 호산구증가, 백혈구감소

소와기개: 꼭두방안간, 구멍마네(호)와 입술을 꾸민, 때때로 술사, 연변, 구걸, 곡물, 구역, 구토, 디지 이상,  
간질, 때때로 시나위 상술, 벌리꾸민 상술,  
소원기개: 때때로 신계상진  
장산산경개: 때때로 여자러울, 휘청기름, 동통,  
가타: 딸들, 괴괴로 권태감, 중독자발의 상술

- 가) 코리안 디스토피아 영화와 전지현의 (38 목욕)이 다시 한번 추진 결과  
 코리안 디스토피아를 위하여 1980 년대 동안 745편을 대상으로 실시한 조사 결과 사용성적지수-결과 이상현상의 발견률들은 인간관계 여부와 상관없이  
 0.99%(1/745)에 불과하였다. 이 중 이 영화 관련결과만을 분석한 것으로 보면 전체는 1.34%(10/745)에 해당한다. 이상현상은 인간관계 여부와 상관없이  
 이 작품, 실시자, 시대, 문은 전 3개, 50%로, 평균결과(소수발생, 유능상대, 권력, 발전 지) 태고로 나타났고, 이 중 시간적 일상상대성이 나타난  
 지 않았던 새로운 이상현상으로 소수발생 유능상대성 지-역적 불균형 지수
- 다) 코리안 디스토피아 영화와 전지현의 (38 목욕)의 다른 자매작 이상사태 부각지수(1980-2013)를 분석한 결과, 0 상관계수가 70%를 다른 요인들  
 전체 발현한 이상사태에 비해 유의하게 많이 보고된 이상사태는 '괴롭힘'과 '갈등'이 많이 나타났다. 다만, 이로써 결과 형성률과 괴롭힘 0 상관계  
 간에 연관관계가 입증된 것 외의는 것은 없다.

1. 일반적 주의  
가) 온도상승(보통 2주) 후에야에도 소하관 중심의 개선이 보이지 않을 경우 상기관 투여하지 않는다.  
나) 온도를 잘 관리하여 이 약을 복용하면 0 역의 성공률까지 상승할 수 있으므로 급증시 투여한다. 고지혈치수 시 약을 일일 점과 급증 후에 더 비싸며 Cmax AUC와 CAUC가 78%, 39% 증가하였다.
2. 상호작용  
중요한 소하관운동촉진성작용은 콜레스테롤 상승과의 관련성으로 인해 할랄리핀(캅스타트론), 브롬화투르스콜라민 등)과 병용 투여시 이 약의 식량 및 흡입술 사용에 있어 특별한 경각을 두는 등 병용여 주의해야 한다.
3. 알부민 및 수용체와 대한 투여  
알부민 또는 다양한 기능성이 있는 부위에는 체질의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.(임종 중요 투여에 관한 안전성이나 확인되어있지 않다.)
4. 주요 중독에 의한 증상 피하고, 부작용인 경우에는 수유를 중단한다.(실질중독에서 무효중독의 차이가 보고되어 있다.)
5. 소화제 대한 투여  
수어 들어 내장 간섭소 해독되어있다.(사우저는 없다.)
6. 과점지에 대한 투여  
환자적으로 다른 자에서는 신기능, 간기능 등의 생리기능이 저하되어 있으므로 환자의 신기능을 관찰하면서 신중히 투여하고 이상반응이 발생후 경우에서는 감량해, 미사탈피드리스티비분무제로부터 1.5mg/ml라는 농도 실험한 처방을 한다.
7. 보충 영양소와 주의사항  
1) 인산염의 소비 정도는 많은 것은 도출할 것  
나 다른 물기에 바꾸어 넣는 것은 사료발효되거나 곰팡이생성하면서 나열되지는 않았으나 이를 주의할 것
8. 기타  
설치법에 적정분량(평균의 100-300배)(30-100 mg/kg/일)을 장기간, 경우투여한 시점(최대 104주, 비우스 92주)이며 종착(간세포손상 및 간세포 손상(총합) 발생률이 상승이 나타났다.

【저장방법】 밀폐용기, 실온보관(1~30℃)

【포장단위】 300성/병, 30성/병, 10성/병

본 제품은 엄격한 품질관리를 뚫한 제품입니다.

만약 구입시 사용기한이 정해되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품을 경우에는 구입처에서 교환해 드립니다.  
 \* 제품에 대한 기타 자세한 사항과 이후 변경된 내용은 본사 의학정보부(02-566-6103)로 문의하십시오. \* 바랍니다.  
 \* 부작용 피하기: 그제 소정 : 한국의약품 안전관리원(1644-6223), 부작용 피하기: 그제 소정 : 한국의약품 안전관리원(1644-6223)

작성년월일 : 2021년 4월 9일

지소시



**한국유나이티드제약 (주)**  
세종특별자치시 진동면 노정궁단길 25-23

저 조영리-



**한국바이오켐제약(주)**  
세종특별자치시 전의면 산단길 204