

일반의약품

하루 한 알로 지키는

관절건강

조인트탑 600 정

Jointop 600



고함량 콘드로이틴 600mg + 활성형 비타민 B 복합제

【성상】 노란색의 장방형 필름코팅정

【원료약품 및 그 분량】 1정(1197.3mg) 중 유효성분 :

콘드로이틴설페이트나트륨(KP)	600mg
피리독신염산염(KP)	25mg
시아노코발라민1000배산(시아노코발라민으로서 20μg)(KP)	20mg
니코틴산아미드(KP)	60mg
리보플라빈부티레이트(KP)	6mg
이노시톨(KP)	20mg
콜린타르타르산염(USP)	20mg
판토텐산칼슘(KP)	15mg
벤포티아민(KP)	60mg

· 동물유래성분 : 콘드로이틴설페이트나트륨(Beef cartilage)

· 기타첨가제 : 경질무수구산, 무수인산수소칼슘, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이III노란색(85F12347), 오파드라이클리어(03K19229), 크로스카멜로소나트륨, 폴리예틸렌글리콜 6000, 히드록시프로필셀룰로오스

【효능·효과】

1. 다음의 경우의 비타민 B₁, B₂, B₆의 보급

- 육체피로
- 임신·수유기
- 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하 시
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등)
 - 각기
 - 눈의 피로

【용법·용량】 만 8세 이상 및 성인 : 1일 1회, 1회 1정

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- (1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- (2) 만 3개월 미만의 젖먹이

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- (1) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- (1) 만 1세 미만의 젖먹이
- (2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- (3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부 문서를 소지할 것.

- (1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
구역, 구토, 묽은 변, 식욕부진, 복부팽만감
- (2) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy) : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
- (3) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₆를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
- (4) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.

(5) 우발적으로 과량복용 한 경우

(6) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- (1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- (2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것.
- (3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.

6. 저장상의 주의사항

- (1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것.
- (3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【사용기간】 제조일로부터 24 개월

【포장단위】 90정(45정/병x2)

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【설명서개정연월일/관리번호】 2019.04.08 / P1904-01

※본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패·오염 되거나 손상된 제품은 약국개설자 또는 의약품판매업자에 한하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회 에서 고시한 "소비자분쟁해결기준"에 의거, 정당한 소비자피해에 대해 보상해 드립니다.

※의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※첨부문서 최종 개정연월일(2019.04.08)이후 변경된 내용은 온라인 의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

※제품의 사용기한은 외부 포장에 표기되어 있습니다.

※부작용 보고 : 한국약품 안전관리원(1644-6223)

【제조·판매자】



일양약품주식회사

경기도 용인시 기흥구 하갈로 110

소비자상담실 : 080-021-1010(수신자요금부담전화)

학술상담실 : 02-570-3888 홈페이지 www.ilyang.co.kr