

본태고혈압 모노티탄정 80밀리그램 텔미사르탄

■ 원료약품 및 그 분량 : 1정 중

[유효성분] 텔미사르탄(TP) 80.0mg
 [기타 첨가제] 메타크루인알루미늄크리세올, 무수인산수소칼슘, 미결정셀룰로오스, 수산화나트륨, 스테아릴마그네슘나트륨, 저저화도히드록시프로필셀룰로오스, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 클로이드산인산히소스, 크로스포비돈, 히포로멜로오스, D-나트룰

■ 성상 : 흰색의 다원형 정제

■ 효능·효과

1. 본태고혈압
 2. 심혈관 질환의 위험성 감소
 ACE억제제를 내약성으로 투여할 수 없으며, 주요 심혈관 질환이 발생될 위험성이 높은 만 55세 이상의 환자(관상동맥질환, 말초동맥질환, 뇌졸중, 일과성 허혈 발작에 대한 과거 병력이 있거나 말단 장기 손상의 임상적 증거가 있는 고위험성 당뇨병 환자에서 심근경색, 뇌졸중 및 심혈관 질환으로 인한 사망의 위험성 감소

■ 용법·용량

1. 본태고혈압
 성인 : 텔미사르탄으로서 1일 1회 40 mg경구투여할 것이 권장되며, 환자에 따라 1일 1회 20 mg으로 유효할 수 있다. 필요한 경우 1일 1회 80 mg까지 증량할 수 있다.
 이 약은 히드로클로로타이아지드 등의 티아지드계 이뇨제와 병용투여시 추가적인 혈압강하 효과를 나타낸다.
 용량을 증가할 때는 치료시작 후 4 ~ 8주에 최대 혈압강하 효과를 나타낸다.
 2. 심혈관 질환의 위험성 감소
 성인 : 이 약으로서 1일 1회 80 mg 경구투여할 것이 권장된다. 80 mg 미만 용량에서의 심혈관 질환의 이환율과 사망률에 대한 위험성 감소 효과는 알려진 바 없다. 심혈관 질환에 대한 위험성 감소의 목적으로 이 약의 치료를 시작하는 경우 혈압을 모니터링 하는 것이 권장되며, 혈압강하제 의 적절한 조절이 요구될 수도 있다.
 ○ 간장애 환자
 경증 ~ 중증도의 간장애 환자에게는 주의하여 투여해야 하며, 1일 1회 40 mg을 초과하지 않아야 한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 경고
 임부에게 레난-인조옌센-알도스테론계(RAAS)에 직접 작용하는 약물들의 투여시, 태아 및 신생아에게 손상 및 사망까지도 일어날 수 있으며, 이러한 사례는 ACE억제제를 복용한 환자에서도 세계적으로 수십 개가 보고된 바 있다. 따라서 만일 임신으로 확인될 경우 즉시 이 약의 투여를 중단해야 한다(임부 및 수유부에 대한 투여 항 참조).

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것
 1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응 환자
 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부
 3) 중증의 간장애 환자, 담도폐쇄 또는 담즙정체 환자에 이 약은 거의 대부분 담즙으로 배설된다. 담즙정체, 담도폐쇄성 질환이 있는 환자나 간장애 환자는 간 청소능 감소를 예상할 수 있다.)
 4) 유전성 혈관부종 환자이거나, ACE억제제 또는 인조옌센II수용체 길항제 치료시 혈관부종의 병력이 있는 환자
 5) 당뇨병이나 중등도~중증의 신장애 환자(사구체여과율 <60mL/min/1.73m²)에서 일리스크렌 함유 제제와의 병용

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 1) 고령자
 2) 고칼륨혈증 환자 또는 혈청 칼륨치가 높아지기 쉬운 환자
 3) 경증에서 중등도 간장애 환자주의하여 투여해야 하며, 1일 1회 40 mg을 초과하지 않아야 한다.)

4) 대동맥판 및 승모판 협착증 환자 또는 폐쇄비대성심병 환자
 5) 허혈 심장병, 허혈 심장혈관 질환, 뇌혈관 장애 환자(과도한 혈압강하는 심근경색이나 뇌혈류 부전으로 인한 뇌졸중을 일으킬 수 있다.)
 6) 활동성 위 또는 십이지장궤양 등 위장관계 질환 환자
 7) 신장혈관고혈압 환자(악축성 신동맥 협착증 환자 또는 단독기능 신장의 신동맥 협착증 환자)
 8) 중증의 신장애 환자(신기능을 악화시킬 우려가 있기 때문에 혈청 크레아티닌 3.0 mg/dL 이상인 경우에는 신중하게 투여한다.)
 9) 레난-인조옌센-알도스테론계(RAAS)의 이중치단 : 인조옌센 II 수용체 길항제(ARB), ACE억제제, 또는 일리스크렌 등 레난-인조옌센-알도스테론계(RAAS)에 영향을 미치는 다른 약제와의 병용은 권장되지 않는다.

4. 이상반응

1) 고혈압 환자에게 실시된 위약대조 임상시험에서 텔미사르탄 투여 후 보고된 전반적인 이상반응의 발현 빈도는 위약과 유사하여 이 약 두어군에서 41.4 %, 위약 투여군에서 43.9 %였다. 이들 이상반응의 발현율은 용량과 관련 없으며 환자의 성별, 연령, 인종과도 무관하다.
 심혈관 질환의 위험성 감소효과를 평가하기 위해 이 약을 투여받은 환자에서 얻어진 텔미사르탄 안전성 프로파일은 고혈압환자를 대상으로 실시한 임상시험에서 얻어진 것과 동일하였다.
 아래의 이상반응 목록은 고혈압 환자를 대상으로 실시한 대조 임상시험과 시판 후 조사로부터 수 집된 것이다. 또한, 다음의 표는 최고 6년까지 실시된 세 개의 장기간 임상 시험(심혈관 질환의 위험성 감소효과 평가를 위해 텔미사르탄을 투여받은 21,642명의 환자 포함)에서 보고된 중대한 이상 반응과 임상시험의 중단을 요구한 이상반응을 고려하였다.
 이상반응의 발생빈도는 다음과 같이 정의한다. : 때때로(≥ 1/1,000, < 1/100); 드물게(≥ 1/10,000, < 1/1,000); 매우 드물게(< 1/10,000)
 각각의 빈도 분류 내에서는 중증도가 낮아지는 순서대로 이상반응을 기재하였다.

발현부위	중증별 발생빈도	
	때때로	드물게
감염증	상기도 감염 (인두염, 부비동염 포함), 오로감염(방광염 포함)	패혈증(치명적 결과 포함)
혈액 및 림프계	빈혈	혈소판 감소증, 호산구증가증
면역계	빈혈	과민증, 아나필락시스성 반응
대사 및 영양	고칼륨 혈증	저혈당
정신	우울, 불안	불안
신경계	실신	
눈		시각 이상
귀 및 미로	어지럼	
심장	시맥	빈맥
혈관	저혈압, 기립저혈압	
호흡, 흉부 및 종격동	호흡곤란	
위장관	복통, 설사, 소화불량, 복부팽만감, 구토	복부불쾌감, 구강건조
간 및 담도		간기능 이상/간장애*
피부 및 피하조직	발한증가, 가려움, 발진	홍반, 혈관부종(치명적 결과 수반, 약물발진, 독성과발진, 습진, 두드러기
골격근 및 결합조직	근육통, 요통에 : 좌골신경통), 근육경련(다리경련)	관절통, 사지통증(다리통증), 힘줄종창(견염부증상)
신장 및 비뇨기	급성신부전을 포함한 신장애	
전신 및 투여부위	가슴통증, 무력증(신약)	인플루엔자모양 질환
검사치	혈중 크레아티닌 증가	혈중 요산 증가, 간효소 증가, 혈중 크레아티닌/나아세(CK) 상승, 헤모글로빈 감소

* 심혈관 위험성 감소를 위해 텔미사르탄을 투여받은 환자 중 혈압이 조절되고 있던 환자군에서는 흔하게 보고됨.
 * 일본인을 대상으로 한 시판후경험에서 보고된 경우가 대부분임.

2) 대사 이상 : 저혈당(드물게)이 나타나 사례가 있으므로(당뇨병 치료중인 환자에서 나타나기 쉽다.) 관찰을 충분히 하고, 무력감, 근육감, 식은땀, 손 떨림, 진정력저하, 경련, 의식장애 등이 나타나 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
 3) 혈관부종 : 얼굴, 입술, 인두 후두, 혀 등의 충절을 중심으로 하는 혈관부종이 나타나 후두부종 등으로 호흡 곤란을 초래한 사례도 보고되어 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우 에는 즉시 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
 4) 고칼륨혈증 : 심각한 고칼륨혈증 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 즉시 적절한 처치를 한다.
 5) 신기능 장애 : 신부전을 보인 사례가 보고되어 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
 6) 쇼크, 실신, 의식 소실 : 쇼크, 혈압강하에 따른 실신, 의식 소실이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 차가운 느낌, 구토, 의식 소실 등이 나타날 경우에는 즉시 적절한 처치를 한다. 특히 혈액 투석, 엄격한 염분제한, 이뇨제 투여중인 환자는 낮은 용량에서 투여를 시작하고 증량하는 경우 환자의 상태를 충분히 관찰하면서 서서히 해야 한다.
 7) 간기능 장애 : 황달 : AST, ALT, ALP, LDH의 상승 등 간기능 장애, 황달이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
 8) 아나필락시스모양 증상 : 호흡 곤란, 혈압강하, 후두부종 등이 증상으로 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
 9) 간질성 폐렴(빈도 불명) : 발열, 기침, 호흡 곤란, 흉부 X 선 이상 등을 수반하는 간질성 폐렴이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지하고 부신 피질 호르몬제의 투여 등 적절한 처치를 한다.
 10) 횡문근융해(빈도 불명) : 근육통, 무력감, 크레아틴키나아제(CK) 상승, 혈중 및 오중 미오글로빈 상승을 특징으로 하는 횡문근융해가 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히하고 이러한 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
 11) 귀에서 언급한 이상반응 이외에 심계항진, 피로, 구역, 효과부족이 보고된 바 있다.
 12) 국내에서 15,601명의 고혈압 환자를 대상으로 실시한 대규모 시판 후 사용성적조사결과 이상 반응 발현율은 1.54 %/240례/15,601례이었으며, 이 중 약물과의 인과관계를 배제할 수 없는 것은 1.2 %/83례/15,601례이었다. 두통이 0.38 %/60례/15,601례로 가장 많았고, 그 다음은 어지럼 0.2 %/33례/15,601례, 기침 0.13 %/21례/15,601례, 소화불량 0.07 %/11례/15,601례, 심계항진 0.06 %/10례/15,601례) 등의 순이었다. 중대한 이상반응으로 부정맥 1례가 보고되었다.
 약물과의 인과관계를 배제할 수 없는 것으로서, 시판 전 임상시험에서 위약보다 발현율이 낮았거나(노 표사) 시판 전 임상시험에서 나타나지 않았던 새로운 이상반응은 다음과 같다(괄호안의 숫자는 발현 예수임).
 (1) 중추 및 말초 신경계 : 두통*(60), 얼굴경련(2), 감각이상(2), 마비(1), (2) 호흡기계 : 기침(2), 과호흡(1), 폐렴(1)
 (3) 자율신경계 : 홍조(5), 발기부전(1), 식욕부전(1), 부정맥(1)
 (4) 전신 : 무력(4), 부종(3)
 (5) 정신신경계 : 성욕감소(2)
 (6) 피부 및 부속기관 : 얼굴부종(1), 발진(1), 탈모증(1)
 (7) 감각기관 : 결막염(1), 귀에서 소리가 남(1)
 (8) 혈소판 출혈 및 응고이상 : 점상출혈(1)
 이 중 신장애에 환자의 이상반응 발현율은 0.9 %/4례/445례로 두통, 어지럼, 근육통, 피부염이 보고되었으며, 간장애에 환자의 이상반응 발현율은 2.0 %/6례/296례로 어지럼, 소화불량, 기침, 복통, 식욕부진, 무력(1)이 보고되었다.

5. 일반적 주의

1) 신장애 및 신장이상 환자
 신장애 환자에게 이 약을 투여할 때 혈청 칼륨 및 크레아티닌치의 주기적인 모니터링이 권장된다. 최근에 신장애 이식한 환자에 대해서는 이 약의 사용경험이 없다. 이 약은 혈액 투석을 받는 환자를 포함한 신장애 환자에서 용량조절이 필요 없으며, 혈액투석으로 제거되지 않는다.
 2) 혈관내 혈량저하증
 고용량의 이뇨제, 식이성 염분제한, 설사 및 구토 등에 의해 혈량량 및/또는 나트륨이 고갈된 환자, 혈액투석중인 환자의 경우, 특히 초회 투여 후 저혈압 증상이 나타날 수 있다. 이런 증상, 특히 혈액량 및/또는 나트륨의 고갈은 이 약 투여 전에 고갈되어 있다. 저혈압이 발생하는 경우 환자를 반드시 눕히고 필요시 생리식염수 주사액을 정맥주입한다.
 3) 레난-인조옌센-알도스테론계를 자극하는 다른 조건
 혈관긴장상태 및 신기능이 레난-인조옌센-알도스테론계의 활성에 주로 의존하는 환자의 경우(예, 중증의 울혈성심부전 환자 또는 신동맥협착증을 포함한 근원적인 신질환 환자), 레난-인조옌

센-알도스테론계에 영향을 미치는 다른 약물의 투여는 급성 저혈압, 과질소혈증, 빈뇨 및 드물게 급성신부전 및/또는 사망과 관련성이 있다. 이 약을 투여한 환자들에게서도 유사한 결과가 예측된다.

4) 전해질불균형/고칼륨혈증
 레난-인조옌센-알도스테론계에 영향을 미치는 약물을 병용하는 경우 고칼륨혈증을 유발할 수 있다. 고령자, 신부전 환자, 당뇨병 환자, 혈청 칼륨농도에 영향을 줄 수 있는 약물을 병용중인 환자 등에서 고칼륨혈증은 치명적일 수 있다. 레난-인조옌센-알도스테론계에 영향을 주는 약물을 병용하기 전에 유약성과 위험성을 고려해야 한다. 고칼륨혈증을 유발할 수 있는 주요 위험 요소는 다음과 같다.

- 당뇨병, 심부전, 신장장애, 고령자(> 70)
 - 레난-인조옌센-알도스테론계에 영향을 주는 약물(칼륨보존이뇨제, 칼륨보충제, 칼륨이 함유된 염 대용품 및 칼륨치를 상승시킬 수 있는 다른 약제(파란 등)), ACE억제제, 인조옌센II수용체 길항제, 비스테로이드소염진통제,선택적 COX-2억제제를 포함하는 비스테로이드소염진통제, 면역억제제(시클로스포린, 디클로리무스, 트리메토프림 등을 한가지 이상 병용하는 경우, -알수, 급성 심장정지전상실, 대사신증, 신장기능의 저하, 신장상태의 갑작스런 악화(예, 감염성 질환, 세포용해(예, 급성사지괴사, 횡문근용해, 황달이상)와 같은 병발질환이 있는 경우

5) 수술 전 2시간은 투여하지 않는 것이 바람직하다.
 6) 활동성 위 또는 십이지장궤양 등 위장관계질환 환자에서 이 약 투여시 위장관계 이상반응이 위약 환자보다 더 자주 나타났다. 위장관 출혈이 임상시험에서 드물게 관찰된 바 있으며 대부분 위장관 질환을 가진 환자에서 초기에 나타났다. 따라서 위장관계 질환자에게 이 약을 투여할 때는 주의하여야 한다.
 7) 신장혈관고혈압 환자(악축성 신동맥 협착증 환자 또는 단독기능 신장의 신동맥 협착증 환자)를 레난-인조옌센-알도스테론계에 영향을 미치는 약물로 치료할 경우에는 중증의 저혈압이나 신부전의 위험이 증가된다. 약초 또는 한약의 신동맥협착증이 있는 환자에게 이 약을 투여할 경우 ACE억제제와 마찬가지로 혈청 크레아티닌 또는 혈중 요인소소의 상승이 예측된다. 또한 신장혈류량 감소와 사구체 여과율의 저하에 의해 급속히 신장기능을 악화시킬 우려가 있으므로 치료 부득이하다고 판단되는 경우를 제외하고는 사용을 피하는 것이 권장된다.
 8) 일반적으로 원발성알도스테론증이 있는 환자는 레난-인조옌센-알도스테론계를 억제하는 혈압강하제에 대해서 반응성이 없으므로 이런 환자에게 이 약의 투여는 권장되지 않는다.
 9) 온전 및 기계조작에 대한 영향 : 이 약이 온전 및 기계조작에 미치는 영향에 대한 연구는 실시되지 않았으나, 혈압강하제를 복용할 때 때때로 졸음, 어지럼이 나타날 수 있으므로 이 약을 투여중인 환자는 자동차 운전 또는 임원이 수반되는 작업의 조작시 주의해야 한다.
 10) 심혈관 질환에 대한 추가적인 위험성이 있는 당뇨병 환자(예: 당뇨병과 관상동맥질환을 동반한 환자에서 인조옌센 II 수용체 길항제 또는 ACE 차단제와 같은 혈압강하제 투여 시 치명적인 심근경색 및 예상하지 못한 심혈관 질환으로 인한 사망 위험성이 증가할 수 있다. 당뇨병 환자에서 관상동맥질환에 대한 증상이 나타나지 않아, 이에 대해 진단되지 않을 수 있으므로 당뇨병자에게 이 약을 투여하기 전에 관상동맥질환에 대한 적절한 진단 평가에: 운동 부하 검사를 우선적으로 실시해야 한다.

6. 실험적용

1) 인조옌센II 수용체 길항제(ARB), ACE억제제 또는 일리스크렌의 병용투여에 의한 레난-인조옌센-알도스테론계(RAAS)의 이중치단은 이러한 약물의 단독용법과 비교시 저혈압, 실신, 고칼륨혈증 및 신기능의 변화(급성 신부전 포함) 위험을 증가시키는 것과 관련이 있다. 이 약과 RAAS에 작용하는 다른 약물을 병용투여하는 환자의 경우, 혈압, 신기능 및 전해질을 면밀히 모니터링해야 한다. 당뇨병이나 중등도~중증의 신장애 환자(사구체여과율 <60 mL/min/1.73m²)에게 이 약과 일리스크렌 함유제제를 병용투여하지 않는다.

2) 이 약은 다른 혈압강하제의 혈압강하효과를 증가시킬 수 있다. 임상적으로 유의성 있는 다른 상호작용은 확인된 바 없다.

3) 이 약과 아크로핀, 히드로클로로타이아지드, 클리베클라미드, 이부프로펜, 아세트아미노펜, 심바스타틴 및 염소디핀의 병용투여에 의해 임상적으로 인한 상호작용은 나타나지 않았다.
 4) 다국산 : 다국산이 이 약의 병용투여에 의해 혈청 다국산의 최고농도의 증강값이 49 %증가하였고, 기저농도의 증강값이 20 %증가례에서 39 %증가하였다. 그러므로 이러한 경우 혈청 다국산치의 모니터링이 권장된다.
 5) 라미프릴 : 텔미사르탄과 라미프릴의 병용투여 시험결과, AUC_{0-24h}, 수치 및 라미프릴과 라미프릴랫트의 C_{max}수치가 2.5배까지 증가하였다. 텔미사르탄과 라미프릴 병용투여시 약력학적 상가작용 및 라미프릴/라미프릴랫트의 증가된 노출로 인하여 효과가 증강될 수 있다. 이 약과 라미프릴의 병용투여는 권장되지 않는다.
 6) 리튬 : ACE억제제와 리튬을 병용투여했을 때, 혈청 리튬치의 가역적인 증가와 독성이 보고된 바 있다. 이 약을 포함하여 인조옌센II수용체 길항제 또한 이런 독성이 보고되었다. 따라서 이 약과 리튬을 병용투여하는 동안 혈청 리튬치의 신중한 모니터링이 권장되며, 일반적으로 병용투여는 권장되지 않는다.
 7) 이 약은 CYP-450 시스템에 의해 대사되지 않으며, 일부 CYP2C19억제제를 제외하고는 실험실상(in

vitro)에서 CYP-450 효소에 영향을 미치지 않았다. CYP2C19에 의해 대사되는 약물의 대사를 저해할 가능성을 제외하고는 이 약과 CYP-450 효소에 의해 대사되는 약물 및 CYP-450 효소를 저해하는 약물과의 상호작용은 예측되지 않는다.

8) 비로코펜, 아미포스틴, 알코올, 바르비투르산염, 마약, 항응고제에 의해 기립저혈압이 심화될 수도 있다.
 9) 비스테로이드소염진통제(SAID) : 인조옌센II수용체 길항제가 비스테로이드소염진통제에, 선택적인 COX-2억제제, 아세틸살리실산(> 3 g/day), 비선택적 비스테로이드소염진통제와 병용시 혈압강하효과가 감소할 수 있다. ACE억제제와 같이, 인조옌센II수용체 길항제와 비스테로이드소염진통제의 병용은 신기능을 악화, 급성 신부전을 유발시킬 수 있고, 혈청 칼륨을 증가시킬 수 있다. 병용시 주의해야 하며, 특히 고령자 또는 유효혈액량 감소환자(이뇨제 치료 중인 환자)를 포함한 수 있다. 병용치료 시작 후에 환자에게 적절한 수분이 공급되어야 하며, 신기능을 주기적으로 모니터링 해야한다.
 10) 칼륨보존이뇨제 또는 칼륨보충제 : 텔미사르탄과 같은 인조옌센II수용체 길항제는 칼륨 소실로 인한 이뇨 효과를 약화시킨다. 칼륨보존이뇨제(스피로노락톤, 에플레레네, 트리암테렌 또는 아미로리드), 칼륨보충제 또는 칼륨이 함유된 염 대용품은 혈청 칼륨 농도를 증가시킬 수 있다. 저칼륨혈증으로 인하여 이 약을 병용투여하는 경우 혈청 칼륨 농도에 대해 빈번한 모니터링하면서 주의하여 투여한다. 일반적으로 병용투여는 권장되지 않는다.
 11) 부신피질호르몬(코르티코스테로이드, 전신 투여) : 이 약과 병용투여시 혈청강하효과가 감소될 수 있다.
 12) 이노제타이아지드 또는 루프이뇨제 : 이 약으로 치료 시작 전에, 루프이뇨제(부로세미드) 그리고 티아지다이뇨제(히드로클로로타이아지드)와 같은 이뇨제의 고용량 사용은 체액고갈, 저혈압의 위험성을 증가시킬 수 있다.

7. 임부 및 수유부에 대한 투여

1) 성상능 : 이 약이 사태의 생성능에 미치는 영향은 연구되지 않았다. 임신 및 수컷 캣트를 이용한 비임상시험에서 수태에 대한 이 약의 영향은 관찰되지 않았다.
 2) 임신 1기 중 인조옌센II수용체 길항제의 사용은 권장되지 않으며 임신1기나 중 이 약의 투약을 시작해서는 안 된다. 인조옌센II수용체 길항제의 작용기전 때문에 태아에 대한 위험을 무시할 수 없다. 임신 2 ~ 371 사이에 ACE억제제(레난-인조옌센-알도스테론계에 작용하는 특정 약물군)에 노출된 임부에서 태아 및 신생아의 저혈압, 고칼륨혈증, 신생아 두개골 발육부전, 요상소 그리고 고도 또는 무호흡, 기적적 또는 비가역적인 신부전, 자궁내 성장 지연 및 사망을 포함하여 태아 및 신생아 손상과 연관성이 있었다. 태아 신기능 감소 때문인 것으로 추측된 양수과소증이 보고되었고, 양수과소증은 태아 사지구공, 두개개면 기형 및 폐발육 부전과 연관성이 있었다. 후향적 자료에 의하면, 임신 1기에 ACE억제제를 사용하는 것은 출생결함의 잠재적 위험과 연관 있었다. 또한 이 약에 의한 것이지 명확하지 않지만 미숙, 자궁내 발육지연, 동맥관 열림증이 나타났다는 보고가 있다. 다른 레난-인조옌센-알도스테론계에 직접 작용하는 약물처럼 이 약도 임신 중 또는 임신을 계획하고 있는 여성에게 사용해서는 안 되며, 투약 중 임신이 확인되면 즉시 투약을 중지한다. 레난-인조옌센-알도스테론계에 작용하는 약물을 임신할 가능성이 있는 여성에게 처방하는 경우, 의사는 임신 중 이 약의 잠재적 위험에 대하여 알려 주어야 한다. 만약 임신 27기 이후로 임부가 인조옌센II수용체 길항제에 노출되었을 경우, 태아의 신장기능과 두개골 초음파 검사가 권장된다. 또한, 자궁 내에서 이 약에 노출된 경향이 있는 신생아의 경우 충분한 배뇨, 고칼륨혈증, 혈압을 면밀히 조사해야 한다.

3) 이 약이 모유로 이행되는지의 여부는 밝혀지지 않았으나 캣트에 대한 실험에서 유즙 중에 이 약의 분비가 확인되었으며으로 수유부가 이 약을 사용하는 것은 바람직하지 않다. 수유중인 여성에게 이 약의 투여를 피하고, 부득이 투여하는 경우에는 수유를 중단해야 한다.

8. 소아에 대한 투여

만 18세 미만의 소아에 대한 안전성 및 유효성은 확립되지 않으므로, 이 약의 투여가 권장되지 않는다.

9. 고령자에 대한 투여

고령자에게 일반적으도 과도한 혈압강하는 바람직하지 않다고 되어있다(뇌경색 등이 일어날 우려가 있다). 고령자에 투여하는 경우에는 환자의 상태를 관찰하면서 신중히 투여한다.

10. 과량투여시의 처리

사람에서의 과량투여에 대한 유용한 정보는 제한적이다. 이 약의 과량투여시 가장 흔한 증상으로는 저혈압, 빈맥, 시력무보교간신경 자극으로 인한, 어지럼 및 급성신부전 등이 보고되었다. 치료 저혈압 증후가 나타나면 보조적인 치료를 실시해야 한다. 이 약은 혈액투석에 의해 제거되지 않는다. 환자를 주의깊게 관찰해야 하고 복용 후 경시시간 및 증상의 경중에 따라 대증적 보조적 치료를 실시한다. 구토유도를 고려할 수도 있다. 역문진이 처치에 유용할 수도 있다. 혈청 전해질 수치와 크레아티닌 수치를 자주 모니터링 해야 한다. 저혈압이 나타나면 환자를 눕히고 염분과 체액 대용제를 빨리 공급해야 한다.

11. 보관 및 취급상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.

12. 의약품동등성시험 정보^{*)}

가. 시험약 텔미사르탄정80밀리그램(위더스제약)과 대조약 미카르디스정80밀리그램(텔미사르탄[한국의약품개발원]제)을 2x2 교차시험으로 각 13명씩 건강한 성인에게 공복 시 단회 경구 투여하여 43명의 혈중 텔미사르탄을 측정한 결과, 비교평가항목제AUC, C_{max})를 로그 변환하여 통계처리 하였을 때, 평균치 차의 90 % 신뢰구간이 log 0.80에서 log 1.25이내로서 생물학적으로 동등함을 입증하였다.

구분		비교평가항목		참고평가항목	
		AUC _{0-48h} (ng·hr/mL)	C _{max} (ng/mL)	T _{max} (hr)	t _{1/2} (hr)
대조약	미카르디스정80밀리그램 (텔미사르탄) [한국배리거인제약(일양)]	2766±1756	580.5±326.3	1.00 (0.50~3.00)	16.34±6.37
시험약	텔미사르탄정80밀리그램 [위더스제약(위)]	2639±1630	577.1±339.9	1.33 (0.50~6.00)	19.48±7.02
90% 신뢰구간 ²⁾ (기준 : log 0.8 ~ log 1.25)		log 0.9002 ~ 1.0146	log 0.8432 ~ 1.0000	—	—
(AUC, C _{max} , t _{1/2} : 평균값±표준편차, T _{max} : 중앙값(범위), n=43)					
AUC : 투약시각부터 최종혈중농도 정량시간 1/2까지의 혈중농도-시간곡선하면적 C _{max} : 최고혈중농도 T _{max} : 최고혈중농도 도달시간 t _{1/2} : 말단 소실 반감기 *) 비교평가항목치를 로그변환한 평균치 차의 90%신뢰구간					

^{*)} 이 약은 위더스제약의 텔미사르탄정80밀리그램과 동일한 원료를 사용하여 동일한 제조방법으로 된 공정을 위더스제약에 위탁 제조하였음.

13. 기타

비임상 안전성 시험결과, 정상 혈압을 가진 동물에 임상적 치료 용량에 상응하는 용량 투여시 적혈구 적 파파티에, 적혈구, 헤모글로빈, 헤마토크리트의 감소, 신장의 혈액학적 변화(혈액 요소 질소 및 크레아티닌 증가), 혈청 칼륨 증가가 보고되었다. 개에서는 신세뇨관 확신 및 위축이 관찰되었다. 또한 위장 점막 손상기전, 궤양 또는 염증이 캣트와 개에서 관찰되었다. ACE억제제 및 인조옌센II수용체 길항제의 비임상시험 자료에서 보고되는, 약리학적 효과에서 비롯한 이상반응들은 생리시약수의 경구투여로 방지되었다.
 약독 동물중독 및 개에서 혈청 레닌 활성 증가, 신장사구체세포(frenal juxtaglomerular cell)의 비대 및 중증이 관찰되었다. 이러한 변화는 ACE억제제 및 다른 인조옌센II수용체 길항제에서 보고된 것과 마찬가지로 임상적으로 유의하지 않다.
 기형발생에 대한 증거는 없으나, 동물실험에서 태중간소, 개안 지연, 치사를 증가와 같은 후세대의 출생 후 발생에서 텔미사르탄의 잠재적인 위험이 보고되었다. 실험실 연구(in vitro study)에서 유전독성 및 염색체 변이원에 대한 증거는 없으며, 캣트 및 마우스에서 발암성에 대한 증거는 없다.

■ **저장방법**: 기밀용기, 실온(~30℃)보관
 ■ **포장단위**: 30정(10정/Alu-Ax3), 30정/병
 ■ **사용기한**: 제조일로부터 36개월
 ■ **제조원지**: 안국약품㈜ 경기도 화성시 향남읍 제약공단길 40
 ■ **제조자**: 위더스제약㈜ 경기도 안성시 미양면 제2공단길 103 AG220311

■ 본 제품은 공경거래위원회가 고시한 소비자분쟁해결기준에 의해 정당한 소비자피해에 대해 보상해 드립니다. 유통 도중에 사용기간이 경과하였거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 교환하여 드립니다. 담당사원을 통하여 제사료 송부처로 주시기 바랍니다. 안국약품㈜ · 소비자 상담실: 080-001-4125

※ 이 첨부서지 작성일자(2022년 3월 1일) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.ahn-gook.com)에서 확인할 수 있습니다.
 ※ 자세한 품목 허가 또는 신고사항은 의약품통합정보시스템(www.fedrugin.mfds.go.kr)의 의약품 정보란 참조
 ※ 의약품 부작용 보고 및 피해구제 신청: 한국의약품안전관리원(044-6223, 14-3330)



■ 본사: 서울특별시 영등포구 신영동로 63(대림동) ■ 공장: 경기도 화성시 향남읍 제약공단길 40