

파리에트정5mg

라베프라졸나트륨

[원료약품 및 그 분량] 이 약 1정 중

•유효성분: 라베프라졸나트륨(LP)…………… 5mg
•기타 첨가제: 글리세린지방산스테렌, 산화마그네슘, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 에틸셀룰로오스, 키토한티드프록시프로필셀룰로오스, 카르나우버산, 카르멜로스조판올, 펠크, 황색산화철, 황철, 히드록시프로필셀룰로오스, 히프르멜로오스프탈레이트, D-만니톨

[성상]

얇은 노란색의 상용성 필름코팅정

[효능·효과]

위·십이지장 궤양 과역력이 있는 환자에 있어서, 1일 100mg 이하의 저용량 아스피린 투여에 의한 위·십이지장 궤양 예방

[용법·용량]

성인에서의 상용량은 라베프라졸나트륨으로서 5mg을 1일 1회 경구 투여하는 것이다.

- 간장애 환자
간장애 환자에서 간질성증의 이상반응이 보고되었다. 따라서 신중히 투여하여야 한다.

- 소아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다.

- 고령자

간기능이 저하되어 있는 경우가 많으므로 신중히 투여한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 이 약, 이 약의 구성성분 또는 보조제나다른유제에 과민반응 및 그 병력이 있는 환자
- 아타자나비르를 투여중인 환자
- 알부 및 수유부
- 헤파비린을 투여중인 환자 (상호작용항 참조)

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 간장애 환자
- 고령자(고령자에 대한 투여상 참조)
- 약물 과민반응의 병력이 있는 환자

3. 이상반응

- 과민반응 : 때때로 발진, 두드러기, 가려움 등이 나타날 수 있으므로 이런 증상이 나타난 경우에는 투여를 중지한다.
- 혈액제 : 때때로 적혈구감소, 백혈구감소, 백혈구증가, 호산구증가, 호중구증가, 림프구감소, 변형, 빈상혈, 림프결핍증, 적색수빈형, 병혈구 감소, 무과립구증, 혈소판감소, 용혈성 빈혈 등이 나타날 수 있으므로 투여 중에는 정기적으로 혈액생화학적 감사를 하는 것이 바람직하다. 또 이상이 나타난 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 조치를 한다.
- 간장 : 때때로 ALT, AST, ALP, γ-GTP, LDH, 총빌리루빈의 상승 등이 나타날 수 있으므로 투여 중에는 정기적으로 혈액생화학적 감사를 하는 것이 바람직하다. 전경성간염, 간기능 장애, 황달이 나타날 수 있다. 이상이 나타난 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 조치를 한다.
- 심혈관계 : 고혈압, 심근경색, 심전도 이상, 권두증, 실신, 협심증, 각자단, 심계항진, 동맥맥, 빈맥, 드루게 서맥, 폐색전증, 심실상성 빈맥, 혈전정맥염, 혈관확장, QTC 연장, 심실 빈맥이 나타날 수 있다.
- 소화기계 : 설사, 때때로 변비, 복통, 복부팽만감, 소화불량, 트림, 구역, 적갈증, 헛배, 거식증, 탈수증, 구강건열, 삼킴곤란, 잇몸염, 증개염, 식욕항진, 비정상적 대변, 대장염, 식도염, 설염, 배장염, 췌장염, 구강, 구토, 하복부통, 설사, 위염, 구내염, 미각이상, 충혈성 설사, 단단설, 심이지장염, 위상 출혈, 간상성증, 간염, 간암, 간지배축적, 침샘확장, 갈증이 나타날 수 있다.
- 정신신경계 : 두통, 불면, 불안, 현기증, 경련, 비정상적인 꿈, 성욕저하, 신경증, 갈망이상, 떨림, 때때로 투움증, 진과제민, 졸음, 또 드물게 환혼, 우울 등등이 나타날 수 있다. 드물게 초조, 과, 기억상실증, 혼돈, 추체외로증후군, 증후질분열 과다가 나타날 수 있다. 또, 간경변환기 1 래에서 상하하 탈락, 기가증대(肝氣膨脹), 술려저하, 언어혼란, 최정거림, 외국에서 간성증수의 기장력을 가진 간경변환자 1례에서 황라, 병환감각 장애, 기면(睡眠)의 보고가 있다.
- 호흡기계 : 기침, 인두염, 비염, 호흡곤란, 천식, 코피, 후두염, 말초성, 과다호흡, 때때로 기관지연, 부비동염이 나타날 수 있다. 드물게 부호흡, 호흡저하가 나타날 수 있다. 간경변환이 나타날 수 있으므로 말결, 기침, 호흡곤란, 폐음 이상 등이 확인된 경우에는 이 약의 투여를 중지하고 신속하게 흉부 X선 검사 등을 실시하고 적절한 처치를 한다.
- 근관계 : 근육통, 요통, 관절염, 다리경련, 뼈 통증, 관절증, 운동량면, 과다근육긴장증, 전 경통, 드물게 단일수축이 나타날 수 있다.
- 피부 및 부속기계 : 발진, 두드러기, 발진, 두드러기, 탈모증, 드물게 피부진조, 대상포진, 전선, 피부색 변화, 독성표피괴사증후(리열증후군), 피부 침적약물중독(스티븐스-존슨증후군), 다형 홍반이 나타날 수 있다.
- 부속기관 : 맥내성, 악성, 독내성, 안구건조, 비정상적 시야, 이명, 중이염, 드물게 각막혼탁, 호르모비, 결모염, 난성, 눈의 통증, 망막변성, 사시가 나타날 수 있다.
- 비뇨기계 : 난배뇨, 방광염, 빈뇨, 권경곤란, 배뇨곤란, 신결석, 자궁출혈, 다뇨증, 드물게 유 방확장, 뇨도, 발기부전, 질분비물, 월경과다, 고혈압, 요산증, 간질성질환이 나타날 수 있다.
- 기타 : 때때로 부종, 증후관색테를 증식지반, BUN, 혈중 칼슘량 자각 호르몬의 상승, 울루, 오한, 발열, 요로감염, 혼만, 또 드물게 권배결, 폐종증, 시각이상, 식욕부진, 경부경직, 광각면성 반응, 숙취효과, 체중감소, 통풍이 나타날 수 있다. 다른 프로톤펌프억제제(proton pump inhibitor)제일약품(오메프라졸, 란소프라졸)에서 드물게 아나킬락시스반응, 쇼크를 일으켰다는 보고가 있으므로 이상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
- 시한 후 외국에서 보고된 이상반응

- 간 효소 수치의 상승이 보고되었으며, 드물게 간염, 황달이 보고되었다. 간결변 환자에서 간 효수치가 드물게 보고되었다. 급사, 혼수, 고알모니아혈증, 황문근용해, 병환감각장애, 실명, 아나킬락시스, 혈과부수이 보고되었다. 또한, 드물게 거머그대출혈증, 혈소판감소, 호중구감소, 백혈구감소, 무과립구증, 용혈성빈혈, 병혈구감소증, 수포성 혹은 두드러기상 피부 병변 및 전신적인 알레르기 반응(자열염, 호흡곤란, 알면부종 등), 근육통, 관절통이 보고되었다. 때때 드물게 간질, 신장염, 여성형유방증, 간질과열, 갑상선자극호르몬 상승, 다형홍반, 독성 표피괴사증후(리열증후군) 및 피부침적약물중독(스티븐스-존슨 증후군)이 보고되었다. 와르르러면 병증시 INR과 프로트롬빈 시간 증가가 보고되었다. 때결질이 보고되었다.
- 신혈설적 검사에서 라베프라졸 커토와 관련이 있는 다른 뚜렷한 비정상적인 검사결과는 보고되지 않았다. 클로스트리디움 디피테리성 설사가 나타날 수 있다(빈도불명).
- 다음은 프로톤펌프억제제의 시한 후 조사를 통해 보고된 이상반응이다. 이 이상반응은 특정 저나 다수의 연구집단에서 자발적으로 보고된 것이기 때문에, 항상 발생될을 신의성 있게 예측하거나 약을 투여와의 인과관계를 확인할 수 있지는 않다.
- 면역제: 전신홍반루푸스
- 피부 및 피부조각제: 피부홍반루푸스

- 국내 시한 후 조사결과
국내에서 폐식사를 위하여 6년 동안 53,109명을 대상으로 실시한 사용성적조사결과 이상반응의 병원증례율은 인과관계와 상관없이 0.47 %(250명/53,109례)로 보고되었다.

- 조화기계 : 구역, 변비, 복통, 설사, 소화불량, 복부팽만, 트림, 구갈, 구취, 설염, 구강건조, 구토, 미각이상, 위염, 간기능 이상, ALT 상승, AST 상승
- 전신 및 대사이상 : 가슴답답함, 알레르기 반응, 발열, 부종, 고장성지방혈증, 고콜레스테롤혈증, 체중증가
- 신경계 : 두통, 어지럼, 현란, 무력증, 손발저림, 불면, 불면, 졸음
- 피부 및 부속기관 : 두드러기, 발진, 가려움증, 열결부종, 홍조
- 근관계 : 관절증, 근육통
- 호흡기계 : 기침, 호흡곤란

(7) 기타 : 두근거림, 안혈상증, 시각이상, 요로결염

4. 일반적 주의

- 이 약으로 인해 약성종양의 증상이 완화되거나 진전이 지연될 수 있으므로 약성 종양이 의심되는 경고 증상(의도하지 않은 현저한 체중 감소, 재발성 구토, 삼킴곤란, 토열, 흑색변 등)이 있으면서 위궤양이 있거나 의심되는 경우 약성이 아님을 확인하고 투여해야 한다.
- 치르시 결과를 충분히 관찰하고 증상에 따라 이 약을 최소용량 및 적절한 치료기간으로 투여하여야 한다. 이 약으로 장기간 치료를 경우(특히 1년 이상) 환자는 정기적으로 감사를 받아야 한다.
- 신우에 환자에게 용량조절이 필요치 않다. 이 약의 투여 중에는 혈액상과 간기능에 주의하고 정기적으로 혈액학적 감사 및 혈액생화학적 감사를하는 것이 바람직하다. 또한 이상이 인정된 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
- 위궤양, 십이지장궤양, 문합부개양에 대해서는 장기적인 사용경험은 충분하지 않으므로 유지요법에는 사용하지 않는 것이 바람직하다.
- 관찰연구에서 프로톤펌프억제제 치료가 고관절, 손목 및 척추의 골다공증과 연관된 골결의 위험성 증가와 관련이 있을 가능성이 있다고 보고되었다. 골결의 위험은 권장용량을 상회하는 고용량을 투여한 환자와 1년 이상의 장기사를 환자에서 증가되었다.
- 3개월 이상 프로톤펌프억제제 치료를 받은 환자들에게서 거머그대출혈증이 드물게 보고되었으며, 1년 이상 치료를 받은 경우에 가장 많이 나타났다. 대부분의 환자들에게 저머그대출혈증의 치료로서 마그네슘보충 및 프로톤펌프억제제 투여 중단이 필요하다. 장기간 치료가 필요하거나 다국산 또는 거머그대출혈증을 유발하는 약품(예, 이노제)을 병용투여하는 환자들은 치료 시작을 포함한 주기적 마그네슘 수치 모니터링이 필요하다. 중대한 이상반응은 강직, 부정맥, 발작을 포함한다.
- 프로톤펌프억제제로 인해 위내 산도가 감소하면 위궤양에 보통 존재하는 세균의 수가 증가한다. 이 약으로 치료할 때 결모탈락, 결결모탈락, 클로스트리움 디피테라와 같은 세균에 의한 위장관의 감염 위험이 약간 증가할 수 있다. 이것은 클로스트리디움 디피테리균설 설사 위험성 증가와 연관이 있으며 특히 입원환자에서 이러한 위험성이 증가되었다는 여러 관찰연구 결과가 보고되었다. 이러한 진단은 설사증세가 개선되지 않았을 때 고려되어야 한다. 클로스트리디움 디피테리균설 설사는 거의 모든 항균제 사용 중 보고되고 있다.
- 약리학적 특성과 다양한 이상반응을 근거로 하면, 이 약은 유전능이나 기제 조작능력 등에 영향을 주기 않을 것으로 예상된다. 그러나 졸음으로 민첩성이 떨어질 수 있으므로, 운전이나 복잡한 기계 작동은 피하도록 한다.
- 메토트렉세이트 : 프로톤펌프억제제와 메토트렉세이트(주로 고용량을 사용하는 경우, 메토트렉세이트의 사용상의 주의사항 참조)를 병용하는 경우 메토트렉세이트 그리고또는 그 대사체의 혈장 농도가 상승 및 지속되어 메토트렉세이트의 독성이 나타날 수 있다는 문헌보고가 있었다. 고용량의 메토트렉세이트를 사용하는 경우, 프로톤펌프억제제의 일시적인 투여 중단 을 고려할 수 있다(상호작용항 참조).
- 헤파코박티펄리로 박멸을 위한 항생제 병용요법으로 이 약과 같이 투여하는 항균제의 사용 설명서를 참조해야 한다.
- 이 약의 장기투여로 인해 저염산증 또는 무염산증에 의해 비타민 B₁₂ (시아노코발라민) 흡수장애가 나타날 가능성이 있다.
- 피부 및 전신홍반루푸스: 프로톤펌프억제제를 복용한 환자에서 피부홍반루푸스(Cutaneous lupus erythematosus, CLE)와 전신홍반루푸스(Systemic lupus erythematosus, SLE)가 보고되었다. 이러한 사례들은 새로 발생하거나 기존과 자가면역질환의 약화로 발생하였다. 프로톤펌프억제제로 유발되는 홍반루푸스 사례는 대부분 피부홍반루푸스였다. 프로톤펌프억제제를 복용한 환자에서 보고된 피부홍반루푸스의 가장 흔한 형태는 아급성피부홍반루푸스이며, 양아부터 노인의 이르기까지 지속적인 약물 치료 후 수주에서 수년 이내에 발생하였다. 일반적으로 조직학적 관찰은 장기침묵이 없는 상태로 관찰되었다. 프로톤펌프억제제를 복용한 환자에서 전신홍반루푸스는 피부홍반루푸스보다 덜 흔하게 보고되었다. 프로톤펌프억제제 관련 전신홍반루푸스는 보통 비약물유발전신홍반루푸스보다 더 가벼운 증세를 보인다. 전신홍반루푸스는 주로 젊은층의 성인부터 노인에 이르기까지 초기 약을 치료 후 수일에서 수년 이내에 발생한다. 대다수의 환자는 발진이 나타났거나, 관절통과 권구관조증도 보고되었다.
- 의학적으로 지시된 것보다 더 오랫동안 프로톤펌프억제제를 투여하지 않는다. 만약 이 약을 복용한 환자에서 피부홍반루푸스 또는 전신홍반루푸스가 일치하는 증상이나 징후가 나타나 는 경우, 약물 복용을 중단하고 적절한 전문의에게 환자 평가를 의뢰한다. 대부분의 환자들은 4 ~ 12주 내로 프로톤펌프억제제 중단만을 통하여 개선되었다. 혈청학적 검사(예, 항핵 항체(Antinuclear antibody, ANA))에서 양성으로 나타날 수 있으며, 높은 혈청학적 감시결과 또는 임상 증상보다 해결되는지 시간이 더 소요될 수 있다.
- 저용량 아스피린 요법과 관련된 위궤양 및 십이지장궤양의 재발 억제에 경우, 혈전 또는 색전 형성 억제를 위해 저용량 아스피린을 계속 투여하는 환자에서 이 약을 투여하며 투여 시작 전에 환자에게 위궤양 또는 십이지장궤양의 병력이 있는지 확인해야 한다.

5. 상호작용

- 다른 프로톤펌프억제제 계열 약물과 마찬가지로, 이 약은 간대사적인 CYP-450계를 통해 대사된다. 건강한 성인을 대상으로 실시한 시험에서 이 약은 약제지연된 것은 CYP-450계의 의해 대시되는 와르파린, 페니토인, 테오필린, 디아제판 등과 같은 약물과 임상적으로 유의한 상호작용을 나타내지 않았다(다른 PPI 계열 약물인 오메프라졸의 경우에는 페니토인의 대사, 배설을 지연시켰다는 보고가 있다).
- 약을 포함한 프로톤펌프억제제와 와르파린을 병용투여한 환자들에게서 INR과 프로트롬빈 시간이 증가하였다는 보고가 있었다. INR과 프로트롬빈 시간의 증가는 비정상적출혈과 심지어 사망까지 초래할 수 있다.
- 만제 간 마비크로콜라와 in vitro 시험에서 이 약은 CYP-450(CYP2C19와 CYP3A4)계 효소에 의해 대사되었다. 이러한 시험에서 인해 내 라베프라졸의 혈중농도는 CYP3A4를 저해하거나 유도하지 않았다. 인해 간 마비크로콜라의 in vitro 시험에서 이 약은 시클로스포린의 대사를 저해하였으며, 이때 IC50은 62 μM이었으며, 이 농도는 건강와 자환자 20 mg/kg 1 4일간 복용한 후 측정되는 최고 혈중농도의 50배 이상의 농도이다. 이러한 저해의 정도는 같은농도의 오메프라졸과 유사하다.
- 아타자나비르 ~ 건강와 자환자에 아타자나비르 300 mg/리토나비르 100 mg와 오메프라졸(4 0 mg 1일 1회) 또는 아타자나비르 400 mg와 란소프라졸(60 mg 1일 1회)의 병용투여시 아타자나비르 노출도가 실질적으로 감소하였다. 아타자나비르 흡수는 pH 의존적이다. 이 약과 의 병용투여는 연구하지 않았으나 기타 프로톤펌프억제제에서의 유사한 결과가 예상된다. 따라서 이 약을 포함한 프로톤펌프억제제를 아타자나비르와 동시에 투여하여서는 안 된다.
- 이 약은 위산분비를 억제하여 또한 장기간 계속적으로 저해된다. 화산농도에 따라 흡수에 차이 있는 약물과는 상호작용이 있을 수 있다. 이 약과 병용투여시 경신원에서 케토나올의 혈중농도는 약 30 % 감소, 디곡신의 최저혈중농도는 22 %가 증가하였다. 또한 이 약과 이 트레코나올, 제페티딘을 병용투여시 이들 약물의 혈중 농도가 저하될 우려가 있다. 따라서 이러한 약물과 이 약을 병용투여하여 용량조절이 필요한 경우, 환자별로 모니터링하여 결정하도록 한다.
- 임상시험에서 제산제와 이 약 병용시 제산제와의 상호작용을 확인하기 위해 실시된 시험에서 억제제 제산제와 상호작용이 관찰되지 않았다. 수산화알루미늄염, 수산화마그네슘 함유 제산제와 이 약을 동시에 병용 투여한 경우와 제산제 투여 1시간 후에 복용한 경우 평균 혈중농도차선화면적이 각각 8 %, 6 % 적어되었다는 보고가 있다.
- 저지방 식이를 섭취한 일련의 임상시험에서 흡수피도 임상적으로 상관성 있는 상호작용이 없었다. 고지방 식이와 함께 이 약을 투여하여 이 약의 흡수가 4시간 이상까지 지연될 수 있지만 흡수 정도(AUC)와 최고 혈중농도는 변화 없다.
- 항생제와의 병용 치료 : 16명의 건강한 자환자에게 이 약 20 mg와 아목시실린 1,000 mg, 클래리트로마이신 500 mg을 단독 혹은 병용 투여하고 고차 시험을 시행하였다. 클래리트로마이신과 아목시실린의 AUC와 최고 혈중농도는 단독요법과 유사하였다. 라베프라졸의 AUC와 최고혈중농도는 각각 11 %, 34 % 증가하였으며 14-히드록시클래리트로마이신(클래리트로마이신의 활성 대사제)의 AUC와 최고혈중농도는 단독 투여시의 값에 비해 각각 42 %, 4 6 %로 증가되었다. 이 라베프라졸과 14-히드록시클래리트로마이신 노출의 증가는 임상적으로 유의하지 않은 것으로 보인다.
- 이상반응 사례 보고, 집단약동학 연구(population pharmacokinetic studies) 및 후향적 연구

동에서 메토트렉세이트(주로 고용량을 사용하는 경우, 메토트렉세이트의 사용상의 주의사항 참조)와 프로톤펌프 억제제를 병용하는 경우 메토트렉세이트 그리고또는 그 대사체인 히드록시메토트렉세이트의 혈장 농도가 상승 및 유지되어 메토트렉세이트의 독성이 나타날 수 있다고 보고되었다. 그러나 고용량의 메토트렉세이트와 프로톤펌프억제제에 대한 정식 약물 상호작용연구는 수행되지 않았다.(일반적 주의항 참조)

9) 헤파코박티펄리로 박멸을 위한 항생제 병용요법 : 클래리트로마이신 및/또는 에리트로마이신 을 페오지드와 병용 투여시 산부경맥(QT연장, 심실성 빈맥, 심실세동, Torsades de pointes 포함)이 나타나고 이는 클래리트로마이신 및 에리트로마이신에 의해 이들 약물의 간대사가 방해를 받기 때문인 것으로 외국 의국의 시한후 조사결과 보고되었으며 치명적인 사례도 보고되었다.

10) 이 약과 헤파비린의 병용 시 헤파비린의 혈장농도가 감소할 수 있으므로(위장 pH 증가) 병용 투여해서는 안된다. 이는 헤파비린의 치료효과를 저하시킬 수 있다.

6. 일부 및 수유부에 대한 투여

- 사산의 임신에서 이 약의 안전성에 대한 데이터는 없다. 이 약은 임신중에 금기이다(동물실험 시험에서 임신 엇드의 기관형성기에 경구투여시(400 mg/kg/day) 태자의 골화지연, 분만시 좌상수, 생존자수의 분만율의 감소, 출생자의 체중증가량 저하와 open-field test에서 시행횟수 와 구외이행수의 감소가 관찰되었으며, 분만전·후에 정맥투여시(30 mg/kg/day) 출생자의 지속적인 체중저하가 관찰되었다. 임신 토끼의 기관형성기에 정맥투여시(30 mg/kg/day) 태자의 체중 저하, 골화지연이 관찰되었다.).
- 이 약이 사람의 모유로 이행되는지는 알려져 있지 않다. 수유부에서 어떠한 연구도 행해지지 않았다. 따라서 이 약을 수유중에 사용해서는 안 된다(동물실험에서 유즙중으로 분비되는 것이 보고되었고, 땀트의 분만간·후에 정맥투여(30 mg/kg/day) 출생자의 체중저하가 관찰되었다.).

7. 고령자에 대한 투여

이 약은 노인 환자에서 대사되지만 고령자는 간기능이 저하되어 있는 경우가 많고 이상반응이 나타날 수 있으므로 소하제증상등의 이상반응(이상반응항 참조)이 나타난 경우에는 휴약하는 등 신중히 투여한다.

8. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않다(사용경험이 없다.).

9. 임상감사치제의 영향

간효소증가와 관련되어 드물게 발생한 경우를 제외하고 시험결과와 수지에 특별히 비정상적인 결과는 없었다.

10. 과량투여시의 처리

현재까지는 고의로 과량투여한 경린은 없다. 과량투여에 대한 경향이 제한적이다. 확인된 최고 투여량은 60 mg 1일 2회 혹은 160 mg 1일 1회를 넘지 않는다. 일반적으로 영향을 경미하며 대는 의학적 처치 없이 가역적이다.

복발한 해독제에 대해 알려진 바 없다. 라베프라졸나트륨은 단백결합률이 아주 높아, 쉽게 투석되지 않는다. 과량투여한 경우 증상에 따른 치료를 실시하고, 전체적인 보조 요법을 실시하도록 한다.

11. 적용상의 주의

이 약을 씹거나 부수어 복용하지 않도록 하며, 정제를 한번에 삼켜 복용한다.

12. 보관 및 취급상의 주의사항

- 아연이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 피한다.
- 포장을 개봉한 후에는 습기를 피하여 보관한다. (습기에 의해 함량이 저하될 수 있다.)

13. 기타

- 다른 프로톤펌프억제제 계열(오메프라졸)에 대해 외국에서 시력장애가 나타났다는 보고가 있다.
- 다른 프로톤펌프억제제 계열(오메프리졸, 란소프라졸)에 대해 랫트 장기간 경구투여한 독성 시험에서 위에 카르티노이드가 발생했다는 보고가 있고 이 약에서는 Enterochromaffin-like 세포(ELC세포)의 과형성이 보고되었다.
- 동물실험(랫트)경우에 25 mg/kg이상의 시험시 갑상선증상 및 혈중타우신이 증가했다는 보고가 있으므로 사용자 갑상선기능에 주의할 것.
- 새끼를 이용한 in vitro 복과 동원면이시험에서 약한 유전자변이 유발물질로 판명되었다.
- 동물실험에서 황관산을 나타내는 것으로 보고되었다.
- 동물실험 자료에서 라베프라졸나트륨의 LD50는 단회경구 투여시 마우스에서 > 1,000 mg/kg, 랫트에서 > 1,300 mg/kg 이었다. 라베프라졸나트륨의 처사량은 단회 경구투여시 개에서 > 2,000 mg/kg [식량 권장용량(예, 20 mg/day)의 약 2,500 ~ 5,000배], 단회 정맥투여시 마우스에서 > 200 mg/kg, 랫트에서 > 150 mg/kg 이었다. 마우스에서 100 mg/kg, 랫트에서 300 mg/kg, 개에서 25 mg/kg이상의 초회 경구용량 투여후 피크 혈장 농도는 사람에서의 피크 혈장 농도(Cmax = 427 ng/mL)의 8 ~ 37배 이었다.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 28정(14정/PTP x 2)박스

[제품문의처] 0283451-5500

- * 본 의약품은 엄격한 품질관리를 펼친 제품이며, 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- * 설명서 최종개정일월일 : 2019.03.08
- * 이 제를 설명서 작성(개정)완료일 이후 변경된 내용은 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의 '의약품 검색'란을 통해 확인하실 수 있습니다.
- * 본 의약품 복용 후 부작용(이상반응)이 발생한 경우, 한국약물관안전관리센터(1644-6223)으 로 문의 및 보고하여 주시기 바랍니다.

판매인	한국에자이(주) 서울시 강남구 봉은사로86길 6(신성동) 명당 레베앙드 10층
제조자	Bushu Pharmaceuticals Ltd, Misato Factory 950, Hiroki, Ohaza, Misato-machi, Kodama-gun,Saitama-ken
소분제조자	한국콜마(주) 세종특별자치시 선의면 산단길 215