

[용량] 1. 성인 및 24개월 이상 소아는 아래의 양을 복용(사용)
 1) 요증: 1일 1회 알벤다졸로서 400mg를 복용(사용)한다. 비열을 위하여 7일 뒤, 한번만 더 이약으로서 400mg를 복용(사용)한다. 2) 회충, 십이지장충, 편충, 아메바구충: 이약으로서 400mg를 단회 복용(사용)한다. 3) 분선충의 다른 기생충(중충)과 중증 혼합 감염: 1일 1회 이약으로서 400mg씩

3일간 복용(사용)한다. - 삼키기 어려울 경우 씹거나 소량의 물로 복용(사용)할 수 있으며 식사를 중단하거나 하제(설사약)를 쓰는 등의 특별한 과정은 필요 없다(경제, 자작장애 한함). - 치료 3주 후 검사를 하여 치료되지 않았으면 경우에 따라 2차 투여를 실시할 수 있다.
 ※ 부작용 보고 및 피해구제 신청: 한국약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)

[사용상의 주의사항]

1. 경고: 이 약에 함유되어 있는 인공감미제 아사파탐은 체내에서 분해되어 페닐알라닌으로 대사되므로, 페닐알라닌의 섭취를 규제할 필요가 있는 유전성질환인 페닐케톤뇨증 환자에는 투여하지 말 것.

※1일 허용량제한: 아사파탐 함량을 WHO 권장량(40mg/kg/1일) 이하로 조정(가능한 한 최소량 사용)할 것. 60kg 성인: 1일 최대복용량 2.4g

2. 다음과 같은 사람은 이약을 복용(사용)하지 말 것. 1) 이약 및 이약의 구성성분에 과민응답 환자 2) 입부 및 입상과 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부 3) 2세 미만의 소아 4) 이약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다. 3. 이약을 복용(사용)하는 동안 다음의 약물 복용(사용)하지 말 것. 1) 테오필린: 테오필린의 대사를 억제할 수 있다. 2) 시메티딘, 프라지판렐, 텍사페나소: 알벤다졸의 혈장농도를 증가시킨다. 3) 리토나비어, 페니토인, 카르바마제핀, 페노바르비탈: 알벤다졸의 혈장 농도를 감소시킬 수 있다. 4. 다음과 같은 사람은 이약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상담할 것. 1) 간 장애 환자 2) 신장애(신장장애) 환자 3) 이약은 황색5호(산셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여할 것. 5. 다음과 같은 경우 이약의 복용(사용)을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상담할 것. 상담 시 가능한 한 정부분사를 소지할 것. 1) 피부점막인종후군(스티븐스-존슨 증후군), 다형홍반(여러 모양의 붉은 반점)이 나타날 수 있다. 이러한 경우 투여를 중지하고 적절한 처치를 실시한다. 2) 구역, 구토, 속쓰림, 설사, 상복부 또는 복부(배부분) 통증 등의 위장관 장애 또는 두통 및 어지럼이 나타날 수 있다. 3) 드물게 발열, 전신 발적(종혈피부 발진), 발진, 가려움, 두드러기 등의 과민반응이 나타났다는 보고가 있다. 4) 기억력상(회복 가능성)

탈모증이나 나타날 수 있다. 6. 기타 이약의 복용(사용) 시 주의할 사항 1) 이약 사용 전에는 반드시 임신 중이거나 임신 여부를 확인 한 후에 사용할 것. 임신 초기 동안에 이약의 투여를 피하기 위해서 가임(임신가능성 있는) 연령의 여성은 생리 첫 10일 동안 또는 임신 테스트에서 음성이나 나타난 후에 치료를 시작할 것. 2) 동물 생성 연구 결과 이약은 임부가 투여하였을 때 태아 손상을 유발할 수 있다. 태아와 모체에 서기간행성기간 동안 투여 시(전체 신체 표면적에 대하여 정량화된 사람 권장 용량의 약 0.1 - 0.6 배를 경구 투여 해야 독성 및 골격 변이가 보고 되었다. 태아의 잠재적 위험을 고려하여 임신 가능성이 있는 여성은 이약의 투여기간 동안 및 마지막 투여 이후 3월 까지 효과적인 피임 방법을 사용한다. 3) 임상감사자의 영향 때문에 기억력(회복 가능한) 백혈구 수의 감소를 유발할 수 있고, 경증부터 중등도의 간효소치가 증가할 수 있다. 처방 시 법할 수(전제할 것) 감소율을 유발할 수 있다. 4) 프라지판렐이 알벤다졸 활성대사체의 혈장 농도를 증가시킨다는 보고가 있다. 5) 과량투여 했을 경우 대증요법(증상별로 치료하는 방법) (위세척) 및 일반적인 지지 요법을 사용한다. 6) 조충(baenias) 감염이 높은 지역에서 기존의 뇌유낭미충증(neurocysticercosis)에 대한 알벤다졸 치료가 이루어진 경우, 뇌내 기생충 사멸에 의한 염증 반응으로 발작, 두개 내압상승, 소뇌상승과 같은 신경학적 증상들이 나타날 수 있으며, 증상들은 치료 직후 발생될 수 있다. 이약을 복용한 후 이러한 증상을 보인 환자 들은 바로 의료진과 상담한다. 7. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사 일광을 피하여 건조하고 시원한 곳에 실은 보관할 것. 3) 오용(잘못 사용) - 남용을 피하고, 품질을 보호 - 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것. [저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30℃) 보관 [사용기간] 제조일로부터 36개월 ※ 본 의약품은 엄격한 품질 관리를 통해 품질이 우수합니다. 구입시 사용기한이 경과하였거나 유통과정 중 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다. 제품에 관한 문서는 전화 02-3487-7005으로 하시기 바랍니다. ※ 본 의약품에 대한 기타 정보는 식품의약품안전처 의약품정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>) 의약품정보에서 확인하실 수 있습니다. 개정연월일: 2023.05.02

[원료약품 및 분량] 1정 중 · 유효성분: 알벤다졸(USP) ~ 400.0mg
 · 첨가제 (타르산소): 황색5호 · 동물유래성분: 유당수화물(소, 우유) · 기타첨가제: 옥수수전분, D-만니톨, 아사파탐, 라우릴황산나트륨, 폴리도스테이션화구소, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 카르복시메틸셀룰로오스칼륨, 오렌지미크론, 히드록시프로필셀룰로오스, 폴리크로스베이트80, 히프록셀로오스, 폴리메틸글리콜

6000, 밀크 [성상] 연한 주황색의 장방형 필름코팅제 [효능·효과] 회충, 오충, 십이지장충, 편충, 아메바구충, 분선충의 감염 및 이들 혼합감염의 치료 [계좌의지] (주)한국파비소재와 경기도 안산시 단원구 신대로 83번길 127 [계좌의지] (주)이엔피마 총복 진천군 문배면 농도리 1149 [판매처] 광동생활건강(주) 서울시 서초구 서초대로50길 94, 5층(서초동, 우원빌딩)

오늘 Health 일반의약품 Kwangdong

온 가족이 함께 복용하는 구충제

인콤정(알벤다졸)

이제 안녕~

인 가족 광범위 구충제
1회 1정
쉽어서 드셔도 좋습니다

광동

2정