

탈모의 보조치료

일반의약품

백일후애 캡슐

BAEKILHVAE Cap.

Medical yeast, Ceratin, Thiamine nitrate, Calcium pantothenate, L-Cystine

■ 원료약품 및 그 분량

이 약 1캡슐 중

유효성분 : 약용효모(별규)	100.0mg,
케라틴(별규)	20.0mg,
티아민질산염(KP)	60.0mg,
판토텐산칼슘(KP)	60.0mg,
L-시스틴(KP)	20.0mg,
p-아미노벤조산(USP)	20.0mg

첨가제(타르색소) : 황색5호, 황색203호, 청색1호

기타 첨가제 : 스테아르산마그네슘, 콜로이드성이산화규소, 크로스포비돈, 캡슐제(상부 황녹색, 하부 황색)

■ 성상 : 연회색 가루의 내용물이 든 상부 황녹색, 하부 황색의 경질캡슐제

■ 효능·효과

1. 손상된 모발, 감염성이 아닌 손톱의 발육 부진
2. 탈모의 보조치료

■ 용법·용량

성인 : 1회 1캡슐을 1일 3회 식후에 복용한다.

12세 이상 소아 : 1회 1캡슐을 1일 1~2회 식후에 복용한다.

12세 미만은 복용하지 않는다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응 사람
 - 2) 12세 미만 소아
2. 다음과 같은 사람은 복용 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
 - 2) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여할 것.
3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 1) 위통, 구토 등 위장관 불쾌감과 발한, 빈맥, 가려움, 두드러기, 두통, 어지럼, 홍조
 - 2) 두부 이외의 신체부위에서 발모현상이 나타나는 경우
 - 3) 정해진 용법·용량대로 3~4개월 사용 후에도 증상의 개선이 보이지 않을 경우
 - 4) 증상이 지속되거나 기대하는 효과가 나타나지 않는 경우
4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 1) 설폰아미드 제제와 동시 복용 시 주의할 것.
 - 2) 흉터로 인한 탈모나 안드로젠 유전성 탈모증, 남성형 대머리에는 사용하지 말 것.
 - 3) 이 약은 당뇨병환자에 복용할 수도 있다.
 - 4) 평균 치료 기간은 3~6개월이다.
5. 저장상의 주의사항
 - 1) 사용기한이 초과된 것은 복용하지 말 것.
 - 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 3) 의약품용 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■ 저장방법 : 차광기밀용기, 25℃이하 보관

■ 포장단위 : 180캡슐[(10캡슐/PTP×9)×2Box]

■ 이 첨부문서 작성일자 2019년 3월 4일 이후 변경된 내용은 **온라인의약품도서관**(<http://drug.mfds.go.kr>) 또는 **동광홈페이지** : www.dkphm.com에서 확인할 수 있습니다.

■ 제품 사용 후 부작용이 발생한 경우 **한국의약품안전관리원**(☎1644-6223)에 부작용 피해 구제 신청을 할 수 있습니다.

● 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한 또는 유효기한이 경과하였거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

DK040319

제조원자 :

 **동광제약주식회사**

경기도 평택시 산단로 115

제조사 :

 **(주)마더스제약**

경상북도 경산시 진량읍 공단6로24길 18

● 수신자부담 소비자 상담실 : 080-776-1472

KGMP적격업체제품

본 제품은 우수외약품제조관리기준에 적합하게 제조되었습니다.