

· 반드시 첨부문서를 읽은 후 사용(복용)하시고 첨부문서는 약과 함께 보관하십시오.
· 올바른 사용(복용)법을 모르거나 의문사항이 있는 경우, 의사·약사와 상담하시기 바랍니다.



영양균형을 위한 비타민

비라벨® 정

일반의약품

【원료약품의 분량】 1정 중

유효성분 명	규격	분량
벤포티아민	KP	50mg(타이민염산염으로서 36.15mg)
리보플라빈	KP	50mg
니코틴산아미드	KP	50mg
판토텐산칼슘	KP	30 mg(칼슘으로서 2.52mg)
피리독신염산염	KP	50mg
d-비오틴	EP	0.2mg
폴산	KP	0.4mg
시아노코발라민1000배산	KP	50 mg(시아노코발라민으로서 50μg)
제피아스코르브산	별규	104.17 mg(아스코르브산으로서 101.05mg)
콜린타르타르산염	DAB	50 mg
이노시톨	KP	50 mg
클레칼시페롤과립	별규	4 mg(비타민D로서 400IU)
무수인산수소칼슘	KP	100 mg(총 칼슘으로서 31.93mg, 칼슘으로서 29.1mg)
산화마그네슘	JP	100mg(마그네슘으로서 60.3mg)
산화아연	JP	21.2mg(아연으로서 17.03mg)
셀레늄함유건조효모	KP	17mg(셀레늄으로서 22.1μg)
DL-메티오닌	KP	50mg
γ-오리자놀	KP	5mg

(동물유래성분) ※클레칼시페롤과립(클레스테롤: 기원동물 - 양, 사용부위 - 양모(라놀린))

첨가제(타르색소) : 황색4호, 황색5호

기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이III노란색(85F12380), 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 콜로이드성 이산화규소, 크로스카르멜로오스나트륨

【성 상】

주황색의 타원형 필름코팅정

【효능 · 효과】

* 다음 경우의 비타민 D, B₁, B₂, B₆, C의 보급

- 육체피로 - 임신·수유기 - 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시 - 발육기 - 노년기

- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.

▪ 비타민D(클레칼시페롤) : 뼈, 이의 발육분량 · 구루병의 예방

▪ 비타민B₁(벤포티아민) : 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등) · 각기 · 눈의피로

▪ 비타민B₂(리보플라빈), 비타민B₆(피리독신염산염) : 다음 증상의 완화 : 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염),

설염(혀염), 습진, 피부염

* 아연의 보급

【용법 · 용량】

만 12세 이상 및 성인: 1회 1정씩 1일 1회 복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

1) 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장(콩팥)질환 환자

2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자

3) 만 12개월 미만의 젖먹이

4) 신장결석 환자

5) 심한증상의 신부전 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제

2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

1) 의사의 치료를 받고 있는 환자

2) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)

3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아

① 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다

4) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성(특정 부분에 나타나는)대장염 등의 위장질환 환자

5) 심장·순환기계기능 장애 환자

6) 신장장애 환자

7) 저단백혈증 환자

8) 강심배당체를 투여 중인 환자

9) 통풍환자 또는 신장결석이 있는 환자

10) 신장결석 병력이 있는 환자

11) 이 약은 황색5호(선텔레로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

12) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

13) 임부

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약의 투여에 의하여 다음과 같은 증상이 있을 경우 : 구역, 구토, 설사, 묽은 변, 식욕부진, 복부(배부분)팽만감, 변비, 저혈압, 열갈달아오름, 심박동불규칙, 피부발진, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계기능저하, 피부염, 땀·호흡시 악취, 탈모, — 뒷면계속

조급증, 위장관장애, 소화 장애, 상복부통증, 폐부종(부기)

2) 장기간 고통량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.

3) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.

4) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10μg이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.

5) 고통량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당 내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.

6) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.

7) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다.

8) 항알도스테론제, 트리암테넨과 병용(함께 복용(사용))투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.

9) 우발적으로 과량복용한 경우

10) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용시 주의사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것

2) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.

3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.

4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것

3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1 ~ 30 ℃)보관

【포장단위】 60정/병

【문의전화】 본사 : (02)2021-9300, 소비자상담실 : 080-023-1897(수신자요금부담)

【제조회사】 동화약품(주), 충청북도 충주시 충주산단1로 167

【제조지】 한국광복(주), 세종특별자치시 전의면 산단길 245

※ 본 의약품은 KGMP 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품이 발견될 경우 공정거래위원회고시 소비자 분쟁해결기준에 의거, 구입처를 통하여 교환 또는 환불 받을 수 있습니다. 본 의약품에 대한 자세한 허가사항은 동화약품(주) 홈페이지(www.dong-wha.co.kr) 또는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)을 참조해주시기 바랍니다.

※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원 (1644-6223)

※ 이 첨부문서 작성일자(2019년 10월 2일) 이후 변경된 내용은 www.dong-wha.co.kr에서 확인하실 수 있습니다.