

KGMP적격업체

고함량 마그네슘 + 활성비타민 함유

일반의약품

마그감마

맥스

연질캡슐

[개요 및 특징]

마그감마맥스연질캡슐은 마그네슘, 토포페롤아세테이트, 티아민질산염, 피라독신염산염, 감마오르자놀을 함유하는 제품으로서, 마그네슘 결핍으로 인한 근육경련을 개선하고, 육체피로, 신경통, 근육통, 관절통(요통/허리), 어깨결림 등) 완화, 말초혈행장애 및 경년기 시 어깨·목결림, 수족저림·수족냉증(손발이 차가움)에도 효과적입니다.

(※토포페롤아세테이트: 비타민D, 티아민질산염: 비타민B₁, 피라독신염산염: 비타민B₆)

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중

유효성분:

토포페롤아세테이트(KP)	500.00mg(비타민D로서 500IU)
산화마그네슘(KP)	250.00mg(마그네슘으로서 150.78mg)
피라독신염산염(USP)	50.00mg
티아민질산염(KP)	50.00mg
감마오르자놀(KP)	5.00mg

(※토포페롤아세테이트: 비타민D, 티아민질산염: 비타민B₁, 피라독신염산염: 비타민B₆)

첨가제(타르색소): 적색40호, 황색5호, 청색1호

첨가제(동물유래): 숙신산칼륨(돈피)

기타첨가제: 풍기름, 황납, 레시틴, 폴리크로메이드B20, 글리세린, 산화티탄

[성상] 화학색의 유사 내용물을 함유한 입각색의 장형형 연질캡슐

[효능·효과] 1. 다음 경우의 비타민 E, B₁, B₆의 보급

- 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하 시, 노년기

- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능: 효과는 다음과 같습니다.

- 말초혈행장애 및 경년기 시 다음 증상의 완화: 어깨·목결림, 수족저림·수족냉증(손발이 차가움)
- 다른 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 살염(여염), 습진, 피부염
- 각기, 노인피로
- 마그네슘결핍으로 인한 근육경련

[용법·용량] 만 12세 이상 및 성인 1일 2회, 1회 1캡슐 복용

※ 충분한 양의 물과 함께 복용합니다.

※ 캡슐포장의 불충분 부분을 화살표방향으로 누르고 알약인 개내 복용합니다. 이 때 실수로 알짜미는 포장을 함께 복용하는 일이 없도록 합니다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것
- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 2) 만 12개월 미만의 젖먹이
- 3) 심한 증상의 신부전 환자
- 4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
- 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- 2) 레보도파
3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자

- 2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- 3) 심장·순환계가 기능 장애 환자
- 4) 신장장애 환자
- 5) 저단백혈증 환자
- 6) 임부
- 7) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 해당염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
- 8) 이 약은 황색·호선색으로 FCF, Sunset Yellow FCF를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것
- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우: 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 말적, 구역, 구토, 붉은 변, 붉은 민점, 부관수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.
- 3) 예스트로겐을 포함한 경우용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.
- 4) 피라독신을 1일 500mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
- 5) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 6) 할랄요스테르제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼혈혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
- 7) 우발적으로 과량복용 한 경우
- 8) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
- 1) 장해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용후에는 피할 것.
- 3) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 정기할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 제와배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 존재되어 있는 지방의 양을 고려하여 이 지질제의 투여량을 감소해야 한다.
6. 저장상의 주의사항
- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[포장단위] 60캡슐(10캡슐/PTP[®]6), 120캡슐(10캡슐/PTP[®]12)

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[제조외국] 구주제약(주)/경기도 화성시 장남면 덕철제길 5

[제조자] 코스맥스바이오(주)/충청북도 제천시 바이오밸리3로 3

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입 시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여드립니다.

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 정당한 소비자 피해에 대해 보상해드립니다.

※ 의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>) → 의약품 정보 검색을 참조하시기 바랍니다.

※ 의약품 무작중신고 및 피해구제 신청: 한국약물안전관리원(1644-6223)

※ 대표전화: 02-2672-1122 / 제품문의: 080-655-1414 / 홈페이지: www.guju.co.kr

설명서 문안 최종개정년월일: 2019. 04. 05

(I-1901)

