

규격	100x260
종이	70모조
접지	100x43
삼진기획	

조 제 용
일반의약품

말초동맥순환장애

징코에프정 40mg

(은행엽건조엑스)

HT-190314

GINKGO-F Tab. 40mg

【원료약품 및 분량】 1정 중

유효성분 : 은행엽건조엑스(생규) 40.0mg

첨가제(동물유래) : 유당(젖당)수화물<기원동물 : 소, 사용부위 : 우유>

첨가제(타르색소) : 청색 1호 알루미늄레이크, 황색 203호 알루미늄레이크

기타첨가제 : 이겔정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이(85G41016(그린), 크로스카르멜로오스 나트륨, 탭크

【성 상】 연녹색의 장방형 필름코팅 정제

【효능·효과】

1. 주효능 효과

- 1) 말초동맥 순환장애(간헐성 파행증(이따금 절뚝거림))의 치료
- 2) 어지러움, 혈관성 및 퇴행성 이명(귀울림)
- 3) 이명(귀울림), 두통, 기억력감퇴, 집중력장애, 우울감, 어지러움 등의 치매성 증상을 수반하는 기질성 뇌기능장애의 치료

【용법·용량】

성인

- 1) 말초동맥순환장애, 어지러움, 이명(귀울림) : 은행엽건조엑스로서 1회 40mg 1일 3회 또는 1회 80mg, 1일 2회 경구투여한다.(먹는다, 복용한다)
 - 2) 기질성 뇌기능장애 : 은행엽건조엑스로서 1회 40~80mg 1일 3회 또는 1회 120mg 1일 2회 경구투여한다.(먹는다, 복용한다)
- 연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 이 약에 과민증 환자
- 2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당) 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.

2. 부작용

- 1) 드물게 가벼운 위장관 불쾌감, 두통, 알레르기성 피부반응이 나타날 수 있다.
- 2) 국내 자발적 이상사례 보고자료(1989~2013년)를 분석한 결과, 이상사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 이상사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례는 다음과 같이 나타났다. 다만, 이로서 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.
 - 어지러움
 - 가려움증

3. 일반적 주의

이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 않는다.

4. 임부에 대한 투여

동물실험에서 기형발생은 없었으나 임신중의 투여에 대한 충분한 사용경험이 적다.

5. 소아에 대한 투여

소아의 사용경험이 충분하지 않으므로 12세 이하의 소아에는 투여하지 않는다.

6. 저장상의 주의사항

직사광선을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여뚜껑을 꼭 닫아, 단단히 마개로 막아 보관한다.

【포장단위】 30정/병, 300정/병

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패 또는 오손된 제품 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 본 제품에 대하여 자세한 정보를 원하시는 분은 소비자상담실(☎031-377-7909)로 문의하시기 바랍니다.

※ 이 첨부문서 개정일자 이후 변경된 내용은 한국휴텍스제약(주) 홈페이지(www.hutechs.co.kr)에서 확인해 주십시오.

약은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다.



한국휴텍스제약(주) 우수약품제조관리기준 KGMP 적격공장

경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 99

제조의뢰자 : 한국휴텍스제약(주) 경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 99

제 조 자 : (주)한국파마 경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 87

성명서 작성일 : 190314