

골다공증 치료제

전문 의약품

록시스타정

라록시펜염산염

60mg

■ 원료약품 및 분량 : 1정 중

- 유효성분 : 라록시펜염산염(USP) 60.0mg
- 첨가제(동등유래성분) : 무수우유(기원 : 소, 사용부위 : 우유), 유당수화물(기원 : 소, 사용부위 : 우유)
- 기타첨가제 : 스테아르산과 그나세움, 오피드라이하인색(03B28796), 크로스코비돈, 포비돈, 폴리크로메이트80, 푸마린산스테아릴나트륨

■ 성상

흰색의 타원형 필름코팅정

■ 효능·효과

폐경 후 여성의 골다공증 치료 및 예방

■ 용법·용량

라록시펜염산염으로서 1일 1회 60mg을 경구투여한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 기각

- 이 약 투여시 정맥혈전색전증 발현의 위험성은 현재 사용되고 있는 호르몬대체요법시 보고된 위험성과 유사하게 증가하고 있다. 혈인과 상관없이 정맥혈전색전증의 위험성에 있는 환자들에 대해서는 위험성과 이점을 비교해야 한다. 움직일 수 없는 기간을 연장할 수 있는 질환 또는 상태가 발생하는 경우에는 이 약의 투여를 중지해야 한다. 질환이 발생하지마지나 신속히 또는 움직일 수 없기 전 3일부터는 약물투여를 중지해야 한다. 초기상대로 회복되고 움직임이 완전해진 후에 치료를 다시 시작할 수 있다.
- 이 약은 주로 간에서 대사된다. 간경변과 경증의 간장애(Child-Pugh class A)가 있는 환자에 대하여 이 약을 단독투여 하였을 때 이 약의 혈중 농도는 대조군의 약 2.5배였다. 이러한 증가는 총 빌리루빈 농도와 관련이 있었다. 간기능부전 환자에 대한 안전성과 유효성을 평가하기 전에는 이들 환자군에 대한 이 약의 투여를 권장하지 않는다. 혈청 총 빌리루빈, γ -GTP, ALP, ALT와 AST의 수치 상승이 관찰되면 치료기간 중 자세히 관찰해야 한다.
- 이 약은 폐경 전 여성에 대하여 적응증이 확보되지 않았다.
- 관상동맥 심장질환이 보고되었거나 관상동맥 사색 위험이 증가한 폐경기 이후 여성의 연구에서 이 약은 위약 투여군과 비교시 심근경색, 입원을 요하는 급성 관상동맥 증후군, 총 심혈관 사망률을 포함한 총 사망률, 또는 뇌졸중 발현에 영향을 끼치지 않았다. 그러나 이 약을 투여한 여성에게서 뇌졸중으로 인한 사망률의 증가가 있었다. 뇌졸중으로 인한 사망률은 위약 투여군에서 연간 여성 1,000명당 1.5명인데 비해, 라록시펜은 연간 여성 1,000명당 2.2명이었다. 뇌졸중의 병력이 있거나 일과성 뇌허혈 발작 또는 심방 세동과 같은 기타 유익한 뇌졸중 위험 요인이 있는 폐경기 이후 여성에게 이 약을 처방할 경우에는 이러한 소견이 고려되어야 한다.
- 이 약은 심혈관계 질환의 1차 또는 2차 예방을 위해 사용해서는 안 된다. 관상 심장 질환이 있거나, 주요 관상 동맥 이상의 위험이 증가된 폐경 후 여성에 대한 시험에서, 5년간 이 약을 투여한 후 심혈관계에 대한 유익성은 입증되지 않았다.
- 전신 에스트로겐과 이 약의 병용 사용에 대한 안전성은 확립되지 않았으므로, 이 약과 전신 에스트로겐의 병용 사용은 권장되지 않는다.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부(임신중에 이 약을 복용하는 경우에는 태아에 대하여 선천적인 결함의 위험성이 증가할 수 있다. 이 약이 모유로 이행하는지 여부는 알려지지 않았고 많은 약물들이 모유로 이행되므로, 수유부에게 투여하지 않는다.)
- 심정맥 혈전증, 폐색전증, 망막 정맥 혈전증을 포함한 정맥혈전색전증의 환자 또는 그 병력이 있는 환자 (이상반응으로 정맥혈전색전증이 보고되었으므로, 이 환자에 투여시 이 증상이 악화될 수 있다.)
- 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응 및 그 병력이 있는 환자
- 담즙울체 등을 포함한 간장애 환자
- 원인을 알 수 없는 자궁 출혈 환자
- 자궁내막암의 징후 또는 증상이 있는 환자(안전성 연구가 적절히 시행되지 않았다.)
- 장기부동상태(수술 후 회복기, 장기이전기 등에 있는 환자(경고 항 참고)
- 항인지질항체증후군 환자(정맥혈전색전증을 일으키기 쉽다는 보고가 있다.)
- 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malsorption) 등의 유전적 인 문제 가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.(유당함유 제품에 한함)

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 경구용 에스트로겐 치료에서 현탁액 고당성지질혈중(5.6 mmol/L 또는 500 mg/dL)의 병력이 있는 환자(이 약 투여시 혈중 중성지방의 상승이 나타난다는 보고가 있으므로, 이러한 병력이 있는 환자에는 혈중 중성지방 수치를 모니터링한다.)
- 중등도 또는 중증 신장애 환자 (유효성과 안전성이 확립되지 않았다.)
- 이상반응
 - 임상시험에서의 이상반응

- 13,000명 이상의 폐경기 이후 여성에 대한 골다공증 치료와 예방 임상시험들에서 이상반응이 보고되었다. 이러한 시험들에서 투약기간은 6 ~ 60개월이었다. 대부분의 이상반응은 치료 중단을 필요로 하지 않았다.
- 예방목적의 시험군에서 이상반응으로 인하여 치료를 중단한 환자는 이 약 투여군 581명 중 10.7 %이었고 위약 투여군 584명 중 11.1 %이었다. 치료목적의 시험군에서 임상적 이상반응으로 인하여 약물 투여를 중단한 환자는 이 약 투여군 2,557명 중 12.8 %이었고 위약 투여군 2,576명 중 11.1 %이었다.
- 골다공증 임상시험에서 이 약과 관련된 이상반응은 아래와 같으며, 기관별 발현 빈도에 따라 구분하였다. 매우 자주($\geq 1/10$), 자주($\geq 1/100$, $< 1/10$), 때때로($\geq 1/1,000$, $< 1/100$), 드물게($\geq 1/10,000$, $< 1/1,000$), 매우 드물게($< 1/10,000$), 빈도 불명(수집된 자료에서 평가할 수 없음)
 - 혈관계 : 매우 자주 혈관확장(홍조), 때때로 심정맥 혈전증, 폐색전증, 망막 정맥 혈전증, 표재성 정맥혈전 정맥염(Superficial vein thrombophlebitis)을 포함한 정맥혈전색전증
 - 근골격계 및 결합조직계 : 자주 다리 경련
 - 전신 및 투여부위 : 매우 자주 감기증상, 자주 말초 부종
- 위약 투여군과 비교하였을 때 혈관확장(안면홍조)의 발현은 이 약 투여군에서 약간 증가하였다(폐경 후 2 ~ 8%이 경과한 여성에 대한 골다공증 예방을 위한 임상시험에서 이 약 투여시 24.3 %, 위약 투여시 18.2 %, 평균 연령 66세인 여성에 대한 골다공증 치료를 위한 임상시험에서 이 약 투여시 10.6 %, 위약 투여시 7.1 %). 이러한 이상반응은 치료 초기 6개월 동안 가장 흔하였으며, 이후에는 거의 발생하지 않았다.
- 관상동맥질환이 있었거나 관상동맥질환 위험이 높은 10,101명의 폐경기 이후 여성에 대한 시험(RUTH)에서 혈관확장(안면홍조)의 발현은 이 약 투여군 중 7.8 %이었고 위약 투여군 중 4.7 %이었다.
- 골다공증에 대한 이 약의 모든 위약 대조 시험에서 심정맥 혈전증, 폐색전증, 그리고 망막 정맥 혈전증을 포함한 정맥혈전색전증이 0.8 % 또는 연간 1,000명당 3.22례의 빈도로 발생하였다. 위약군과 비교하여 이 약 투여군에서 1.60CI 0.95, 2.71)의 상대적 위험성을 관찰하였다. 혈전증의 위험성은 치료 초기 4 개월 동안 가장 컸다. 표재성 정맥혈전정맥염의 발생 빈도는 1 % 미만이었다.
- RUTH 시험에서 정맥혈전색전증이 이 약 투여군에서 약 2.0 % 또는 연간 1,000명당 3.88례의 빈도로 발생되었고, 위약 치료군에서 약 1.4 % 또는 연간 1,000명 당 2.70례의 빈도로 발생되었다. RUTH 시험에서 모든 정맥혈전색전증에 대한 위험율(HR)은 1.44(1.06 ~ 1.95)이었다. 표재성 정맥혈전정맥염은 이 약 투여군에서 1 %, 위약 투여군에서 0.6 %가 발생되었다.
- 기타 이상반응은 다량경련(예방목적의 환자군에서 이 약 투여시 5.5 %, 위약투여시 1.9 % ; 치료목적의 환자군에서 이 약 투여시 9.2 %, 위약 투여시 6.0 %)이었다. RUTH 시험에서 다량경련은 이 약 투여군에서 12.1 %, 위약 투여군에서 8.3 % 발생하였다.
- 감기 증상(Flu syndrome)은 이 약 투여시 16.2 %, 위약 투여시 14 %에서 보고되었다.
- (1) 통계적으로 유의하지는 않지만($p > 0.05$), 유의한 용량 비례 경향을 나타낸 변화가 있었다. 이는 말초 부종으로 예방 환자군에서 이 약 투여시 3.1 %, 위약 투여시 1.9 %이었으며, 치료환자군에서 이 약 투여시 7.1 %, 위약 투여시 6.1 %이었다. RUTH 시험에서 말초부종은 통계적으로 유의하게 이 약 투여군에서 14.1 %, 위약 투여군에서 11.7 %가 발생되었다.
- 골다공증을 위한 위약 대조 시험에서 이 약 투여하는 동안 혈소판 수의 약간 감소(6 ~ 10 %)가 보고된 바 있다.
- AST 및/또는 ALT의 중등도 상승이 드물게 보고되었으며, 이 약과의 관련성을 배제할 수 없다. 위약 투여군에서도 유사한 빈도로 증가하였다.
- 관상동맥질환이 있었거나 관상동맥질환 위험이 높은 폐경기 이후 여성에 대한 시험(RUTH)에서, 담석증의 추가적인 이상반응이 이 약 투여군에서 3.3 %, 위약 투여군에서 2.6 % 발생되었다. 이 약 투여군의 담낭절제율 2.3 %은 위약 투여군의 2.0 %와 통계적으로 유의한 차이가 없었다.
- 몇몇 임상시험에서 복합호르몬제의 지속적인 대체요법(110명) 또는 주기적인 대체요법(205명)과 이 약 (317명)을 비교하였다. 유방 증상과 자궁 출혈의 발현은 호르몬대체요법 환자보다 이 약 투여 환자에서 유의하게 낮았다.

2) 시판 후 사용

- 시판 후 보고된 이상반응은 아래와 같다.
 - 혈액 및 림프계 : 매우 드물게 혈소판감소증
 - 소화기계 : 매우 드물게 구역, 구토, 복통, 소화불량과 같은 위장관 증상
 - 전신 및 투여 부위 : 드물게 말초 부종
 - 감사(Investigation) : 매우 드물게 혈압 상승
 - 정신신경계 : 매우 드물게 만두통을 포함한 두통
 - 피부 및 피하 조직계 : 매우 드물게 발진
 - 생식기계 및 유방 : 매우 드물게 통증, 경대 및 임통과 같은 경증의 유방 증상
 - 혈관계 : 드물게 정맥혈전색전증, 매우 드물게 동맥혈전색전증, 망막정맥폐쇄(retinal vein occlusion), 뇌졸중, 심정맥혈전색전증(VTE)과 관련된 사망
- 국내 시판 후 조사 결과 : 국내에서 재심사를 위하여 6년 동안 13,703명을 대상으로 실시한 사용성적조사 결과, 이상반응 발현율은 1.89 %/259/13,703명)로 보고되었고 이 약의 인과관계가 있는 것으로 조사된

것은 0.75 %/103/13,703명)이었다. 안면홍조 0.31 % (43/13,703명), 질출혈 0.04 %/5/13,703명), 얼굴부종, 속쓰림, 변비, 가려움, 발진 각 0.03 %/4/13,703명), 소화불량증, 심계항진 각 0.02 %/3/13,703명) 등의 순으로 나타났다. 이 중 시판 전 임상시험에서 나타나지 않았던 새로운 이상반응은 질출혈 5명, 가려움 4명, 심계항진 3명, 발열, 무력, 발한, 근육통, 불면, 회음통(여성), 체중증가, 관절염, 류마티스관 각 2명, 통풍, 피로, 답답함, 흉부영차동통, 피부발진, 불안, 체중감소, 경련, 호흡곤란, 시각 이상, 미각이상 각 1명 순이었다.

5. 일반적 주의

- 이 약은 자궁내막증식을 유발하지 않는다. 이 약 투여 중 발생한 어떤 자궁출혈도 예기치 않은 것이며, 전문가에 의해 충분히 조사되어야 한다. 이 약 투여 중 발생한 자궁출혈과 관련된 가장 흔한 두 가지 진단은 자궁내막 위축과 양성의 자궁내막폴립이다. 4년간 이 약을 복용한 폐경기 여성에서 양성의 자궁내막폴립 발현율은 0.9 %이었으며, 위약을 복용한 여성에서는 0.3 %이었다.
- 유방암 환자에 대한 이 약의 안전성은 충분히 연구되지 않았다. 초기 또는 진행된 유방암에 대한 치료 약물과 이 약을 병용할 수 있는 지에 대한 자료는 없다. 따라서 골다공증의 치료 및 예방을 위해서는, 유방암 치료를 완료한 후에도 오벌 관리 포함) 이 약을 투여해야 한다. 또한, 복용기간 동안 유방에 이상증상이 있을 경우 적절한 감사를 수행한다.
- 침습성 유방암 발생에 미치는 이 약의 영향 : 골다공증에 있는 폐경 후 여성에 대한 위약대조 임상시험에서 위양성의 발생률을 평가한 결과 에스트로겐 수용체 양성 침습성 유방암의 발생률이 감소하였으나, 에스트로겐 음성 침습성 유방암의 발생률은 감소하지 않았다. 주요 관상동맥 질환의 위험도가 높은 폐경 후 여성에 대한 위약대조 임상시험에서 이 약 60 mg을 1일 1회 투여하였을 때 침습성 유방암의 발생률은 위약에 비해 에스트로겐 수용체 양성 여성의 침습성 유방암은 55 % 감소하였으나, 에스트로겐 수용체 음성의 침습성 유방암에서는 감소하지 않았다.
- 이 약은 남성에게는 사용되지 않는다.
- 이 약은 에스트로겐 결핍에 따른 혈관확장(hot flushes) 또는 기타 폐경 증상을 감소시키는 효과는 없다.
- 식사를 통한 섭취가 불충분한 경우, 칼슘 및 비타민D를 보충하여 복용하도록 해야 한다.
- 흡연 및 음주 등의 습관이 있는 경우는 체중조절 운동과 함께 습관을 고치도록 권한다.
- 운전 또는 기계 사용 능력에 대하여 이 약의 영향은 알려지지 바 없다.

6. 상호작용

- 탄산염 또는 수산화알루미늄, 수산화마그네슘을 포함하고 있는 제산제와 동시투여는 이 약의 전신적 노출에 영향을 주지 않는다.
- 이 약과 와르파린의 병용투여는 두 약물의 약물동력학적 양상에 변화를 주지 않는다. 그러나 프로트롬빈 작용 시간이 약간 감소하였으며, 이 약을 와르파린 또는 다른 쿠마린 유도제와 병용투여할 때에는 프로트롬빈 작용시간을 관찰해야 한다. 쿠마린 혈액응고지지제를 이미 사용하고 있는 환자에게 이 약 투여를 시작한다면 프로트롬빈 작용시간에 대한 영향은 몇 주동안 나타날 수 있다.
- 이 약은 단회투여시 메틸프레드니솔론의 약물동력학적 양상에 영향을 주지 않는다.
- 이 약은 다국신의 항상상태 AUC에 영향을 주지 않는다. 다국신의 C_{max} 는 5 % 미만 증가하였다.
- 이 약의 혈중 농도에 대한 병용약물의 영향을 예방 및 치료 시험에서 평가하였다. 빈번하게 병용투여하는 약물들로는 아세트아미노펜, 비스테로이드소염진통제(NSAID)에, 아세탈살살신, 이부프로펜, 나프록센, 경구용 항생제, H₂ 길항제, H₂ 길항제, 그리고 벤조디아제핀 등이 있다. 이와 같은 약물들과의 병용투여는 이 약의 혈중 농도에 대하여 임상적으로 관련있는 영향은 없었다.
- 임상시험에서 위축성 질염을 치료기 필요하면, 질에 적용하는 에스트로겐은 병용이 가능했다. 위약과 비교하여 이 약 투여 환자에서 사용은 필요하지 않았다.
- 디아제핀, 디아옥시드, 리도카인과 같은 단백결합력이 높은 약물과의 병용은 주의해서 사용한다. 확인되지는 않았으나, 이 약은 다른 약물의 단백질결합에 영향을 미칠 수 있다. 이 약은 혈장 단백질에 95 % 이상 결합한다. In vitro에서 이 약은 와르파린, 페니토인 또는 비록시펜의 결합을 방해하지 않았다.
- 콜레스테라틴(또는 기타 음이온 교환수지)은 이 약의 흡수와 장간순환을 유의하게 감소시키므로 병용 투여해서는 안된다.
- 임파괴선과 병용투여시 이 약의 최고농도는 감소한다. 그러나 이 약의 전반적인 흡수 범위와 배설률에는 영향을 주지 않으므로, 이 약은 임파괴선과 병용투여 할 수 있다.
- 이 약으로 치료하는 동안, 다음과 같은 변화가 자주 관찰된다 : 혈청 HDL -2 cholesterol subtraction 및 apolipoprotein A1의 증가, 혈청 총 콜레스테롤, LDL 콜레스테롤, 피브리노겐, apolipoprotein B 및 lipoprotein(a)의 감소.
- 이 약은 총 호르몬 농도 증가와 일치하는 호르몬 결합성 글로불린 농도(성호르몬 결합 글로불린(SHBG), 티록신 결합 글로불린(TBG), 코르티코스테로이드 결합 글로불린(CBG))을 약간 증가시킨다. 이와 같은 변화는 우리 호르몬의 농도에 영향을 주지 않는다.

7. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 이 약은 폐경기 여성에게만 사용한다.
- 기임여성은 이 약을 복용해서는 안 된다. 이 약은 임부에게 투여시 태아에 손상을 줄 수 있다. 만약 임신 중 이 약을 잘못 투여하였거나 약물투여 기간에 임신한 경우에는 태아에 미칠 수 있는 잠재적인 위험을 환자에게 알려야 한다.
- 이 약이 모유로 이행되는지 확인되지 않았다. 따라서 수유부에 대한 사용은 권장하지 않는다. 이 약은 수유아의 발달에 영향을 줄 수 있다.

8. 소아에 대한 투여

소아에 대한 유효성과 안전성이 확보되지 않았으므로, 소아에게는 투여하지 않는다.

9. 고령자에 대한 투여

7,706명의 폐경 후 여성에 대하여 실시한 골다공증 치료 임상에서, 4,621명의 여성이 고령자(65세 이상)로 간주 되었다. 이 중 845명의 여성이 75세 이상이었다. 골다공증 치료 임상시험에서 고령 또는 폐경 후 여성에서의 안전성 및 유효성이 동등하였다.

10. 과량투여시의 처리

- 임상 연구에서 8주 간의 일일 용량 600 mg과 3년 간의 일일 용량 120 mg은 내약성이 좋았다. 동물실험에서 췌트와 마우스에 5,000 mg/kg(체표면적을 기준으로 각각 사람의 81배, 405배)을, 원숭이에게 1,000

mg/kg(사람 AUC의 80배)을 1회 경구 투여 했을 때, 치사성은 없었다.

- 시험에게 단일 용량으로 120 mg 이상 투여한 경우 다리 경련과 어지럼이 보고되었다. 2세 이하 영아에게 시고로 과다 복용된 경우, 보고된 최대 복용량은 180 mg 이었다. 어린이에게 시고로 과다 복용된 경우 증상은 운동실조, 어지럼, 구토, 발진, 설사, 진전, 홍조, ALP의 증가였다.
- 최대로 투여된 과다 용량은 약 1.5 g이었다. 과량투여와 관련된 사망은 보고되지 않았다.
- 이 약에 대한 특정 해독제는 없다.

11. 의약품동등성시험 정보^{*)}

시험약 라록시펜염산염정60밀리그렘(주)휴온스)과 대조약 에비스타정60밀리그렘(한국다케다제약주)을 2x2 교차시험으로 각 1정씩 건강한 성인 54명에게 공복 시 단회 경구 투여하여 혈중 라록시펜을 측정 한 결과, 비교평가항목지(AUC, C_{max})를 로그변환하여 통계처리하였을 때, 평균치 차의 90% 신뢰구간이 log0.8에서 log1.25 이내로서 생물학적으로 동등함을 입증하였다.

구분		비교평가항목		참고평가항목	
		AUC _{0-96hr} (pg·hr/mL)	C _{max} (pg/mL)	T _{max} (hr)	t _{1/2} (hr)
대조약	에비스타정 60밀리그램(한국 다케다제약(주))	9429±4819	284.7±156.8	5.00 (5.00-24.0)	20.51±6.22
시험약	라록시펜염산염정 60밀리그램 (주)휴온스	9403±4525	310.9±246.1	6.00 (5.00-24.0)	23.42±12.61
90% 신뢰구간* (기준 : log 0.8 ~ log 1.25)		log0.9327~ 1.0895	log0.8942~ 1.1300	-	-
(AUC, C _{max} , t _{1/2} : 평균값±표준편차, T _{max} : 중앙값(범위), n=54)					
AUC: 투약시간부터 최종혈중농도 정량시간 t까지의 혈중농도-시간곡선하면적					
C _{max} : 최고혈중농도					
T _{max} : 최고혈중농도 도달시간					
t _{1/2} : 일단 소실 반감기					
*비교평가항목치를 로그변환한 평균치 차의 90%신뢰구간					

주1. 이 약은 (주)휴온스 라록시펜염산염정60밀리그렘과 동일한 원료를 사용하여 동일한 제조 방법으로 전 공정 (주)휴온스에 위탁 제조하였음

12. 기타

발암성, 변이원성, 생식독성

- 췌트에 대한 2년간의 발암성 연구에서, 279 mg/kg 암컷군에서 난소암 발현이 증가하였다. 이 시험군에서 이 약의 AUC는 60 mg을 복용한 폐경기 여성의 약 400배였다. 마우스에 대한 21개월 동안의 발암성 연구에서, 41 또는 210 mg/kg 수컷군에서 정소세포암과 전립선생종 및 전립선암이, 210 mg/kg 수컷군에서 전립선 명환근 섬유종의 발현이 증가하였다. 암컷 마우스에서는, 9 ~ 242 mg/kg(사람 AUC의 0.3 ~ 32배)를 투여 받은 동물에서 난소암의 발현이 증가하였다. 이러한 연구에서 암컷은 난소 기능에 활동적이고 호르몬 자극에 대하여 반응이 매우 높은 생식기 동안에 약물을 투여하였다. 이와 같은 설치류 모델에서는 난소의 반응이 매우 높으며 변화, 폐경 후의 여성의 난소는 상대적으로 생식 호르몬 자극에 대하여 반응이 없다.
- 이 약은 종래의 in vivo 또는 in vitro에서의 일반적인 실험에서 어떠한 유전독성도 나타내지 않았다.
- 양수 췌트에 과배전 및 과배출에 이 약 5 mg/kg 약상을 투여하였을 때, 임신이 되지 않았다. 암컷 췌트에서, 이 약은 투여기간 동안 발정주기를 파괴하였고, 비록 한배사끼 크기가 약간 감소하고 임신기간을 증가시키기도 했다. 발생 시기 변화는 하였지만, 투여가 끝난 후에 수정은 지연되지 않았다. 착상전 기간동안 수정된 암컷 췌트에 대한 투여는 배아착상을 지연, 그리고/또는 파괴하였고 그 결과 한배 사끼 크기가 감소하였다. 생식에 미치는 이러한 영향은 이 약의 에스트로겐 수용체 활성과 일치한다.

13. 보관 및 취급상의 주의사항

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 물질 유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.

■ 저장방법 : 밀폐용기, 15~30℃보관

■ 포장단위 : 28정(14정/PTP포장 X2)

■ 사용기간 : 제조일로부터 36개월

■ 제조사 : (주)휴온스, 충청북도 제천시 바이오밸리로 100

■ 제조의뢰자 : (주)동구바이오제약, 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 18

- * 의약품을 사용하시기 전에 첨부문서는 주의깊게 읽으시고 의약품과 함께 보관하십시오.
- * 본 제제가 이상이 있을 경우 공정거래위원회에서 고시한 소비자분쟁해결기준에 따라 교환·환불 받을 수 있습니다.
- * 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오.
- * 본 의약품은 엄격한 품질관리를 통한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- * 어린이의 손이 닿지 않게 보관하십시오.
- * 부작용 피해구제 신청은 한국약품안전관리센터(1644-6223)에 할 수 있습니다.

이 첨부문서의 작성일(2019년 09월 18일)이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템 (<https://nedrug.mfds.go.kr>)이나 소비자상담실 (080-611-8690) 수신자부담로 문의하시어 확인하실 수 있습니다.

동구바이오제약