

고혈당 기능성 활성비타민

오늘비타고

vita high



일반의약품

[제품명] 오늘비타고정

[유효성분] 이 약 1정(786 mg) 중

벤보티아민(활성비타민B ₁) (KP)	130mg (티아민)염산염으로서 93.99mg
아스코르브산97% 과립 (비타민C) (별첨)	51.55mg (아스코르브산으로서 50mg)
폴리칼슘피루몰농축물(분말형) (EP)	10mg (비타민D로서 1000IU)
리보플라빈(비타민B ₂) (KP)	50mg
니코틴아마이드(비타민B ₃) (KP)	50mg
피리독살리딘(비타민B ₆) (KP)	50mg
몰산(비타민B ₉) (KP)	500μg
시아노코발라민1000배산(비타민B ₁₂) (KP)	25mg (시아노코발라민으로서 25μg)
판토텐산칼슘(비타민B ₅) (KP)	50mg
이노시톨 (KP)	50mg
신화미그네슘(KP)	25mg (마그네슘으로서 15.1mg)
산화아연 (KP)	18.7mg (아연으로서 15.02mg)

[첨가제(타르색소)] 적색40호, 황색4호, 황색203호

[기타 첨가제] 경화유, 스테아르산마그네슘, 오파드라이머02M49010, 오파드라이200주황색(200F630035), 오파드라이X은색(62W28547), 유당수화물, 크로스포비온, 하이드록시프로필셀룰로오스

[성상] 황색의 타원형 필름코팅 정제

[효능 효과] 다음 경우의 비타민 D, B₁, B₂, B₆, C의 보급

- 골다공증, 임신, 수유기, 병중 병후(병을 앓은 동안이나 회복 후)의 체력저하, 발육기, 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 효과는 다음과 같다.
- 벼, 밀의 발육발생 - 구루병의 예방 - 각기 - 눈의 피로 - 다음 증상의 완화 신경통, 근육통, 관절염(요통, 어깨관절 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
- 마약의 보급

[용법 용량] 만 12세 이상의 어린이 및 성인 1일 1회 1정씩 식후 복용하십시오.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 고칼슘혈증(hypercalcemia) - 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태) 환자, 유육종증(sarcoidosis: 원인을 알 수 없는 전신 결종질환), 신장결핵 환자 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 3) 만 12개월 미만의 영아 4) 신장결석 환자 5) 심한 증상의 신부전 환자 6) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당) 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제, 2) 레도도파.

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 2) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria: 요중에 과량의 수산화이 배설되는 상태), 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아, 4) 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 유발할 수 있습니다. 4) 심장 순환기계기능 장애 환자, 5) 신장장애 환자, 6) 저단백혈증 환자, 7) 강성 배당혈을 투여 중인 환자 8) 동공확장 또는 신장결석에 있는 환자 9) 신장결석 병력이 있는 환자 10) 임부 11) 이 약의 황색4호(타르드라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부 문서를 소지하십시오.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 - 구역, 구토, 설사, 목은 번, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추 신경계 기능저하, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 저혈압, 폐부종(허기), 변비, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 피부발진 2) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다. 3) 피리독살을 1일 500mg - 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다. 4) 몰산(엽산)이 부족한 환자에게 티아민 B₁₂를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다. 5) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다. 6) 대량 투여로 인해 구역, 구토 등의 위장장애, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다. 7) 장기 투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있습니다. 8) 항알도스테로제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오. 9) 우발적으로 과량복용 한 경우 10) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우.

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법 용량을 지키십시오. 2) 각종 요양사에게 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다. 3) 물을 황색으로 변하게 하여 임상검사지에 영향을 줄 수 있습니다. 4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용후에는 피할 것.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관하십시오. 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

[포장단위] 90정/병, 180정(90정/병X2)

[최신정보확인방법] 이 첨부서 작성일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.dapharm.com)에서 확인 할 수 있습니다.

- 이 약을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 첨부문서를 함께 보관하시기 바랍니다.
- 구입시 사용기한이 경과되었거나 오손된 약품은 구입처를 통해 교환해 드립니다.

[문의전화] 080-920-2002(고객만족팀)

[등록 연월일] 2019. 04. 03

[부작용보고 및 피해구제 신청] 1644-6223 (한국의약품안전관리원)

[제조회사]

◎ 동아제약

본사 : 서울특별시 동대문구 천호대로 64

공장 : 충청남도 천안시 서북구 백석공단1로 200-23(1.2A, 4A층)

[제조지]

한국고려사(주)

충청북도 제천시 강서로 30

ONVT180-90001



소비자중심경영
공정·투명한거래를 약속합니다