180*220mm

전문의약품

혈액응고저지제

아픽사 정 2.5밀리그램 5밀리그램

(아픽사반)

Apixa Tab. 2.5mg, 5mg

[성분 · 함량] 1정 중

제품명	아픽사정2.5밀리그램	아픽사정5밀리그램
유효성분	아픽사반(별칭) 2.5mg	아픽사반(별칭) 5mg
첨가제(동물유래)	무수유당(소, 우유)	무수유당(소, 우유)
기타 첨가제	라우릴황산나트륨, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오피드라이 I 노란색제2호(2000), 크로스카르멜로오스나트륨	라우릴황산나트륨, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오피드라이 II 분홍색제2호(4000), 크로스카르멜로오스나트륨

[성상]
· 아픽사정2.5밀리그램 : 황색의 둥근 필름코팅정
· 아픽사정5밀리그램 : 분홍색의 알갈형의 양쪽이 볼록한 필름코팅정

[효능 · 효과]
1. 고관절 또는 슬관절 치환술을 받은 성인 환자에서 정맥혈전색전증의 예방
2. 비판막성 심방세동 환자에서 뇌졸중 및 전신 색전증의 위험 감소
3. 심방성 정맥혈전증 및 폐색전증의 치료
4. 심방성 정맥혈전증 및 폐색전증의 재발 위험 감소

[용법 · 용량]
이 약은 응시물과 상관없이 물과 함께 복용합니다. 환자가 먹약 약물복용을 잊었을 경우에는 즉시 이 약을 복용하도록 하고 이전처럼 1일 2회 투여를 계속합니다.
1. 성인
1) 고관절 또는 슬관절 치환술을 받은 성인 환자에서 정맥혈전색전증의 예방
권장용량으로서 이 약 2.5mg을 1일 2회 경구투여합니다. 처음 시작용량은 수술 후 12~24시간 사이에 투여합니다. 고관절 치환술을 받은 환자에서 권장 투여기간은 32~38일입니다. 슬관절 치환술을 받은 환자에서 권장 투여기간은 10~14일입니다.
2) 비판막성 심방세동 환자에서 뇌졸중 및 전신 색전증의 위험 감소
권장용량으로서 이 약 5mg을 1일 2회 경구투여합니다. 다만, 다음 중 최소 2가지 이상의 특징을 가진 비판막성 심방세동 환자는 권장용량으로서 이 약 2.5mg을 1일 2회 경구투여합니다; 나이≥80세, 체중≤60kg은 혈청 크레아티닌≥1.5mg/dl(133micromole/L)의 환자는 이 약 2.5mg을 1일 2회 투여합니다. 중증의 신장애 환자(크레아티닌 청소율 15~29mL/min)는 면밀이나 체중과 상관없이 이 약 2.5mg을 1일 2회 투여합니다.
3) 심방성 정맥혈전증 및 폐색전증의 치료/심방성 정맥혈전증 및 폐색전증의 재발 위험 감소
경증 또는 중증의 신장애 환자에게 용량 조절은 필요하지 않습니다. 중증의 신장애 환자크레아티닌 청소율 15~29mL/min)에서의 제한적인 임상 경험에 따르면 이 약의 혈중 농도가 이들 환자에서 이 약은 주의하여 투여합니다.
4. 간장애
이 약은 혈액응고장애 및 임상적으로 의미있는 출혈 위험성과 관련된 간질환이 있는 환자에는 투여해서는 안됩니다. 이 약은 경증 또는 중등도의 간장애 환자(Child Pugh A 또는 B에서 점수로는 5에서 9점)에서 용량조절은 필요하지 않습니다. 중증의 간장애 환자에서 이 약의 투여는 권장되지 않습니다. 간이 ALT/AST가 정상범위 상한치의 2배를 초과하거나 총 빌리루빈 수치가 정상범위 상한치의 1.5배 이상인 환자에서 제한적으로 이 약은 환자에게 이 약을 투여할 경우에는 주의해야 합니다. 이 약의 투여를 시작하기 전에 간기능 검사를 시행해야 합니다.
5. 장애를 심질 수 있는 환자의 경우, 사용 직전에 이 약을 부수어 물 또는 사과 소스와 같은 음료에 섞어서 경구로 투여할 수 있습니다. 또한 이 약을 부수어 60mL 물에 섞어서 코위장관경을 통해 투여할 수 있습니다.

[사용상의 주의사항]

1. 경고
1) 다른 항응고제와 마찬가지로, 이 약을 복용하는 환자에서 출혈의 징후에 대해 주의 깊게 관찰해야 합니다. 이 약은 출혈 위험이 증가된 경우 주의하여 투여합니다.
2) 중증의 출혈이 나타나는 경우 이 약의 투여를 중단해야 합니다. 과량투여시 의사 처치 참고.
이 약의 치료 시 정기적인 노출의 모니터링이 필요하지는 않습니다. 그러나, 예외적인 경우 이 약의 노출 정보가 임상적 결정에, 과량투여 및 응급수술에 도움이 되는 경우 로타크롬® anti-FXa 분석이 유용할 수 있습니다.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
1) 이 약의 주성분 또는 구성성분에 과민반응이 있는 환자
2) 임상적으로 유의한 활성 출혈 환자
3) 혈액응고장애 및 임상적으로 의미 있는 출혈 위험성과 관련된 간질환 환자
4) 다음과 같은 질환으로 인해여 출혈 위험성 증가된 환자
① 최근의 위장관 궤양 병력 ② 최근의 두개내 또는 뇌내 출혈 병력
③ 척수내 또는 뇌내 혈관 이상 ④ 최근의 뇌, 척수 또는 안과 수술 병력
⑤ 최근의 뇌 또는 척수 손상 ⑥ 식도정맥류가 있거나 의심되는 경우
⑦ 동정맥기형(arteriovenous malformation) ⑧ 혈관성 동맥류(vascular aneurysms) ⑨ 출혈 위험이 높은 악성 종양(neoplasm)이 있는 환자
5) 다른 항응고제의 병용 시료 : 비분획 헤파린(Unfractionated Heparin, UFH), 저분자량 헤파린(enoxaparin, dalteparin 등), 헤파린 유도체(fondaparinux 등), 경구용 항응고제(warfarin, rivaroxaban, dabigatran 등) 등의 다른 항응고제와 병용 치료 하는 경우, 단, 이 약과 서로 전환하는 경우나 비분획 헤파린(UFH)을 개방 중심 정맥 또는 동맥 카테터(open central venous or arterial catheter)를 유지하기 위해 투여하는 경우는 제외함.
6) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해 효소결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
1) 중증의 신장애 환자(크레아티닌 청소율 15~29mL/min)에 대한 제한적인 임상 경험에 따르면 이러한 환자에서 이 약의 혈장 농도가 증가하였으므로 이들 환자에게 이 약은 주의하여 투여합니다.
2) 경증 또는 중등도의 간장애 환자(Child Pugh A 또는 B에서 이 약 투여시 주의해야 합니다.
간의 ALT/AST가 정상범위 상한치의 2배를 초과하거나 총 빌리루빈 수치가 정상범위 상한치의 1.5배 이상인 환자에게 이 약을 투여할 경우에는 주의해야 합니다.
3) 이 약과 아세틸살리실산을 포함한 비스테로이드성 소염제(NSAIDs) 병용투여시 주의해야 합니다.
4) 고령자에서 이 약과 아세틸살리실산의 병용투여는 장출혈으로 더 높은 출혈 위험이 있으므로 주의하여 사용하여야 합니다.
5) 60kg 미만의 저체중 환자의 경우, 출혈의 위험이 증가할 수 있습니다.
6) 척수/경막외 마취 또는 천자 : 중추 신경 마취척수/경막 외 마취 또는 척수/경막 외 천자를 시행 중인 환자에서 혈전 색전방중증 예방을 위해 항혈전제를 투여시 장기적 또는 영구적인 마비를 일으킬 수 있는 경막외 또는 척수 혈종이 발생할 위험이 있습니다. 이런 위험은 수술 후에 유치-경막외카테터의 사용 또는 지혈에 영향을 주는 약물의 병용투여시 증가할 수 있습니다. 유치-경막 외경우 내 카테터는 적어도 약0도 이후에 투여할 수 있습니다. 환자들은 신경학적 손상(근마비 지림 또는 4위, 장 또는 방광 기능 이상의 증상 및 징후에 대해 지주 모니터링되어야 합니다. 만약 신경학적 위험이 발견되면, 신속한 진단 및 치료가 필요합니다. 중추신경 시술(intervention)에 앞서, 의사는 항응고제를 투여하고 있는 환자 또는 혈전 예방 목적으로 항응고제를 투여할 환자에서 장재적 위험성 대비 유익성에 대해 고려해야 합니다. 유치-경막내 또는 경막 외 카테터와 함께 이 약을 사용한 임상적 경험은 없습니다. 이와 같은 임상적 요구가 있고 이 약의 일반적 약동학 특성에 기초할 경우 이 약사로인 최종 투여와 카테터 제거사이에는 20~30시간격, 반감기의 2배의 간격이 필요하며, 카테터 제거 전 최소 1회의 아픽사반 투여가 생략되어야 합니다. 이 아픽사반은 카테터 제거 후 최소 5시간 이후에 투여할 수 있습니다. 다른 새로운 항응고 약물과 마찬가지로 신경축 차단 경험은 제한적이므로 이 약을 신경축 차단이 있는 상태에서 사용할 경우 면밀한 주의가 필요합니다.
7) 이 약은 혈액학자로 불린경험하나, 혈전용해술 또는 폐색전 제거술을 받아야 하는 폐색전증 환자와 같은 임상적 상황에서 안전성 · 유효성이 확립되지 않았으므로 이러한 환자들에게 치료적 혜파린의 대체제로 이 약을 권장하지 않습니다.

4. 이상반응
이 약의 안전성은 7편의 3상 임상시험에서 21,000명 이상의 환자를 대상으로 조사되었습니다정맥혈전색전증 예방(VTEp) 시험에서 5,000명 이상의 환자, 비판막성 심방세동(NVAF) 시험에서 11,000명 이상의 환자, 정맥혈전색전증 치료(VTEt) 시험에서 4,000명 이상의 환자 포함. 평균 출노출기간은 각각 20일, 1개, 22일, 일반적인 이상반응은 출혈, 타박상, 코피 및 혈종이었습니다. VTEp 시험에서 이 약 2.5mg을 1일 2회 투여한 환자의 출 11%가 이상반응을 경험하였습니다. 이 약 대 에녹사파린 임상시험에서 이 약으로 인한 출혈과 관련된 이상반응의 전체 발생률은 10%였습니다. NVAF 시험에서 이 약으로 인한 출혈과 관련된 이상반응의 전체 발생률은 이 약 대 와파린 임상시험에서는 24.3%, 이 약 대 아스피린 임상시험에서는 9.8%였습니다. 이 약 대 와파린 임상시험에서 이 약으로 인한 ISTH(International Society on Thrombosis and Haemostasis) 주요 소화기계 출혈상부 소화기관, 하부 소화기관 그리고 직장 출혈을 포함하는의 발생률은 0.76%였으며였습니다. 이 약으로 인한 ISTH 주요 안구 내 출혈의 발생률은 0.18%년이었습니다. VTE 시험에서 이 약으로 인한 출혈과 관련된 이상반응의 전체 발생률은 이 약 대 에녹사파린/와파린 임상시험에서는 15.6%, 이 약 대 위약 임상시험에서는 13.3%였습니다.
표 1. 기관계(System Organ Class) 및 빈도에 따른 이상반응 분류(매우 흔하게(≥1/10); 흔하게(≥1/100~<1/10); 흔하지 않게(≥1/1,000~<1/100); 드물게(≥1/10,000~<1/1,000); 매우 드물게(<1/10,000); 알 수 없음(사용 가능한 자료로부터 추정 불가))

기관계 (System Organ Class)	고관절 또는 슬관절 치환술을 받은 성인 환자에서 정맥혈전색전증의 예방	비판막성 심방세동 환자에서 뇌졸중 및 전신 색전증의 위험 감소	심방성 정맥혈전증 및 폐색전증의 치료 및 재발 위험 감소
혈액 및 림프계 이상			
빈혈	흔하게	–	–
혈소판 감소증	흔하지 않게	–	–
면역계 이상			
과민증, 알레르기성 부종 및 아나필락시스 반응	드물게	흔하지 않게	–
신경계 이상			
뇌출혈	–	흔하지 않게	드물게
눈 이상			
안구 출혈 (결막 출혈 포함)	드물게	흔하게	흔하지 않게
혈관 이상			
출혈, 혈종	흔하게	흔하게	흔하게
저혈압(시술 시 저혈압 포함)	흔하지 않게	–	–
복강 내 출혈	–	흔하지 않게	–
호흡기, 흉부 및 종격동 이상			
비출혈	흔하지 않게	흔하게	흔하게
객혈	드물게	흔하지 않게	흔하지 않게
기도 출혈	–	드물게	드물게
소화기계 이상			
구역	흔하게	–	–
위장관 출혈	흔하지 않게	흔하게	흔하게
치질성 출혈, 구강 출혈	–	흔하지 않게	–
혈변	흔하지 않게	흔하지 않게	흔하지 않게
직장 출혈, 잇몸 출혈	드물게	흔하게	흔하게
복막 뒤 출혈	–	드물게	–
간 · 담도계 이상			
트랜스아미나제 증가, 아스파르테이트 아미노트랜스페라제 증가, 감마-글루타밀트랜스페라제 증가, 간기능 검사 이상, 혈중 알카린 포스파타제 증가, 혈중 빌리루빈 증가	흔하지 않게	–	–
피부 및 피하조직 이상			
피부발진	–	흔하지 않게	–
근골격계 및 결합조직 이상			
근육 출혈	드물게	–	–
신장 및 비뇨기계 이상			
혈뇨	흔하지 않게	흔하게	흔하게
생식계 및 유방 이상			
비정상적 질 출혈, 비뇨생식기 출혈	–	흔하지 않게	흔하지 않게
전신 및 투여 부위 상태			
투여 부위 출혈	–	흔하지 않게	–
검사			
잠혈 양성	–	흔하지 않게	흔하지 않게
손상, 중독 및 시술 시의 합병증			
타박상	흔하게	흔하게	흔하게
시술 후 출혈(시술 후 혈종, 상처 출혈, 혈관 천자 부위의 혈종, 카테터 부위의 출혈 포함), 상처 부위 분비물, 혈개 부위 출혈(혈개 부위 혈종 포함), 수술 출혈	흔하지 않게	–	–
외상성 출혈, 시술 후 출혈, 절개 부위 출혈	–	흔하지 않게	흔하지 않게

이 약의 사용은 조직 및 기관에서의 잠혈 및 현성 출혈의 위험과 관련될 수 있으며, 이는 출혈 후 빈혈을 유발할 수 있습니다. 징후, 증상 및 중증도는 출혈의 부위, 정도 또는 범위에 따라 달라질 수 있습니다.
※ 국내 시판 후 조사결과
국내에서 재심사를 위하여 6년 동안 3,939명을 대상으로 실시한 시판 후 조사 결과, 이상사례의 발현율은 인라민제와 상관없이 34.25%(1,075건/3,139명, 총 2,462건)로 보고되었으며, 이 중 약과의 인과관계에 상관없이 보고된 중대한 이상사례의 발현율은 17.28%(543건/3,139명, 총 960건)로 보고되었으며, 인과관계를 배제할 수 없는 중대한 약물이상반응을 발현빈도에 따라 아래 표와 나열하였다.

발현빈도	기관계별	인과관계를 배제할 수 없는 중대한 약물이상반응 3.95%(124/3,139명, 172건)
드물게 (0.1% 미만)	간 및 담도계 질환	간염, 담도 장애
	근육-골격계 장애	골절, 인대 장애
	기타 용어	관상동맥수술, 수술 후 출혈, 외상성 혈종
	대사 및 영양질환	고너트륨혈증, 대사성산증, 전신심부, 탈수
	방어기전 장애	패혈증
	비뇨기계 질환	급성신부전, 신장손상, 신기능 이상, 혈뇨
	생식기능 장애	자궁 출혈, 질 출혈
	시각 장애	결막염, 시각 이상
	신생물	상세 불명의 선암종, 신장암, 췌개관암종
	심근, 심내막, 심막, 판막질환	대동맥판막기능부전, 대동맥협착, 동맥협착, 심장막삼출, 혈심증
	심장 박동 장애	동기능부전증후군, 심방심실전기, 심장정지
	위장관계 장애	구토, 대장염 설사, 식도염 상부위장관난선염, 위식도역류, 위장관 출혈 위장염 치명적 혈변장
	일반 상황과 장애	기립성저혈압, 심부전
	전사질환	다리통증, 무력증, 복부팽만, 사망, 상태악화, 피로
	정신질환	불면증, 식욕부진 졸림
	중추 및 말초신경계 장애	경련 대뇌신경병증, 반부전마비, 편두통, 편마비, 혼수
	투여 부위 장애	연조직염
	피부와 부속기관 장애	가려운 발진, 반점피부
	혈관질환	충혈, 혼조
	호흡기계 질환	객혈, 폐기종, 흡막삼출
매우 드물게 (0.1% 미만)	기타 용어	낙상, 수술직중재
	대사 및 영양질환	식사 장애
	비뇨기계 질환	혈중크레아티닌 증가
	심장 박동 장애	두근거림, 심방세동
	위장관계 장애	변비, 복통, 소화불량
	전사질환	가슴통증, 열
	중추 및 말초신경계 장애	두통, 어지러움
	피부와 부속기관 장애	가려움증
	호흡기계 질환	폐렴, 호흡곤란
때때로 (0.1~<1% 미만)	기타 용어	낙상, 수술직중재
	대사 및 영양질환	식사 장애
	심장 박동 장애	심방세동
	위장관계 장애	위장관 출혈, 출혈성 위궤양, 흑색변
	적혈구 장애	빈혈
	혈관질환	뇌경색, 뇌출혈
	혈소판 출혈, 응고 장애	명시 안 된 출혈
	호흡기계 질환	폐렴, 호흡곤란

또한, 약과의 인과관계에 상관없이 보고된 예상하지 못한 이상사례의 발현율은 30.97%(972/3,139명, 총 2,178건)로 보고되었으며, 인과관계를 배제할 수 없는 예상하지 못한 약물이상반응은 발현빈도에 따라 다음과 표에 나열하였다.

발현빈도	기관계별	인과관계를 배제할 수 없는 예상하지 못한 약물이상반응 4.01%(154/3,139명, 195건)
드물게 (0.1% 미만)	간 및 담도계 질환	간염, 담도 장애, 상세 불명의 간기능 검사 이상
	근육-골격계 장애	골절, 인대 장애
	기타 용어	관상동맥수술, 수술 후 출혈, 외상성 혈종
	대사 및 영양질환	고너트륨혈증, 대사성산증, 전신심부, 탈수
	방어기전 장애	패혈증
	비뇨기계 질환	급성신부전, 신장손상, 신기능 이상, 혈뇨
	생식기능 장애	자궁 출혈, 질 출혈
	시각 장애	결막염, 시각 이상
	신생물	상세 불명의 선암종, 신장암, 췌개관암종
	심근, 심내막, 심막, 판막질환	대동맥판막기능부전, 대동맥협착, 동맥협착, 심장막삼출, 혈심증
	심장 박동 장애	동기능부전증후군, 심방심실전기, 심장정지
	위장관계 장애	구토, 대장염 설사, 식도염 상부위장관난선염, 위식도역류, 위장관 출혈 위장염 치명적 혈변장
	일반 상황과 장애	기립성저혈압, 심부전
	전사질환	다리통증, 무력증, 복부팽만, 사망, 상태악화, 피로
	정신질환	불면증, 식욕부진 졸림
	중추 및 말초신경계 장애	경련 대뇌신경병증, 반부전마비, 편두통, 편마비, 혼수
	투여 부위 장애	연조직염
	피부와 부속기관 장애	가려운 발진, 반점피부
	혈관질환	충혈, 혼조
	호흡기계 질환	객혈, 폐기종, 흡막삼출
때때로 (0.1~<1% 미만)	기타 용어	낙상 수술직중재
	대사 및 영양질환	식사 장애
	비뇨기계 질환	혈중크레아티닌 증가
	심장 박동 장애	두근거림, 심방세동
	위장관계 장애	변비, 복통, 소화불량
	전사질환	가슴통증, 열
	중추 및 말초신경계 장애	두통, 어지러움
	피부와 부속기관 장애	가려움증
	호흡기계 질환	폐렴, 호흡곤란

* 안전성 평가 조사대상자 수 : 비판막성 심방세동(NVAF) 환자 3,012명, 정맥혈전색전증 치료(VTEt) 27명, 정맥혈전색전증 예방(VTEp) 100명

5. 일반적 주의
1) 치료에 영향을 주는 다른 약물들과의 상호작용
심방세동 환자에서 단독요법 또는 복수요법의 항혈소판 치료(dual antiplatelet therapy)가 필요한 경우, 이런 항혈소판 치료제와 아픽사반을 병용투여하기 전에 잠재적 위험 대비 잠재적 유익에 대해 주의 깊게 평가해야 합니다. 심방세동 환자를 대상으로 한 임상시험에서 아세틸살리실산의 병용은 주요 출혈의 위험을 아픽사반군에서 1.8%년에서 3.4%년으로 증가시켰고 외래진료에서 2.7%년에서 4.6%년으로 증가시켰습니다. 이 임상시험에서 이 약과 복수요법의 항혈소판 치료제(dual antiplatelet therapy)의 병용투여는 제한적으로(≤30일)였습니다. 아세틸살리실산 또는 아세틸살리실산과 클로피도그렐을 병용하여 투여 중인, 다수의 심장성 및 비심장성 동반질환이 있는 고위험의 급성 관상동맥증후군 후 환자를 대상으로 한 임상시험에서 우의major)2.0%년/년과 비교하여 이 약 투여군(0.3%년)에서 ISTH 주요 출혈 위험의 증가가 보고되었습니다. 수술 후, 다른 혈소판 응집 저해제와 이 약의 병용투여는 권장되지 않습니다.
2) 수술 및 침습적 술
중등도 또는 중증의 출혈 위험이 있는 수술 또는 침습적 시술 최소 48시간 이전에 이 약의 투여를 중단해야 합니다. 이러한 시술이나 수술에는 임상적으로 중요한 출혈 가능성이 배제될 수 없거나 출혈 위험이 수용 가능하지 않은 경우입니. 이 약은 출혈 위험이 낮은 수술또 침습적 시술의 최소 24시간 이전에 이 약의 투여를 중단해야 합니다. 이러한 시술이나 수술에는 수술 부위에서 출혈 위험이 낮거나 중요하지 않거나 쉽게 조절되는 것입니. 만약 수술 또는 침습적 시술 일정을 미룰 수 없다면, 출혈 위험이 증가할 수 있으므로 주의해야 합니다. 수술이나 시술의 긴급성은 출혈 위험을 고려하여 판단되어야 합니. 이 약은 침습적 시술 또는 외과적 절개 후에 임상적 상황이 허락하고 적절한 치료가 되는 경우 가급적 빨리 다시 투여를 시작해야 합니다.
3) 투여의 일시적 중지
활성 출혈, 수술 또는 침습적 시술 등의 시유로 이 약을 포함한 항응고제의 투여중단은 환자에게 혈전증 증가의 위험이 있습니다. 치료 중지(bridging anticoagulation)는 피해야 하고 만약 어떤 이유로 이 약을 혈한 항응고가 일시적으로 중지되었을 경우, 치료는 가능한 빨리 다시 시작되어야 합니다.
4) 급성 허혈성 뇌졸중 치료를 위해 혈전 용해제의 사용
이 약을 투여하는 환자에서 급성 허혈성 뇌졸중의 치료를 위한 혈전 용해제의 사용 경험은 매우 제한적입니다.
5) 고관절 골절술
이 약은 고관절 골절술을 시행 중인 환자에서의 안전성 및 유효성을 평가하기 위한 임상시험이 시행되지 않았습니다. 따라서, 이런 환자들에서 이 약의 투여는 권장되지 않습니다.
6) 인공 판막 환자
심방세동이 있거나 없는 인공 판막 환자에서 이 약의 안전성 · 유효성이 확립되어 있지 않기 때문에 이러한 환자에서 투여를 권장하지 않습니다.
7) 암 환자
암을 동반한 심재성 정맥혈전증 및 폐색전증 환자에서 이 약의 안전성 · 유효성은 확립되지 않았습니다.
8) 운전 및 기계 조작 시에 대한 효과
이 약은 운전 및 기계 조작 시에 거의 영향을 주지 않습니다.
9) 심술돈전환
비판막성 심방세동 환자의 경우, 심술돈전환 중에 이 약을 계속 투여할 수 있다.

6. 상호작용
1) 사이토크롬 P450 3A4(CYP3A4) 및 P-glycoprotein(P-gp) 저해제 : 이 약을 CYP3A4 및 P-gp의 강력한 저해제인 케토코나졸400mg 1일 1회)과의 병용투여시 평균 AUC의 2배 증가 및 평균 Cmax의 1.8배 증가를 유도합니. 이 약은 이론적 한도로 케토코나졸, 이트라코나졸, 보리코나졸 및 프사코나졸의 및 HIV 단백분해효소 저해제에, 리토나비어와 같은 전사적용을 하는 CYP3A4 및 P-gp의 강력한 저해제와 병용투여를 권고하지 않습니다. 이 약을은 아픽사반의 노출을 2배까지 증가시키거나, 이 약의 노출을 증가시키는 부가적 요인(예, 중증의 신장애)이 존재할 경우에는 2배 이상 증가시킬 수 있습니다. CYP3A4 및 P-gp의 강력한 저해제로 생각되지 않는 활성물질에, 딜티아젬, 니프레센, 아미오다론, 베라파밀, 퀴니딘은 이 약의 혈장 농도를 더 적은 정도로 증가시킬 것으로 기대됩니다. 예를 들어 딜티아젬360mg 1일 1회 투여은 중등도의 CYP3A4 및 약한 P-gp 저해제로 여겨지며, 이 약의 평균 AUC를 1.4배 증가시키고 Cmax를 1.3배 증가시킵니다. P-gp의 저해제이나 CYP3A4의 저해제가 아닌 니프록센500mg 단일투여은 아픽사반 평균 AUC를 1.5배 증가시키고 평균 Cmax는 1.6배 증가시킵니다. CYP3A4 및/또는 P-gp의 약한 저해제의 병용투여시 아픽사반의 용량 조절은 필요치 않습니다.
2) CYP3A4 및 P-gp 유도제 : CYP3A4 및 P-gp의 강력한 유도제인 리팜피신과 아픽사반의 병용투여시 아픽사반 평균 AUC 및 평균 Cmax를 대략 54% 및 42% 정도로 각각 감소시켰습니다. 또한, 다른 CYP3A4 및 P-gp의 강력한 유도제(페니토인, 카바마제핀, 페노바르비탈 또는 St. John's Wort)의의 병용투여도 아픽사반의 혈장 농도를 감소시킬 수 있습니다. 이런 약물들과 병용투여시 아픽사반의 용량 조절은 필요치 않으나, CYP3A4 및 P-gp의 강력한 유도제의 병투여시 주의하여야 합니다. 심방세동 환자에서의 임상시험에서 아픽사반 단독투여와 비교하여 아픽사반과 CYP3A4 및 P-gp의 강력한 유도제를 병용투여시 효과 감소 및 더 높은 출혈 위험이 관찰되었습니다. CYP3A4 및 P-gp의 강한 유도제로 전신 치료를 받고 있는 환자에서 고관절 또는 슬관절 치환술을 받은 후 정맥혈전색전증의 예방, 비판막성 심방세동 환자에서 뇌졸중 및 전신 색전증의 위험 감소 또는 심재성 정맥혈전증 및 폐색전증의 재발 위험 감소를 위해 이 약과 병용투여시 주의해서 사용해야 합니다. CYP3A4 및 P-gp의 강한 유도제로 전신 치료를 받고 있는 환자에서 심재성 정맥혈전증 및 폐색전증의 치료를 위해 이 약과 병용투여시 주의해서 사용해야 합니다.
3) 항응고제, 혈소판 응집 저해제 및 비스테로이드성 소염진통제(NSAIDs) : 이 약5mg 단위투여과 에녹사파린(40mg 단위투여)의 병용투여시 anti-Factor Xa 활성의 효과상승이 관찰되었습니. 이 약과 아세틸살리실산(325mg 1일 1회)의 병용투여시 약동학 또는 약력학적 상호작용은 명백하지 않습니다. 이 약을 클로피도그렐 75mg 1일 1회)와 병용투여시 또는 이 약을 클로피도그렐 75mg 및 아세틸살리실산 162mg 1일 1회)와 병용투여시 또는 프라수그렐(60mg 투여 후 1일 1회 10mg 투여)과 병용투여시, 이 약 없이 항혈소판제만 투여할 때와 비교하여 출혈 시간 또는 혈소판 응집의 추가적인 억제와 관련된 증가는 나타나지 않았습니다. 혈액응고검사(PT, INR 및 aPTT)에서의 증가는 이 약 단독투여시와 일관되게 나타났습니다. P-gp 저해제인 니프록센500mg)은 아픽사반 평균 AUC 및 평균 Cmax를 각각 1.5배 및 1.6배 증가시켰으며, 이에 따른 아픽사반의 응고검사효과에서의 증가도 관찰되었습니다. 이 약과 니프록센의 병용투여 후 아리카돈산-우도 혈소판응집에 대한 니프록센의 효과 변화는 관찰되지 않았고, 임상적으로 관련된 출혈 시간의 연장도 관찰되지 않았습니다. 이런 결과들에도 불구하고, 항혈소판제와 이 약의 병용투여시 개개인에 따라 약력학적 반응이 더 두드러져 나타날 수 있습니. 비스테로이드성 소염진통제아세틸살리실산을 포함한 NSAIDs)의 병용투여시 이런 약물들이 일반적으로 출혈의 위험을 증가시키므로 주의해야 합니다. 급성관상증후군 환자를 대상으로 한 임상시험에서 아픽사반, 아세틸살리실산 클로피도그렐의 3제 복합요법에서 유의한 출혈 위험 증가가 보고되었습니다. 다음과 같은 중증 출혈과 연관된 약물은 이 약과 병용이 권장되지 않습니다 : 혈전용해제, GPIIb/IIIa 수용체 저해제, 티에노피리딘계, 클로피도그렐, 디피리다몰, 덱스트란, 그리고 설핀피라존
4) 다른 병용요법들 : 아테놀롤 또는 파모티딘과 아픽사반을 병용투여시 임상적으로 우의한 약동학 또는 약력학적 상호작용은 관찰되지 않았습니다. 아픽사반 10mg과 아테놀롤 100mg의 병용투여시 아픽사반의 약동학에 임상적으로 연관된 영향은 없었습니다. 단독투여와 비교하여 두 약물을 병용투여 후 아픽사반 평균 AUC 및 평균 Cmax은 각각 15% 및 18% 낮게 나타났습니다. 아픽사반 10mg을 파모티딘 40mg과 병용투여시 아픽사반의 AUC 또는 Cmax에 영향은 없었습니.
5) 다른 약물들에 대한 아픽사반의 효과 : 아픽사반 in vitro 실험은 아픽사반이 CYP1A1, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4(IC50>45μM)의 활성에 약해 효과를 보이지 않았고, CYP2C19(IC50 20μM)의 활성에 약한 저해 효과를 보였습니. 아픽사반은 20μM까지의 농도에서 CYP1A2, CYP2B6, CYP3A4(기질 우도화)) 있었습니. 따라서, 아픽사반은 이 효소들로 대사되는 약물들과 병용투여시 이 약물들의 대사적 청소율을 변경시키지 않을 것으로 기대됩니. 아픽사반은 P-gp의 유의한 저해제가 아닙니다. 건강한 시험대상자에서, 아픽사반은 디곡신 니프록센 아테놀롤의 약동학을 의미 있게 변화시키지 않았습니.
– 디곡신 : 아픽사반(20mg 1일 1회)과 디곡신(0.25mg 1일 1회)의 병용투여시 P-gp의 기질인 디곡신의 AUC 또는 Cmax에 영향을 미치지 않았습니다. 따라서, 아픽사반은 P-gp의 매개된 기질 수송을 저해하지 않습니.
– 니프록센 : 아픽사반(10mg) 및 니프록센(500mg)의 단회 병용투여는 사용되는 비스테로이드성 소염진통제(NSAIDs)인 니프록센의 AUC 및 Cmax에 영향을 미치지 않았습니다.
– 아테놀롤 : 아픽사반(10mg) 및 아테놀롤(100mg)의 단회 병용투여는 일반적인 베타차단제인 아테놀롤의 약동학을 변화시키지 않았습니.
6) 약물검사 : 아픽사반 투여는 아픽사반 노출을 감소시킵니다(↓ 과량투여시의 처치 참조).

7. 임부 및 수유부에 대한 투여
1) 임부 : 이 약의 임부에 대한 자료는 없습니다. 동물실험에서 생식독성의 직접적 혹은 간접적 영향은 보여지지 않습니다. 이 약의 임부에 대한 투여는 권장되지 않습니다.
2) 수유부 : 이 약 또는 이 약의 대사체가 인간 유즙으로 분비되는지에 대해서는 알려져 있지 않습니다. 동물실험 자료에서 이 약은 유즙으로 분비되었습니다. 신생아 및 영아에 대한 위험은 배제할 수 없습니. 따라서, 이 약을 투여시 수유를 중단하거나 수유를 계속할 경우 이 약의 투여를 중단합니.

8. 소아에 대한 투여
소아에의 안전성 및 유효성은 확립되지 않았습니다.

9. 고령자에 대한 투여
1) 고관절 또는 슬관절 치환술을 받은 성인 환자에서 정맥혈전색전증의 예방 : 고령자에서 이 약의 용량 조절은 필요하지 않습니다.
2) 비판막성 심방세동 환자에서 뇌졸중 및 전신 색전증의 위험 감소 : 80세 이상의 고령자에서, 60kg 이하의 체중 그리고/또는 혈청 크레아티닌≥1.5mg/dL(133micromole/L)인 경우를 제외하고는 용량 조절은 필요하지 않습니다(용법용량 항 참조).
3) 심재성 정맥혈전증 및 폐색전증의 치료와 심재성 정맥혈전증 및 폐색전증의 재발 위험감소 : 고령자에서 이 약의 용량 조절은 필요하지 않습니다.

10. 임상검사치에의 영향
이 약의 적정기전으로 예상된 바와 같이 응고시험(PT, INR, aPTT)은 영향을 받았습니. 예상된 치료용량의 투여에 이런 응고시험에서 관찰된 변화는 작았고, 변동성이 높을 것으로 예상됩니.

11. 과량투여시의 처치
1) 이 약의 해독제는 없습니다. 이 약의 과량투여는 출혈의 위험을 증가시킬 수 있습니다.
출혈성 합병증이 있는 경우, 반드시 이 약의 투여를 중단하고 출혈의 원인에 대해 조사되어야 합니다. 또한, 적절한 치료의 시작(예, 외과적 지혈 또는 신선 냉동혈장의 수혈)이 고려되어야 합니다.
2) 대조시험에서 건강한 시험대상자에게 이 약을 경구로 1일 최대 50mg의 용량으로 3~7일 동안 투여(25mg 1일 2회를 개일 혹은 50mg 1일 1회를 2일 투여. 1일 권장 최대용량의 10배)하였을 때 임상적으로 관련된 이상반응이 나타나지 않았습니다.
3) 건강한 시험대상자에서, 이 약 20mg 투여 2시간 및 6시간 후 약용린의 투여는 이 약 AUC를 각각 평균 50% 및 27%까지 감소시켰고 Cmax에는 아무런 영향이 없었습니다. 이 약의 평균 반감기는 이 약 단독투여의 12시간에서 이 약 투여 2시간 및 6시간 후 약용탄 투여시 각각 5.3시간 및 4.9시간으로 감소시켰습니다. 따라서 약용린은 이 약의 과량투여 혹은 우발적인 투여시 유용할 것입니.
4) 생명을 위협하는 출혈이 위의 방법으로는 조절되지 않는 경우, 프로트롬빈 복합 농축물(PCCs, Prothrombin Complex Concentrates) 또는 재조합 factor VIIa의 투