

병중·병후 영양소관리

아로나민[®] 케어리피정

일반의약품

분류번호

319 (7타의비타민제)

다음과 같은 경우에 좋습니다.



병의 관리로 인해 육체피로가 쌓였을 때

- ☑ 고함량 비타민B₁, B₁₂(1,000ug)
- ☑ 항산화성분 비타민E
- ☑ CoQ10, 아연 함유

원료약품 및 분량 (1정 중)

- 유효성분 :
푸르셀티아민염산염(푸르셀티아민으로서 18.32mg)(KP)..... 20.0mg
푸마르산철(철로서 15mg)(KP)..... 45.75mg
산화아연(아연으로서 30mg)(KP) 37.4mg
유비데카레논10%(유비데카레논으로서 10mg)(별규) 100.0mg
토코페롤아세테이트2배산(토코페롤아세테이트로서 20IU)(KP) 40.0mg
시아노코발라민100배산(시아노코발라민으로서 1000ug)(별규) 100.0mg
- 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이 AMB II
분홍색(88A640030), 오파드라이 II 클리어(85F19250), 오파드라이흰색(OY-S-7223),
코포비돈, 크로스카르멜로오스나트륨

성상 어두운 분홍색의 타원형 필름코팅정

Aro-DD

효능·효과

- ▶ 다음경우의 비타민 B₁, E의 보급
 - 육체피로
 - 임신·수유기
 - 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
 - 노년기
- ▶ 아연의 보급

용법·용량 성인 1일 1회 1정을 복용합니다.

사용상의 주의사항

1. 경고
 - 1) 철 함유제제는 만 6세 이하의 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우 중독성 사망을 일으킬 수 있으므로 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
 - 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자

※5030709-1190610

- 2) 만 12개월 미만의 젖먹이
- 3) 혈색소증(철대사 이상으로 철이 간장, 췌장(이자)에 침착하는 질환), 헤모시데린침착증, 비철결핍성 빈혈
3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.
 - 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
4. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - 3) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성(특정 부분에 나타나는)대장염 등의 위장질환 환자
 - 4) 심장·순환기계기능 장애 환자
 - 5) 신장장애 환자
 - 6) 저단백혈증 환자
5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.
 - 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우: 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 묽은 변, 구내염(입안염), 두드러기, 가려움, 광선과민 반응, 복부·위통증, 경련, 열, 혼수, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 저혈압, 폐부종
 - 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있습니다.
 - 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있습니다.
 - 4) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.
 - 5) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
 - 6) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 복용(사용))투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
 - 7) 우발적으로 과량복용 한 경우
 - 8) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
6. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
 - 2) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.
7. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
 - 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

저장방법 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위 30정/병

- 이 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.
- 이 설명서는 2019년 6월 10일자로 작성되었으며 이후로 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품 등 검색(<https://nedrug.mfds.go.kr/>)에서 확인할 수 있습니다.
- 부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

ILDONG 일동제약주식회사

본사 : 서울특별시 서초구 바우로27길 2
공장 : 경기도 안성시 공단1로 25
소비자상담실 : (전화) 080-022-1010 (수신자부담)

※5030709-1190610