

145*180mm

글루타틴정 100mg (글루타티온(환원형))

Glutatine_{Tab.100mg}

일반의약품
분류번호 : 392
해 독 제

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

- ※ 유효성분 : 글루타티온(환원형)(KP)100.0mg
- ※ 동물유래성분 : 유당수화물(소, 우유)
- ※ 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 히드록시프로필셀룰로오스, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 라우릴황산나트륨, 경질무수구산, 스테아르산마그네슘, 탭실드흰색(22W265)

【성상】 흰색의 원형 필름코팅정 【효능·효과】 약물중독, 자가중독

【용법·용량】 성인 : 글루타티온으로서 1회 50-100mg, 1일 1-3회 복용한다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 말 것.

- 1) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 2) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자 3) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 체강염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 과민증 : 드물게 발진 등이 나타날 수 있다. 2) 소화기계 : 드물게 식욕부진, 구역, 구토, 위통 등이 나타날 수 있다.

4. 기타 이 약의 복용(사용)시 주의할 사항

지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다. 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관한다.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 100정/병 【사용(유효)기간】 제조일로부터 36개월

【판매자】 (주)웰스팜텍/서울특별시 금천구 가산디지털1로 24 대륭테크노타운 13차 B101호

【제조의회사】 (주)텔콘알에프제약/충청북도 충주시 대소원면 첨단산업1로 120

【제조사】 (주)한국파비스제약/경기도 안산시 단원구 산단로83번길 127 【소비자 상담실】 043-849-0200

- ※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여 주시기 바랍니다.
- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 제품이 발견된 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 소비자상담전화(043-849-0200) 또는 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)을 통해 확인 하실 수 있습니다.
- ※ 부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

작성일자:2025.04.15

판매자

 wells pharmtech
(주)웰스팜텍
서울특별시 금천구 가산디지털1로 24 대륭테크노타운 13차 B101호

제조의회사

 TELCON (주)텔콘알에프제약
충청북도 충주시 대소원면 첨단산업1로 120

제조사

 PHARVIS (주)한국파비스제약
KOREA 경기도 안산시 단원구 산단로 83번길 127