


[원료약품 및 분량] 1정 중

■ 유효성분	
디아스타제·프로테아제·셀룰라제(KP)	50mg
판크레아틴장용과립(별규)	100mg (기원동물:돼지, 사용부위:췌장(이자))
dL-카르니틴염산염(KP)	100mg
우르소데옥시콜산(KP)	10mg
시메티콘(KP)	50mg
티아민염산염(KP)	5mg
■ 첨가제(타르색소):	황색203호, 청색1호, 적색40호
■ 기타 첨가제:	미결정셀룰로오스, 메타규산알루미늄산화물, 프로솔브, 히드록시프로필셀룰로오스, 크로스포비돈, 콜로이드성산화규소, 히프로멜로오스, 폴리에틸렌글리콜6000, 산화티탄, 탈크, 오파드라이AMB II 88A610035그린

[성상] 연두색의 장방형 필름코팅정



[효능·효과]

식욕감퇴(식욕부진), 위부팽만감, 소화불량, 과식, 체합, 구역, 구토, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감

[용법·용량] 1일 3회 식후에 복용하십시오

만 15세 이상 : 1회 1정, 만 11세 이상 - 만 15세 미만 : 1회 2/3정, 만 8세 이상 - 만 11세 미만 : 1회 1/2정
※ 충분한 양의 물과 함께 복용하십시오.

[사용상의 주의사항]

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
1) 만 7세 이하의 어린이
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
1) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람
2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
3) 다른 약물을 복용하고 있는 사람
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 이 첨부문서를 소지하십시오.
1) 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법용량을 잘 지키십시오.
- 2) 어린이 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여하십시오.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기한] 외부포장에 표기

※ 블리스터 포장의 제조번호/사용기한 표시방법은 아래와 같습니다.
예) 제조번호: #21001, 사용기한 2023년 11월 15일인 경우 → "21001/231115"로 표시

[포장단위] 10정

※ 이 제품은 정부의 "소비자분쟁해결기준"에 의거 구입처를 통하여 교환 또는 환불 받을 수 있습니다.
※ 이 첨부문서의 작성연월일 이후 변경내용은 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.
※ 이 제품 사용 후 부작용(이상반응)이 발생한 경우 한국의약품안전관리원(1644-6223)에 문의하여 부작용 피해구제 신청을 할 수 있습니다.

첨부문서 작성연월일: 2021년 10월 30일



제조의뢰·판매자

유한양행

본사: 서울특별시 동작구 노량진로 74
공장: 충북 청주시 청원구 오창읍 연구단지로 219

홈페이지: www.yuhan.co.kr

소비자 상담실: 080-024-1188(수신자 요금 부담)

제조자: (주)유안생명과학 / 경기도 안산시 단원구 별망로 627