

효과 빠른 진해거담제

펜삭프레쉬

연질캡슐

일반의약품

KGMP적격업체

분류번호: 진해거담제(222)

ZAC-B-0000-U4-01

일반의약품 정보

이 약을 사용하기 전 반드시 아래의 내용을 확인하세요.

[유효성분] 1캡슐(565mg) 중

L-카르보시스테인 (KP) 125.0mg

브롬헥신염산염 (BP) 2.0mg

[효능·효과]

가래, 기침을 유발하는 가래

[용법·용량]

성인 및 15세 이상의 소아: 1일 3회, 1회 2캡슐을 식후에 경구투여한다.

8세~14세 소아: 1일 3회, 1회 1캡슐을 식후에 경구투여한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것 1) 이 약에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람 2) 위·십이지장 궤양 환자 3) 8세 미만의 소아

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것 1) 다른 진해 (기침을 그치게 함) · 거담제 (가래약), 감기약

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것 1) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부 3) 노인 4) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기비염(코염), 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람 5) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예: 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람 6) 고열 증상이 있는 사람 7) 심장질환, 간질환 또는 중증(심한 증상) 신장(콩팥) 질환의 진단을 받은 사람 8) 위·십이지장 궤양의 병력이 있는 사람

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉시 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 복통(배앓), 두통, 혈담 2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증(심한 증상) 증상이 나타난 경우 ① 피부점막만종후군(스티븐스-존슨 증후군), 중독성표피괴사증후군(리엘 증후군): 고열을 동반하고, 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 화상과 같은 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈 점막에 나타날 수 있다. ② 속(아나필락시스): 복용 후 바로 두드러기, 부종(부기), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은 땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있다. ③ 간기능 장애: 전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띄게 됨)등이 나타날 수 있다. 3) 3~4일간 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 2) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것 3) 다음의 증상이 나타날 수 있으므로, 이러한 증상이 계속되거나 심해지는 경우에는 이 약의 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담할 것: 설사, 입안의 건조 4) 동물실험에서 브롬헥신염산염을 장기간 다량 연속 투여할 경우 혈청중에 아이노전이효소치와 가래양이 일시적으로 상승한다는 보고가 있다. 5) 이 약을 복용하면 일시적으로 가래 양이 증가하는 경우가 있다. 6) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

6. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것 3) 의약품용 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

[사용기간] 용기 열면 표기일까지

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

[포장단위] 10캡슐(10캡슐/PTP×1)

[성상] 흰색의 내용물을 함유한 녹색의 타원형 연질캡슐

[첨가제]

- 첨가제(타르색소): 황색4호, 청색1호
- 첨가제(동물유래성분): 젤라틴(기원동물: 소, 사용부위: 가죽)
- 기타첨가제: 폴리에틸렌글리콜400, 폴리에틸렌글리콜4000, 농글리세린, 폴리소르베이트80, 솔비톨스페살글리세린블렌드, 산화티탄

구입시 사용기간이 경과하였거나 변질 또는 오손된 제품은 약국, 병원, 의원, 도매상 개설자에 한하여 교환하여 드리오니 이와 같은 제품은 구입 유통 경로를 통해서 반송하여 주시기 바랍니다. 소비자 문의는 본사 마케팅부(수신자부담:080-549-0002)에서 상담해 드리며, 제조과정과 관련된 제품의 품질에 대한 문의사항은 백암공장 품질경영본부(전화:080-332-0002)로 연락바랍니다. 제품 사용 후 부작용(이상반응)이 발생한 경우 한국약품안전관리원(1644-6223)에 문의 및 보고하여 주시기 바랍니다. 설명서작성년월일 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지(www.jeilhs.co.kr) 또는 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)을 참조하세요.

제조의원 및 판매원 제일헬스사이언스(주)

경기도 용인시 처인구 백암면 청강가창로 7B동

제조원 알피바이오(주)

경기도 화성시 남양읍 제약공단4길 35-7

* 설명서 작성년월일 2019.04.04