

# 씨트리카 캡슐 75밀리그램/150밀리그램 (프레가발린)

## 【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중

- 75mg
- 유효성분 : 프레가발린(별규)..... 75.0mg
- 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소, 우유)
- 기타 첨가제 : 옥수수전분, 캡슐, 톨코

- 150mg
- 유효성분 : 프레가발린(별규)..... 150.0mg
- 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소, 우유)
- 기타 첨가제 : 옥수수전분, 캡슐, 톨코

## 【성상】

- 75mg : 흰색 내지 연한 노란색을 띠는 가루가 든 상부 적갈색, 하부 흰색의 경질캡슐제
- 150mg : 흰색 내지 연한 노란색을 띠는 가루가 든 상부 흰색, 하부 흰색의 경질캡슐제

## 【효능·효과】

- 상인에서 말초와 중추 신경병증성 통증의 치료
- 간질
- 성인에서 이차적 전신경증을 동반하거나 동반하지 않은 부분발작의 보조제
- 섬유근통증의 치료

## 【용법·용량】

이 약은 프레가발린으로서 1일 총 투여용량을 1일 2회로 나누어 음식물과 상관없이 경구 투여한다. 이 약은 주로 신장으로 배설되므로, 신기능이 저하된 환자에 대해서는 용량이 조절되어야 한다. (5, 신기능 장애에함'항 참고)

### 1. 신경병증성 통증

- 말초 신경병증성 통증  
성인: 이 약은 시작용량으로 1일 150 mg를 투여할 수 있다. 개개 환자에서의 반응과 내약성에 근거하여 3일 내지 7일 후에 1일 300 mg까지 증량할 수 있다. 필요하다면, 이후 7일 간격으로 1일 최대 600 mg까지 증량할 수 있다.
- 중추 신경병증성 통증  
성인: 이 약은 시작용량으로 1일 150 mg를 투여할 수 있다. 개개 환자에서의 반응과 내약성에 근거하여 1주일 후에 1일 300 mg까지 증량할 수 있다. 추가 1주일 후에 목표 1일 용량인 600 mg까지 증량할 수 있다. 목표 1일 용량에서 내약성을 나타내지 않을 경우 용량 감소가 고려될 수 있다. (4, 투여의 중단'항 참고)

- 간질  
성인: 이 약은 시작용량으로 1일 150 mg를 투여할 수 있다. 개개 환자에서의 반응과 내약성에 근거하여 일주일 후에 1일 300 mg까지 증량할 수 있다. 필요하다면, 이 후 7일 간격으로 1일 최대 600 mg까지 증량할 수 있다.

### 3. 섬유근통증

- 섬유근통증에 대한 이 약의 권장 용량은 1일 300 mg ~ 450 mg이다. 이 약은 시작 용량으로 75 mg 씩 1일 2회 (1일 150 mg)를 투여하며, 유효성과 내약성에 근거하여 1주일 이내에 150 mg 씩 1일 2회 (1일 300 mg) 까지 증량할 수 있다. 1일 300 mg의 용량에서 충분한 유익성을 경험하지 못한 환자의 경우에는 1주일 이내에 225 mg 씩 1일 2회 (1일 450 mg) 까지 증량할 수 있다. 1일 600 mg의 용량에서도 임상 연구가 실시되었으나, 이 용량에서의 부가적인 유익성이나 충분한 내약성에 대한 증거는 없다. 용량 의존적인 이상반응을 고려하여, 1일 450 mg을 초과하는 용량 투여는 권장되지 않는다.

- 투여의 중단  
환자의 임상적 경험에 따르면, 이 약의 투여를 중단할 경우, 적어도 1주일 이상의 간격을 두고 점진적으로 중단하여야 한다.

- 신기능 장애환자  
이 약은 전신순환을 거친 후 미변화체의 형태로 주로 신장으로 배설된다. 이 약의 클리어런스는 크레아티닌 클리어런스에 직접적인 영향을 받므로 신기능이 저하된 환자에서의 용량감소는 크레아티닌 클리어런스에 근거하여 개별화되어야 한다. 크레아티닌 클리어런스 [표]는 아래의 공식에 의해 결정된다. 크레아티닌 클리어런스(ml/min)<sup>a</sup> =

- [140-age(years)] × 체중(kg)  
72 × 혈청크레아티닌농도(serum creatinine, mg/dl)  
\* 여성의 경우 위의 계산식에서 결과에 0.85를 곱한다.  
이 약은 혈액투석에 의해 혈장에서 효과적으로 제거된다. (4,신기 이내에 50%정도). 혈액투석을 하는 환자에서 프레가발린의 1일 투여용량은 신기능에 근거하여 조정되어야 한다. 신기능에 따른 1일 투여용량 외에 매 4시간 마다 혈액투석을 실시한 후에는 추가로 보충 용량을 즉시 투여하여야 한다.  
[표1] 신기능에 근거한 프레가발린의 용량 적응

| 크레아티닌 클리어런스 (CLcr), (mL/min) | 프레가발린의 1일 총 투여량 <sup>a</sup> |             | 투여방법              |
|------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|
|                              | 시작용량 (mg/일)                  | 최대용량 (mg/일) |                   |
| ≥60                          | 150                          | 600         | BD or TID         |
| ≥30 ~ <60                    | 75                           | 300         | BD or TID         |
| ≥15 ~ <30                    | 25~50                        | 150         | QD or BD          |
| <15                          | 25                           | 75          | QD                |
| 혈액투석 이후의 용량 추가               |                              |             |                   |
|                              | 25                           | 100         | 단회용량 <sup>b</sup> |

- TID = 1일 총 투여량을 3회로 나누어 투여  
BD = 1일 총 투여량을 2회로 나누어 투여  
QD = 1일 1회 투여  
<sup>a</sup> 1일 총 투여용량 (mg/일)은 투여방법에 명시된 바와 같이 나누어서 투여하여야 한다.  
<sup>b</sup> 추가 용량은 단회로 추가 투여되는 용량을 말한다.

- 간기능 장애환자  
간기능 장애환자에서의 용량조정은 필요치 않다.
- 소아 및 청소년 환자  
만 12세 미만의 소아와 만 12~17세의 청소년 환자에 대하여 안전성 및 유효성 자료가 충분하지 않으므로, 투여는 권장되지 않는다.
- 고령자 (만 65세 이상)  
신기능이 저하된 고령자의 경우에는, 용량 감소가 필요할 수도 있다.

## 【사용상의 주의사항】

- 경고  
(1) 자살충동과 자살행동  
① 항간질약을 복용한 환자에서 자살충동 또는 자살행동을 보이는 위험성이 증가되므로 항간질약을 치료받은 환자는 자살충동 또는 자살행동, 우울증의 발현 또는 악화 및 기분과 행동의 비정상적 변화에 대하여 모니터링되어야 한다.  
② 항간질약을 처방받은 간질과 다른 많은 질병은 그 자체가 이환 및 사망, 자살기간 동안의 자살충동과 자살행동의 위험성증가의 관련된다. 따라서 처방자는 항간질약 처방시 환자의 치료기간 동안 자살충동 또는 자살행동과 치료될 질병간의 연관성 여부 및 이 약의 유효성을 함께 고려한다.

- 다음 환자에게 투여하지 말 것  
1) 프레가발린 또는 이 약의 성분에 과민한 환자  
2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성 (galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증 (Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애 (glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 다음 환자에게 신중히 투여할 것  
1) 당뇨병자: 최근 프레가발린의 투여로 체중이 증가된 당뇨병자는 혈당감각제의 용량 조절이 필요할 수 있다.  
2) 혈관부종을 포함한 과민반응이 시판 후 경험에서 보고된 바 있다. 안연, 입주위 및 상기도 부종과 같은 혈관부종의 증상이 나타난 경우에는 즉시 프레가발린을 중단해야 한다.
- 고령자: 프레가발린의 투여에 고령의 환자에서 우연한 상해의 빈도를 증가시킬 수 있는 어려움과 및 졸음과 연관되었다. 시판 후 조사에서 의식 소실, 혼돈, 정신 장애가 보고된 바 있다. 따라서 이 약의 잠재적인 효과에 익숙해질 때까지 주의하도록 환자에게 주지 시키어야 한다.
- 시판 후 경험에서, 프레가발린을 투여한 환자에서 일시적 시야흐림과 시력의 다른 변화가 보고되었다. 프레가발린의 중단으로 이러한 증상이 사라지거나 개선될 수 있다.
- 프레가발린을 보조제로서 투여하여 부작용을 조절할 후 프레가발린을 단독으로 투여하기 위해 병용중인 항간질약을 중단한 경험에 대한 자료는 충분치 않다.
- 프레가발린을 단기간 또는 장기간 치료하다 중단한 후에, 일부 환자에서 불면증, 두통, 구역, 불안, 설사, 인플루엔자 유사증후군, 안절부절, 우울, 흥동, 발작, 다한증 및 어지러움과 같은 급단 증상이 관찰되었다. 프레가발린은 약물 남용과 관련된 수용체에 작용한다고 알려져 있지 않다. 하지만 시판후 자료에서 오용 및 남용 사례들이 보고되었다. 다른 모든 CNS 활성 약물과 마찬가지로, 환자들의 약물 남용 행위를 주의 깊게 검토하고 그들의 프레가발린 오용 및 남용 징후에, 내성의 발전, 투여용량 증량, 약물 추구 행위를 관찰해야 한다.
- 신기능 장애에 대한 약물 중단의 효과가 체계적으로 연구된 바는 없으나, 프레가발린의 중단이나 용량 감소 후에 신기능이 개선되었다는 보고가 있었다.
- 프레가발린 노출과 유효성 성분 투여 시간의 연관성이 불확실한 것으로 보인다. 시판후 조사에서 프레가발린을 투여한 일부 환자의 유효성성분투여가 보고된 바 있다. 임상적으로 유의한 임상 또는 말초혈관 질환이 없는 환자에 대한 단기 시험에 의하면, 고헤임이나 유효성성분투여 같은 심혈관계 합병증과 말초성 부종 사이에 명백한 관련이 나타나지 않았다. 중증의 유효성성분투여 환자에 대한 자료가 충분치 않으므로 이러한 환자들에게는 신중히 투여해야 한다.

## 4. 이상반응

- 이 약의 임상프로그램에서는 12,000명 이상의 환자들에게 약물이 투여되었으며, 이 중 7,000명 이상의 환자들은 이중맹검, 위약대조 임상시험에 참여한 환자들이었다. 가장 흔하게 보고된 이상반응은 어지러움 및 졸음이었다. 이상반응은 대체로 경증에서 중등도로 나타났다. 모든 대조임상시험에서 이 상반응으로 인한 투여의 중단은 프레가발린을 투여한 환자의 14%, 약물을 투여한 환자의 5%에서 나타났다. 투여의 중단을 기제로 가장 흔한 이상반응은 어지러움 및 졸음이었다. 임상 시험들의 위험 분석 (pooled analysis)에서 약물 관련으로 선택된 이상반응을 아래의 표에 기재계(SOC) 및 빈도에 따라 기재하였다. 이런 용어들의 빈도는 임상시험자료 중 모든 인과관계가 있는 이상반응에 기초하였다.  
- 매우 흔하게: ≥1/10  
- 흔하게: ≥1/100, <1/10  
- 흔하지 않게: ≥1/1000, <1/100  
- 드물게: <1/1000  
아래의 표에 기재된 이상반응은 기재질할 및/혹은 병용약물과 연관되어 나타날 수도 있다.  
[표2]. 임상시험 경험에서의 이상반응

| 기관계 (SOC) | 이상반응                                                                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 감염        |                                                                             |
| 흔하게       | 코인두염                                                                        |
| 덜흔 및 림프계  |                                                                             |
| 흔하지 않게    | 중성구감소증                                                                      |
| 대사 및 영양   |                                                                             |
| 흔하게       | 식욕증가                                                                        |
| 흔하지 않게    | 식욕부진, 저혈당                                                                   |
| 장신계       |                                                                             |
| 흔하게       | 흔돈, 방항강장애, 자궁과민성, 우울, 다행강, 성욕감소, 불면증                                        |
| 흔하지 않게    | 이전증, 성강이상증, 인절부절, 초조, 기분동요, 감정적, 감정성상, 적절한 용어 찾기의 어려움, 한 각, 비정상적인 흥, 성욕증가   |
| 드물게       | 공황발작, 억제제, 무감동                                                              |
| 신경계       |                                                                             |
| 매우 흔하게    | 어지러움, 졸음                                                                    |
| 흔하게       | 실조, 운동협조이상, 평형장애, 기억상실, 주의력 장애, 기억력 장애, 떨림, 구음장애, 감각이상, 감각저하, 진정, 졸음증       |
| 흔하지 않게    | 인지력장애, 안구진탕, 언어장애, 간대성근경련, 반사저하, 운동이상, 정신운동성 과민, 체위성지하, 자각과민, 적열감, 활동덜림, 실신 |
| 드물게       | 혼미, 운동저하증, 후각이상, 미각소실, 필기장애                                                 |
| 눈         |                                                                             |
| 흔하게       | 시야흐림, 복시                                                                    |
| 흔하지 않게    | 간접시 상실주변시력상실, 시야장애, 시야결손, 광시증, 안구건조, 안구충창, 시력감소, 안구부종, 눈비로, 눈물분비증가, 안구 자극   |
| 드물게       | 신동, 진동시, 시야의 일시적인 변화, 사시, 시야 밝음(brightness)                                 |
| 귀 및 미로    |                                                                             |
| 흔하게       | 현훈                                                                          |
| 흔하지 않게    | 청각과민증                                                                       |
| 심장계       |                                                                             |
| 흔하지 않게    | 1도 방실전진, 빈맥, 동성상맥                                                           |
| 드물게       | 동성빈맥, 동성부정맥                                                                 |
| 혈관계       |                                                                             |
| 흔하지 않게    | 저혈압, 고혈압, 흉조, 인면홍조, 말초 냉증                                                   |
| 호흡기계      |                                                                             |
| 흔하지 않게    | 호흡곤란, 비출혈, 기침, 비출혈, 비염, 코골이                                                 |
| 드물게       | 인후건장, 비강건조                                                                  |
| 소화기계      |                                                                             |

|              |                                                                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 흔하게          | 구토, 복부팽만, 변비, 구강건조, 고창(방기)                                                                           |
| 흔하지 않게       | 타액분비과다, 역류성식도염, 구강감각 저하                                                                              |
| 드물게          | 복수, 연하곤란, 체장염                                                                                        |
| 피부 및 피하조직    |                                                                                                      |
| 흔하지 않게       | 발한, 구진상 발진, 두드러기                                                                                     |
| 드물게          | 신은증                                                                                                  |
| 근골격계 및 결합조직  |                                                                                                      |
| 흔하게          | 근육경련, 관절통, 동통증, 사지통증, 자궁경부경련                                                                         |
| 흔하지 않게       | 관절충창, 근육통, 근육연축, 목의 통증, 근육경직                                                                         |
| 드물게          | 항문근응어                                                                                                |
| 신장 및 비뇨기계    |                                                                                                      |
| 흔하지 않게       | 배뇨장애, 요실금                                                                                            |
| 드물게          | 요감소, 신부전                                                                                             |
| 생식계 및 유방     |                                                                                                      |
| 흔하지 않게       | 발기부전, 사정장애, 성기능장애, 혈정통                                                                               |
| 드물게          | 무월경, 유방통, 유방분비물, 유방비대                                                                                |
| 전신이상 및 투여 부위 |                                                                                                      |
| 흔하게          | 말초부종, 부종, 보행이상, 넘어짐, 취한느낌, 느린 이상, 피로                                                                 |
| 흔하지 않게       | 홍부조임감, 전신부종, 통증, 발열, 오한, 무력, 갈증                                                                      |
| 검사           |                                                                                                      |
| 흔하게          | 채증증가                                                                                                 |
| 흔하지 않게       | 일라닌 아마노트랜스페라제(ALT) 증가, 혈중 크레아티닌 포스포키나제 증가, 아스파티트 아마노트랜스페라제(AST) 증가, 혈당 증가, 혈소판 수치 감소, 혈중 칼륨 감소, 채증감소 |
| 드물게          | 혈중 크레아티닌 증가, 백혈구 수치 감소                                                                               |

## 2) 시판 후 조사에서 나타난 이상반응

- 국외 시판 후 경험  
- 면역계: 흔하지 않게: 과민성, 드물게: 혈관부종, 알레르기 반응  
- 신경계: 매우 흔하게: 두통, 흔하지 않게: 의식 소실, 정신 장애  
- 눈: 드물게: 각막염  
- 심장: 드물게: 유효성 성분투  
- 호흡기계: 드물게: 폐부종  
- 소화기계: 흔하게: 구역, 설사, 드물게: 허부종  
- 피부 및 피하조직: 흔하지 않게: 인면 부종, 가려움  
- 신장 및 비뇨기계: 드물게: 요저류  
- 생식계 및 유방: 드물게: 여성형 유방증  
- 전신이상 및 투여부위: 흔하지 않게: 권태  
빈도불명의 소크, 아나필락시스 유사 증상, 피부점막안종후군(스티븐스-존슨 증후군), 다형홍반이 나타날 수 있으므로 잘 관찰하고, 이상이 확인되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 조치를 취한다.
- 국내 시판 후 조사 결과  
국내에서 자살시를 위하여 6년 동안 3,996명을 대상으로 실시한 사용성적 조사 결과 인과관계에 상관없이 유해사례를 발견했을 4,96%(195명/3,926명, 262건)로 보고되었고, 이 중 이 약과 인과관계가 없는 것은 약물유해반응 발현율은 4.30%(169명/3,926명, 226건)이었다. 졸음은 1.73%(68명/3,926명, 68건)로 가장 많았고, 어지러움 1.7%(67명/3,926명, 67건), 구강건조 0.53%(21명/3,926명, 2건), 부종 0.31%(12명/3,926명, 12건), 현훈 0.18%(7명/3,926명, 7건), 구토, 말초부종이 각각 0.13%(5명/3,926명, 5건), 떨림, 경련약제 사용 각각 0.10%(4명/3,926명, 4건)순으로 나타났다 그 밖에 0.1% 미만으로 보고된 약물유해반응을 기관별로 분류하면 다음과 같다.  
- 전신: 피로, 무력, 보행이상  
- 정신계: 성욕감소, 수면장애, 불면증  
- 신경계: 운동실조, 구아장애, 감각이상, 기억력장애, 주의력장애  
- 소화기계: 변비, 위장장애, 헛배  
- 신장 및 비뇨기계: BUN증가, 요실금, 배뇨곤란  
- 생식계: 유방: 발기부전  
- 대사 및 영양: 저혈당, 식욕증가  
- 눈: 복시, 시야흐림  
- 귀 및 부속기관: 귀울림  
- 피부 및 피하조직: 안면부종, 피부질환  
- 검사: 혈중크레아티닌증가, 채증감소  
이 중 시판 전 임상시험에서 나타나지 않았던 예상하지 못한 약물유해반응은 경련약제 0.10%(4명/3,926명, 4건), 위장장애, 귀울림, 수면장애, 피부질환, BUN증가, 헛배미 각각 0.03%(4명/3,926명, 1건)으로 보고되었고, 중대한 유해사례가 인과관계와 상관없이 2명에서 32건(대장암증, 위장장애, 폐암) 보고되었다.  
신장에 환자에서 유해사례 발현율이 15.71%(11명/70명, 14건)로 높게 보고되었고, 이 중 이 약과 인과관계를 배제할 수 없는 약물유해반응은 10.00%(7명/70명, 10건)로 관찰되었다.

- 항간질약을 치료받은 환자는 자살충동 또는 자살행동, 우울증의 발현 또는 악화 및 기분과 행동의 비정상적 변화를 보인다. 11종의 다른 항간질약을 사용하여 1990개의 위약-대조 임상 시험(단독위약과 부가요법)을 분석한 결과 항간질약 복용환자는 위약 투여환자와 비교 시 약 2배의 자살충동 또는 자살행동의 위험을 보였다. 12주의 치료기간 동안 자살행동 또는 자살충동 발생율은 27.864명의 항간질약 치료환자에서 0.43%였으며 16,029명의 위약 투여 환자에서는 0.24%였다. 이는 치료받은 530명 환자 중 한 명은 자살 충동 또는 자살 행동을 보인 것을 의미한다. 두 약물 치료 환자에서 4건의 자살이 있었고 위약 치료 환자에서의 자살은 없었다. 그러나 치료 예수가 너무 적어 이 약과 자살의 연관성을 결론지을 수는 없다. 항간질약 복용에 의한 자살충동 또는 자살행동의 위험증가는 약물치로 시작 초기 1주에 관찰되었고 치료기간 동안 지속되었다. 대부분의 임상시험은 24주 이상을 초과할 수 없었으며 24주를 초과한 자살충동 또는 자살행동의 위험은 평가할 수 없었다. 자살충동 또는 자살행동 위험은 분석된 11종의 항간질약에서 일관적이었다. 다만 작용기전과 사용방법을 가진 항간질약에서의 위험성 증가는 어떤 효능으로든 사용된 모든 항간질약에 대해서도 위험성이 있음을 나타낸다. 그 위험성은 분석된 임상시험에서 연령(5~100세)에 따라 차이가 나지는 않았다.

- 국내 자발적 이상사례 보고자료(1989~2014년)를 분석한 결과, 이상사례가 보고된 다른 약품들에서 발생한 이상사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례는 다음과 같이 나타났다. 다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.  
· 정신계: 성망

- 국내 시판 후 이상사례 보고자료(1989~2015년 6월)를 토대로 실마리정보 분석·평가 결과 새로 확인된 이상사례는 다음과 같다. 다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.  
· 신경계: 어버(알콜아비)

- 일반적 주의  
(1) 환자 및 보호자에게 항간질약이 우울증의 징후 및 증상의 발현 또는 악화, 비정상적 기분과 행동의 변화, 자살충동 및 자살행동 또는 자해충동의 위험을 증가시킬 수 있음을 알려 환자에게 이러한 증상 또는 행동이 발현될 경우 즉시 의료전문가에게 보고할 수 있도록 한다.

- 이 약의 유효성은 당뇨병성 말초 신경병증 및 대성 포진후 신경통 환자를 대상으로 한 임상시험에서 입증되었다. 다른 신경병증성 통증에 대한 유효성은 평가되지 않았다.
- 오전 및 기개 사용에의 영향: 이 약은 어지러움 및 졸음을 유발할 수 있다. 환자들은 이 약이 환자들과의 이런 활동에 영향을 주는지에 대해 알기 전까지는 이 약을 복용하는 동안 운전 및 복잡한 기계의 조작 혹은 잠재적인 위험성이 있는 활동을 하지 않도록 권고되어야 한다.

- 상호작용  
(1) 프레가발린은 인체에서 거의 대사되지 않으며, 주로 미변화체로 노 배설된다(2%미만의 용량만이 대변으로 노에서 배출수 됨). in vitro에서 약물의 대사를 저해하지 않으며, 혈장 단백질에 결합하지 않아 약동학적 상호작용을 유발하지 않고, 또한 이에 영향을 받지 않는 것으로 보인다.
- 따라서, in vivo시험에서 프레가발린과 페니토인, 카바마제핀, 발프로산, 라모트리진, 가비펜틴, 로라제팜, 옥시코돈, 에탄을 사이에는 임상적으로 연관성 있는 약물학적 상호작용은 관찰되지 않았다. 모진간에 대한 약동학적 분석에서 경구용 혈당감각제, 아노제, 인슐린, 페노바르비탈, 티가빈과 및 토피라메이트는 프레가발린의 클리어런스에 임상적으로 유의적인 영향을 주지 않는 것으로 나타났다.
- 프레가발린과 노르에피네프린 및/혹은 에피네프린 에스트라디올과 같은 경구피임제의 병용투여는 상호간의 항성 상태의 약동학에 영향을 미치지 않았다.
- 대조 임상시험에서, 프레가발린과 옥시코돈, 로라제팜, 에탄올의 다회 병용투여는 효소에 임상적으로 중요한 영향을 미치지 않았다. 프레가발린은 옥시코돈으로 인해 발생한 인지기 및 운동기능의 감소에 영향을 미친다. 프레가발린은 에탄올 및 로라제팜의 효과를 중립시킬 수 있다.

- 시판 후 조사에서, 프레가발린과 다른 중추신경계 억제제를 복용한 환자에서 호흡부전과 혼수가 보고된 바 있다.
- 시판 후 조사에서, 아편유사 진통제와 같은 변비 유발 성분의 약물과 병용투여 시, 하트소회기계 기능 감소 (예를 들어, 장폐쇄증, 무력 장폐쇄증, 변비)와 관련된 사례가 보고된 바 있다.
- 고령의 지인자에서 약동학적 상호작용에 대한 연구는 행하여지지 않았다.
- 임부 및 수유부에 대한 투여  
(1) 임부: 임부를 대상으로 프레가발린을 투여한 적절한 자료는 없다. 동물을 대상으로 한 시험에서 생식독성이 나타났다. 인체에서의 잠재적인 위험성은 밝혀지지 않았다. 따라서, 이 약은 치료상의 유익성이 태아에 대한 위험성을 상회하는 경우를 제외하고는 임부에 투여하지 않는다. 기임여성에서 투여시 호과적인 피임법을 실시해야 한다.
- 수유부: 프레가발린은 수유부의 모유 중으로 이행된다. 영아에 대한 프레가발린의 안전성은 밝혀진바 없으므로, 프레가발린을 투여하는 동안 수유는 권장되지 않는다. 영아에 대한 모유수유의 유익성과 산모에 대한 치료의 유익성을 고려하여 모유수유를 중단할지 또는 프레가발린 투여를 중단할지 결정해야 한다.
- 고령자에 대한 투여 (만 65세 이상)  
고령자에서 연령 증가에 따라 프레가발린의 클리어런스는 감소하는 경향이 있다. 프레가발린의 경우 클리어런스의 감소는 고령에 따른 크레아티닌 클리어런스의 감소와 연관된다. 연령 증가에 따라 신기능이 저하된 환자에서 이 약의 용량조정이 필요할 수 있다.
- 과량투여시의 처치  
시판 후 조사에서, 프레가발린의 과량투여시 관찰된 가장 흔한 이상반응은 청동장애, 졸림, 혼돈 상태, 우울증, 등요, 안절부절이었다. 발작도 보고되었다. 프레가발린을 과량 투여 시, 일반적인 보조요법(supportive measures) 및 필요하다면 혈액투석이 필요하다.
- 보관 및 취급상의 주의사항  
(1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.  
(2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지 면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.
- 의약품동등성시험 정보<sup>a)</sup>

- 시험약 프레가발린캡슐150밀리그램 [대한제약(주)]과 대조약 리리카캡슐 150밀리그램(프레가발린)(한국화이자제약(주))을 2×2 교차시험으로 각 1캡슐씩 건강인 성인에게 공복 시 단회 경구투여하여 32명의 혈중 프레가발린을 측정할 결과, 비교평가항목(AUC<sub>0-∞</sub>, C<sub>max</sub>)을 비교하면 통계적으로 유의한 차이가 없었다. 평균치 차의 90%신뢰구간이 log 0.89에서 log 1.25 이내로서 생물학적으로 동등함을 입증하였다.

| 구분                                                                                                                                                                                                                                                                             | 비교평가항목                                                       |                                          | 참고평가항목                   |                          |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | AUC <sub>0-36h</sub><br>( $\mu\text{g} \cdot \text{hr/mL}$ ) | C <sub>max</sub><br>( $\mu\text{g/mL}$ ) | T <sub>max</sub><br>(hr) | t <sub>1/2</sub><br>(hr) |             |
| 대조약                                                                                                                                                                                                                                                                            | 리리카캡슐150밀리그램<br>[프레가발린]<br>[한국화이자제약(주)]                      | 25.40 ± 2.76                             | 4.910 ± 0.352            | 1.00<br>(0.67 ~2.00)     | 6.05 ± 0.56 |
| 시험약                                                                                                                                                                                                                                                                            | 프레가발린캡슐150밀리그램<br>[대한제약(주)]                                  | 26.60 ± 3.18                             | 5.070 ± 1.220            | 0.67<br>(0.67 ~2.00)     | 5.98 ± 0.84 |
| 90% 신뢰구간*<br>(기준: log 0.8 ~ log 1.25)                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |                                          |                          |                          |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              | log 1.0302<br>~ 1.0646                   | log 0.9567<br>~ 1.0963   | —                        | —           |
| AUC, C <sub>max</sub> , t <sub>1/2</sub> : 평균값 ± 표준편차, T <sub>max</sub> : 중앙값(범위), n = 32)<br>AUC: 투약시간부터 최종혈중농도 정량시간 167자의 혈중농도-시간<br>곡선하면적<br>C <sub>max</sub> : 최고혈중농도<br>T <sub>max</sub> : 최고혈중농도 도달시간<br>t <sub>1/2</sub> : 말단 소실 반감기<br>* 비교평가항목치를 로그변환한 평균치 차의 90%신뢰구간 |                                                              |                                          |                          |                          |             |

- 의약품동등성시험기준 제7조제2항에 따라, 시험약 프레가발린캡슐75밀리그램 [대한제약(주)]을 대조약 프레가발린캡슐150밀리그램 [대한제약(주)]과 비교용출시험자료를 제출하였으며, 대조약과 용출용출성이 동등하였다. 이에 따라 해당 자료로서 생물학적동등성을 입증하였다.

- 이 약은 대한제약(주) 프레가발린캡슐 75밀리그램 및 150밀리그램과 동일한 원료를 사용하여 동일한 제조방법으로 큰 공정을 대한제약(주)에 제조하였음.

## 12. 기타

- 전임성 안전성 자료  
(1) 동물에 대한 약리학적 안전성시험결과 프레가발린은 임상적으로 연관된 용량에서 내약성이 양호한 것으로 나타났다. 핏트 및 현상이에 대해 실시한 반복투여 독성시험에서 활동감소, 활동증가 및 운동장애와 같은 중추신경계에 대한 영향이 관찰되었다. 임상 최고 추천 용량에서의 인체 평균 노출의 5배 이상에 해당하는 용량에 장기간 노출된 고령의 albino 랫드에서 임의위축 빈도의 증가가 관찰되었다.
- 프레가발린은 마우스, 랫드, 혹은 토끼에서 태아독성을 유발하지 않았다. 랫드 및 토끼에서의 태아독성은 인체 투여용량보다 4배나 높고 비교하여 24배의 노출에 해당하는 용량에 노출된 랫드에서 종양은 관찰되지 않았다. 또한, 평균 인체 노출용량과 비슷한 용량에 노출된 마우스에서 종양빈도의 증가는 관찰되지 않았다. 그러나 고용량의 노출에서 혈관육종 빈도의 증가가 관찰되었다. 마우스에서 프레가발린으로 유도된 종양형성의 기전은 혈소판 변화 및 내피세포증가와 연관된 비유전적인 기전이었다. 단기 간 및 제한된 장기간의 임상시험을 근거로 핏트 및 인체에서는 혈소판변화가 나타나지 않았다. 따라서 이것과 연관된 인체에서의 위험성의 증가는 없다.
- 어린 (Juvenile) 랫드에서 나타난 독성의 종류는 성인 랫드에서 관찰된 것과 정적으로 다르지 않았으나, 태자 랫드에서 좀 더 예민하였다. 치료용량의 노출에서, 활동증가, 이갈이 및 성장에 대한 약간의 변화(일시적인 체중 증가 억제)등의 중추신경계 임상증후의 증가가 있었다. 발정주기에 대한 효과는 인체 치료노출의 5배에서 관찰되었다. 인체 치료 노출의 2배 이상의 용량에 1~2주 동안임상적 놀람 반응/5주 동안(학식/기력) 노출된 랫드의 태아에서 신경형통/인자에 대한 영향이 관찰되었다. 인체치료노출의 2배 이상의 용량으로 1~2주 동안 인체에서 관찰된 증상의 유사성이 나타났다. 9주 동안 노출한 후에는 이러한 효과가 더 이상 관찰되지 않았다.

## 【포장단위】 30캡슐/병

## 【저장방법】 기밀용기, 실온(15~30℃)보관

## 【제조회사】 (주)씨트리 / 경기도 남양주시 경강로 27

## 【제 조 자】 대한제약(주) / 경기도 화성시 향남읍 제왕곡관리길 24

- 의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- 본 의약품은 KGM프리케이션에서 제조하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 경과 되었거나 변질 · 변색 또는 오염 및 손상된 제품이 발견될 경우 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.
- 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)의 의약품 정보를 참조하십시오.
- 기타 자세한 사항이나 문의는 작성일자(2019. 04. 04) 이후 변경된 내용은 소비자상담실(080-558-7575)로 문의하시기 바랍니다.
- 부적응 보고 : 한국 의약품안전관리원(1644-6223)