

병중 · 병후 영양소관리

아로나민[®] 케어복합제 정

일반의약품

분류번호

319 (기타의 비타민제)

다음과 같은 경우에 좋습니다.



병의 관리로 인해 육체피로가 쌓였을 때

- ✓ 비타민 B₁, B₉, B₁₂, D, E
- ✓ 칼륨, 칼슘, 아연
- ✓ 마그네슘, 철, CoQ10
- ✓ 필수 미네랄 함유

원료약품 및 분량 (1정 중)

- 유효성분 :
 - 콜레칼시페롤 과립(비타민D로서 100IU)(별규) 1.0mg
 - 티아민질산염 3배산(티아민질산염으로서 20mg)(KP) 60.0mg
 - 폴산(USP) 0.4mg
 - 무수인산수소칼슘(총칼슘으로서 50mg)(KP) 169.72mg
 - 산화마그네슘(마그네슘으로서 50mg)(KP) 82.78mg
 - 염화칼륨(칼륨으로서 50mg)(KP) 94.87mg
 - 산화아연(아연으로서 30mg)(KP) 37.4mg
 - 유비데카레논10%(유비데카레논으로서 10mg)(별규) 100.0mg
 - 토코페롤아세이트2배산(토코페롤아세이트로서 50IU)(KP) 100.0mg
 - 시아노코발라민 100배산(시아노코발라민으로서 1000μg)(별규) 100.0mg
 - 푸마르산철(철로서 15mg)(KP) 45.75mg
- 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소, 우유)
- 기타 첨가제 : 글리세릴디베헤네이트, 미결정셀룰로오스, 오파드라이 AMB II 분홍색(88A640030), 오파드라이III클리어(85F19250), 오파드라이흰색(OY-S-7223), 코포비돈, 크로스카르멜로오스나트륨

성 상 어두운 분홍색의 타원형 필름코팅정

Aro-CP

효능 · 효과

- ▶ 다음 경우의 비타민 B₁, D, E의 보급
 - 육체피로
 - 임신 · 수유기
 - 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하
 - 발육기
 - 노년기
- ▶ 아연의 보급

용법 · 용량 성인 1일 1회 1정을 복용합니다.

사용상의 주의사항

- 경고
 - 1) 철 함유제제는 만 6세 이하의 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우 중독성 사망을 일으킬 수 있으므로 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
 - 1) 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자

※5030710-1190610

- 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 만 12개월 미만의 젖먹이
- 고칼슘혈증 환자
- 혈색소증(철대사 이상으로 철이 간장, 췌장(이자)에 침착하는 질환), 헤모시데린침착증, 비철결핍성 빈혈
- 신장결석 환자
- 심한 증상의 신부전 환자
- 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.
 - 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - ① 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있습니다.
 - 3) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성(특정 부분에 나타나는)대장염 등의 위장질환 환자
 - 4) 심장 · 순환기계기능 장애 환자
 - 5) 신장장애 환자
 - 6) 저단백혈증 환자
 - 7) 강심배당체를 투여 중인 환자
 - 8) 알칼리증, 소화성궤양 환자
 - 9) 신장결석 병력이 있는 환자
 - 10) 임부
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
 - 상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.
 - 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우: 구역, 구토, 설사, 위부불쾌감, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 몹은 변, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 피부발진, 두드러기, 가려움, 광선과민반응, 복부 · 위통증, 경련, 열, 혼수, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하, 고칼슘혈증, 가스참, 위장통증, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 폐부종.
 - 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨리지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있습니다.
 - 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있습니다.
 - 4) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.
 - 5) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
 - 6) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있습니다.
 - 7) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 복용(사용))투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
 - 8) 우발적으로 과량복용 한 경우
 - 9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 기타 이 약의 복용 시 주의사항
 - 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지켜십시오.
 - 2) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.
- 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관하십시오.
 - 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

저장 방법 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

포장 단위 30정/병

- 이 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.
- 이 설명서는 2019년 6월 10일자로 작성되었으며 이후로 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품 등 검색(<https://nedrug.mfds.go.kr/>)에서 확인할 수 있습니다.
- 부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

ILDONG 일동제약주식회사

본사 : 서울특별시 서초구 바우뚝로27길 2

공장 : 경기도 안성시 공단1로 25

소비자상담실 : (전화) 080-022-1010 (수신자부담)

※5030710-1190610