전문의약품

프리가반 캡슐 75mg

(프레가발린)

KGMP 적격업체제품

전문의약품

프리가반 캡슐 75mg

(프레가발린)

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중

유효성분 : 프레가발린(별규) ---- 75.0mg

첨가제(동물유래) : 유당수화물(소의 우유)

기타첨가제 : 옥수수전분, 탈크, 경질캡슐

【성 상】 흰색 또는 연한 노란색을 띠는 흰색의 분말이 든 상부 적갈색, 하부 흰색의 경질캡슐제

【효능 · 효과】

1. 성인에서 말초와 중추 신경병증성 통증의 치료
2. 간질

   성인에서 이차적 전신증상을 동반하거나 동반하지 않은 부분발작의 보조제
3. 섬유근육통의 치료

【용법 · 용량】

이 약은 프레가발린으로서 1일 총 투여용량을 1일 2회로 나누어 음식물과 상관없이 경구 투여한다. 이 약은 주로 신장으로 배설되므로, 신기능이 저하된 환자에 대해서는 용량이 조절되어야 한다. ('5. 신기능 장애환자'항 참고)

1. 신경병증성 통증

   1) 말초 신경병증성 통증

   성인: 이 약은 시작용량으로 1일 150 mg을 투여할 수 있다. 개개 환자에서의 반응과 내약성에 근거하여 3일 내지 7일 후에 1일 300 mg까지 증량할 수 있다. 필요하다면, 이후 7일 간격으로 1일 최대 600 mg까지 증량할 수 있다.

   2) 중추 신경병증성 통증

   성인: 이 약은 시작용량으로 1일 150 mg을 투여할 수 있다. 개개 환자에서의 반응과 내약성에 근거하여 1주일 후에 1일 300 mg까지 증량할 수 있다. 추가로 1주일 후에 목표 1일 용량인 600 mg까지 증량할 수 있다. 목표 1일 용량에서 내약성을 나타내지 않을 경우 용량 감소가 고려될 수 있다. ('4. 투여의 중단'항 참고)

2. 간질

   성인: 이 약은 시작용량으로 1일 150 mg을 투여할 수 있다. 개개 환자에서의 반응과 내약성에 근거하여 일주일 후에 1일 300 mg까지 증량할 수 있다. 필요하다면, 이 후 7일 간격으로 1일 최대 600 mg까지 증량할 수 있다.

3. 섬유근육통

   섬유근육통에 대한 이 약의 권장 용량은 1일 300 mg ~ 450 mg 이다. 이 약은 시작 용량으로 75 mg 씩 1일 2회 (1일 150 mg)를 투여하며, 유효성과 내약성에 근거하여 1주일 이내에 150 mg 씩 1일 2회 (1일 300 mg) [illegible]

[illegible]