

AM

500정



위·십이지장 궤양의 신속한 증상 개선 일반의약품/조제용

일알마게이트 정

500밀리그램

500정

■ **원료약품 및 그 분량:** 1정 중 · 유효성분: 알마게이트(KP) 500mg

(정·가제동물유래성분: 유당수화물(소, 우유) · 기타첨가제: 스테아르산, 마그네슘, 전분, 글리콜렌산나트륨, 콜로이드성 아산화규소

■ **성상:** 백색의 정형형 정제

■ **효능·효과**

다음 질환의 증상완화 및 증상의 개선: 위·십이지장궤양, 위염, 위산과다, 속쓰림, 구역, 구토, 위통, 신트림

■ **용법·용량**

성인 및 12세 이상의 소아: 알마게이트로써 1회 1g을 1일 3회, 식후 30분 ~ 1시간에 씹어서 경구 복용한다. 필요시 취침 전에 1회 더 복용할 수 있다.

■ **사용상의 주의사항**

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 이 약 또는 이 약의 구성 성분에서 과민반응이 있는 환자
- 2) 알츠하이머병 환자
- 3) 치질 환자
- 4) 체력 저하(부기) 환자
- 5) 임신 중독증 환자
- 6) 설사 환자
- 7) 진단되지 않은 소화기관 출혈 환자
- 8) 이 약을 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

테트라사이클린계 항생물질(함께 복용시 흡수를 억제할 수 있음)

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 다른 약물을 복용하고 있는 사람: 이 약의 흡착작용 또는 소화관내 체액의 pH 상승에 의해 함께 복용하는 약물의 흡수·배설에 영향을 줄 수 있으므로 신중히 복용한다.

(1) 비스테로이드성염증제(NSAID), 궤양 치료제, 디기탈리스 제제, 클로르프로마진, 란소프라졸, 프레드니솔론, 페니실린, 퀴놀론, 철(Fe)염 제제: 흡수를 감소시킬 수 있으므로 2~3 시간 간격을 두고 복용한다. (2) 설리살실염: 신장의 배설을 증가시킨다.

2. 신장에 환자: 마그네슘 또는 알루미늄이온이 오랜 기간 동안에 걸쳐 공발에 축적될 수 있다. 심한 신장애 환자에게는 권고되지 않는다.

3. 신체 허약자, 인 힘량이 낮은 식이 요법 실시자, 소화 흡수 장애가 있는 사람: 이 약의 알루미늄염이 인 흡수를 감소시키므로 장기적 복용할 경우, 혈중 인산염함량 감소 및 뼈의 무기질 침착장애를 야기할 수 있음. 4) 고령자 5) 혈액구토 또는 흑색 대변 등과 같은 소화기관 출혈 증상이 있는 환자 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 소화기계: 이 약을 복용하는 동안 변비 또는 설사 2) 2주정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 2) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것.

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것. 3) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.

■ **저장방법:** 밀폐용기, 실온(1~30°C) 보관 ■ **포장단위:** 500정/병 ■ **제조/판매자:** 일성신약㈜, 경기도 안산시 단원구 신전로 349 (B동제외, D 동일부제외) ■ **제조사:** 한국코리스크㈜, 충청북도 제천시 강서로 30

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽으시고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오

※ 처방된 증상, 처방된 환자 이외에는 사용하지 마십시오.

※ 첨부문서에 기재되어 있지 않은 부작용이 나타날 경우, 의사나 약사 또는 식품의약품안전처에 알려십시오.

※ 사용(유효)기한이 경과한 의약품은 사용하지 마십시오.

※ 본 의약품은 KGMP(의약품 제조 및 품질관리기준)에 의하여 엄격한 관리를 받은 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품이 발견된 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 제품 설명내용의 최종 개정 연월일(2022.06.08) 이후 변경된 내용은 www.ilsung-ph.co.kr이나 소비자상담실(02-3271-8800)을 통해 확인할 수 있습니다.

※ 의약품 사용 후 부작용 발생 시 한국약품안전관리원(14-3330, 1644-6223)에 의약품 부작용 신고 및 피해구제 상담을 할 수 있습니다.

일성신약(주)
www.ilsung-ph.co.kr

제조번호:

사용기한:

50×20mm