

비타민 캡슐

복용하시기 전에 설명서를 주의깊게 읽어보시고, 반드시 제품과 함께 보관하십시오.

[제품명] 비타민캡슐

일반 의약품

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중

- 유효성분: 베타인염산염(USP) 200mg, 합당펩신(KP) 100mg(단백소화력 500단위 이상)
- ※ 동물유래성분: 합당펩신
- 첨가제(동물유래성분): 유당수화물(소의 우유)
- 기타첨가제: 경질무수구산, 경질캡슐제(상부, 하부 백색), 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 옥수수전분, 크로스카르멜로오스나트륨

[성상] 옅은 미황색 분말이 든 상·하부 백색의 불투명 경질캡슐제

[효능·효과] 식욕감퇴(식욕부진), 위부팽만감, 소화불량, 과식, 체한, 구역, 구토, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감

[용법·용량] 성인 1회 1캡슐을 1일 3회 식후에 복용한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- (1) 만 7세 이하의 어린이
- (2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

- (1) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람
- (2) 다른 약물을 복용하고 있는 사람

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것 상당시 이 첨부문서를 소지할 것.

- (1) 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- (1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.

5. 저장상의 주의사항

- (1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것
- (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것
- (3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 120캡슐, 300캡슐

[제조사] 경남제약(주) 충청남도 아산시 산향면 서부남로 790번길 49

[판매처] 와이드메디텍(주) 서울특별시 송파구 중대로25길 4-8 와이드빌딩 1층

[소비자 상담전화] 080-232-8600

※ 기타주의

1. 허가된 효능·효과와 다른 용도로 사용시에는 예상하지 못한 부작용이 나타날 수 있습니다.
2. 사용기한이 지난 제품은 변질의 우려가 있으므로 복용을 금하시기 바랍니다.
- ※ 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사·약사 및 자사 소비자 상담실로 문의하시기 바랍니다. (소비자 상담전화: 080-232-8600)
- ※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염된 제품이 발견될 경우 공정거래위원회고시 "소비자분쟁 해결기준"에 의거 구입한 곳에서 교환 또는 환불 받을 수 있습니다.
- ※ 의약품의 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템「<http://ne.drug.mfds.go.kr>」 → 「의약품 등 검색」을 참조하시기 바랍니다.

경남제약(주)
Kyung Nam Pharm. Co., Ltd.

첨부문서 작성연월일: 2019. 05. 31

PR0132-J01