

• 반드시 첨부문서를 읽은 후 사용(복용)하시고 첨부문서는 약과 함께 보관하십시오.
• 올바른 사용(복용)법을 모르거나 의문사항이 있는 경우, 의사·약사와 상담하시기 바랍니다.



일반의약품

본에탐 Bone-etop
Soft caps

Bone-etop soft capsules

【원료약품의 분량】 1캡슐 중

유효성분 : 글루콘산칼슘수화물(JP)(칼슘으로서 14.3 mg) 160 mg
인산수소칼슘수화물(USP)(칼슘으로서 137.41 mg, 인으로서 106.19 mg) 590 mg
농축콜레칼시페롤(유상)(BP)(비타민D로서 1000 I.U) 1mg
산화마그네슘(KP)(마그네슘으로서 12.06 mg) 20 mg

첨가제(타르색소) : 적색40호, 청색1호, 황색5호

동물유래성분 : 농축콜레칼시페롤(유상) (기원동물 : 양, 사용부위 : 털)

기타첨가제 : 농글리세린, 데시틴, 비결정성소르비톨액, 산화티탄, 아자경화유, 젤라틴, 콩기름, 폴리소르베이트80, 황납

【성상】

유백색의 유상 내용물을 함유한 얇갈색의 장방형 연질캡슐

【효능 · 효과】

1. 다음 경우의 비타민 D 의 보급
- 임신 · 수유기, 발육기, 노년기
2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같다.
- 비타민D(농축콜레칼시페롤(유상))
- 뼈, 이의 발육불량
- 구루병의 예방

【용법 · 용량】

만 12세 이상 및 성인 1일 1회, 1회 1캡슐 복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
 - 1) 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장(콩팥)질환 환자
 - 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - 3) 만 12개월 미만의 젖먹이
 - 4) 신장(콩팥)결석 환자
 - 5) 심한 증상의 신부전 환자
 - 6) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
 - 7) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.
 - 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
① 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있습니다.
 - 3) 심장 · 순환기계기능 장애 환자
 - 4) 신장(콩팥)장애 환자

— 뒷면계속

- 5) 저단백혈증 환자
- 6) 강심배당체를 투여 중인 환자
- 7) 신장(콩팥)결석 병력이 있는 환자
- 8) 임부
- 9) 고지단백혈증, 당뇨병성고지혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
- 10) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.
4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.
 - 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
구역, 구토, 설사, 변비, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 피부발진, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하
 - 2) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
 - 3) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있습니다.
 - 4) 항알도스테론제, 트리암테논과 병용투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
 - 5) 우발적으로 과량복용 한 경우
 - 6) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
 - 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지키십시오.
 - 2) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.
 - 3) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장합니다.
이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절합니다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.
6. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관하십시오.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관하십시오.
 - 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1 ~ 30 ℃)보관

【포장단위】 60캡슐/상자(10캡슐/PTP X 6)

【문의전화】 본사 : (02)2021-9300, 소비자상담실 : 080-023-1897(수신자요금부담)

【제조회사의 동화약품(주), 충청북도 충주시 충주산단1로 167

【제조사】 코스맥스바이오(주), 충청북도 제천시 바이오밸리3로 30

본 의약품은 KGMP 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우 공정거래위원회지 소 소비자 분쟁해결기준에 의거, 구입처를 통하여 교환 또는 환불 받을 수 있습니다.

※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원 (1644-6223)

※ 이 첨부문서 작성일자(2019년 5월 3일) 이후 변경된 내용은 www.dong-wha.co.kr에서 확인하실 수 있습니다.