

※ 의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽으시고, 의약품과 함께 보관하십시오.

전문 의약품
분류번호 339

리네스타정

원료약품 및 그 분량 1정 중			
■ 유효성분 : 실로스타졸(법규)..... 100mg 은행엽건조엑스(생규)..... 80mg ■ 첨가제(동물유래) : 유당수화물/스/우유 ■ 첨가제(타르색소) : 황색203호, 청색2호 ■ 기타첨가제 : 마걸장셀룰로오스, 폴리미디성아민산화규소, 저치환도하이드록시프로필셀룰로오스, 히드록시프로필셀룰로오스, 전분글리콜산나트륨, 스테아르산마그네슘, 오파드라이 II 녹색(BF41079) <tr> <td>성상</td></tr> <tr> <td>연두색의 둥근형 필름코팅정제</td></tr> <tr> <td>효능·효과</td></tr>	성상	연두색의 둥근형 필름코팅정제	효능·효과
성상			
연두색의 둥근형 필름코팅정제			
효능·효과			

다음 질환에 대하여 실로스타졸 단독요법으로 효과가 불충분한 경우, 실로스타졸과 은행엽건조엑스 제제의 병용요법에 대한 대체요법

- 만성동맥색증(버거씨병, 폐색성 동맥경화증, 당뇨병성 말초혈관병증 등에 따른 괴창, 등통 및 냉감 등 허혈성 제증상의 개선
- 뇌경색(심인성 뇌색전증 제외) 발생 후 재발억제

용법·용량
이 약은 1회 용량으로 실로스타졸 100밀리그램과 은행엽건조엑스 80밀리그램을 1일 2회 병용투여 시 효과가 충분한 성인 환자에 대하여 대체요법으로 투여한다. 통상 성인에 대하여 1일 2회, 1회 1정을 경구투여한다.
사용상의 주의사항

1. 경고

이 약은 실로스타졸 투여로 인해 맥박수가 증가하여 협심증이 발현될 수 있으므로 협심증의 증상(가슴통증 등)에 대한 문진을 주의 깊게 실시한다(뇌경색 재발 억제효과를 검토하는 시험에서, 장기간에 걸쳐 PRP(pressure rate product)를 의미 있게 상승시키는 작용이 인정되었다. 또한, 실로스타졸 투여군에서 협심증이 발현된 증례가 나타났다).

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 출혈(혈우병, 모세혈관 취약증, 두개내출혈, 상부소화관출혈, 요로출혈, 객혈, 초자제출혈 등) 또는 그러한 소인(활동성 소화궤양, 최근 6개월 이내에 출혈성뇌졸중, 3개월 이내에 외과수술, 중식당도망약병증, 조절되지 않는 고혈압)이 있는 환자(출혈을 조정할 우려가 있다)
- 출혈성심부전 환자(증상을 악화시킬 우려가 있다)
- 이 약 및 이 약의 구성성분에 과민반응의 병력이 있는 환자
- 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부*임부 및 수유부에 대한 투여* 항 참조)
- 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose maldabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.(유당함유제제에 한함)

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 항응고제(와파린 등), 항혈소판제(아스피린, 티클로피딘 등), 혈전용해제(우로키나제, 알테플라제 등), 프로스타글란딘 E 제제 및 그 유도체(알프로스타딜, 리마프로스트, 알파데스 등)를 투여중인 환자
- 월경기간 증진 환자(출혈을 조정할 우려가 있다)
- 관동맥 협착의 합병증 환자(이 약의 투여에 의한 맥박수 증가로 협심증을 유발할 가능성이 있다.)
- 중증 신장에 환자(크레아티닌 청소율 ≤25mL/분)이 약의 대사물의 혈중농도가 상승될 수 있다.)*기타*항 참조)
- 중등도 또는 중증 간장애 환자(이 약의 혈중농도가 상승될 수 있다.)*기타*항 참조)
- 당뇨병 또는 내당능 장애가 있는 환자(출혈성 유해증상이 발현하기 쉽다.)
- 자속적으로 혈압이 상승하고 있는 고혈압 환자(약성고혈압 등)
- 심방이나 심실전위 환자, 심방세동이나 조동 환자, 심실빈맥, 심실세동 또는 다조성상심실이소성박동 환자, QT간격의 연장이 있는 환자
- S자형 심실 중격이 있거나 위험이 있는 환자(특히 고령자)

※자형 심실 중격 환자에서 좌심실 유출로 폐색이 보고되었다. 실로스타졸 복용 시작 후 새로운 수축기 잡음 혹은 심장 증상의 발생 여부를 모니터링 한다.

4. 이상반응

1) 중대한 이상반응

- 출혈경향 : 뇌출혈 등의 두개내출혈(초기증상 : 두통, 구역·구토, 의식장애, 반신불수 등), 폐출혈, 때때로 피하출혈, 드물게 소화관출혈, 비출혈, 안저출혈, 혈뇨 등의 출혈경향이 나타날 수 있다. 이러한 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다. 출혈성 소인이 있는 환자 또는 항혈소판제 및 항응고제와 병용치료하는 환자에게 사용하기 전에 의사와 상의한다. 수술 3~4일 전에 이 약의 투여를 중단한다.
- 혈액계 : 병혈구감소증, 무혈구증, 드물게 혈소판감소증, 백혈구감소증, 재생불량성빈혈이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
- 간질성 폐렴 : 발열, 기침, 호흡곤란, 흉부근육 이상, 호산구증가를 동반한 간질성 폐렴이 나타날 수 있다. 이러한 경우에는 투여를 중지하고 부신 피질호르몬제의 투여 등 적절한 처치를 한다.
- 출혈성심부전, 심근경색, 협심증, 심실빈맥 등이 나타날 수 있으므로 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
- 황달 : 때때로 AST, ALT, ALP, LDH 등의 상승이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.

2) 기타의 이상반응

- 과민반응 : 과민반응은, 때때로 발진, 드물게 파진, 두드러기, 가려움증이 나타날 수 있다. 이러한 경우에는 투여를 중지한다.
- 전신 : 요통, 갑열, 오한, 불쾌감, 경부강직, 골반통, 복막뒤출혈이 나타날 수 있다.
- 순환기계 : 심방세동, 심방조동, 상실성 빈맥, 심실위 빈맥, 상실성 기외수축, 심실성 기외수축 등의 부정맥, 혈압저하, 체위성저혈압, 때때로 두근거림, 빈맥, 화끈거림, 드물게 혈압상승이 나타날 수 있다. 이러한 경우에는 긴장 또는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다. 인과관계는 밝혀지지 않았으나 감작시험에서 뇌경색, 대하혈열, 심정지, 심근허혈, 심신, 정맥류, 혈관확장이 보고되었다. 좌심실 유출로 폐색(빈도불명※)
- 장신신경계 : 불안, 신경통, 무력증, 이상한 꿈, 때때로 두통·두중감, 어지러움, 불면, 저린감, 드물게 졸음, 떨림이 나타날 수 있다. 이러한 경우에는 긴장 또는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
- 소화기계 : 대변이상, 소화불량, 담석증, 대장염, 십이지장궤양, 십이지장염, 식도염, γ-GTP의 상승, 위염, 위장경, 잇몸출혈, 흑색변, 소화궤양, 치주농양, 위궤양, 허부증, 때때로 복통, 구역·구토, 식욕부진, 설사, 속쓰림, 복부팽만감, 위장관 불쾌감이 나타날 수 있다.
- 혈액 및 림프계 : 적혈구증가증, 자색반병, 출혈시간증가, 고혈소판증, 호산구증가, 드물게 빈혈이 나타날 수 있다.
- 다사 및 영양계 : 안면부종, 말초부종, 등통, 고지혈증증, 드물게 혈당상승이 나타날 수 있다.
- 근골격계 : 근육통, 관절통, 골통, 유헤남염이 나타날 수 있다.
- 호흡기계 : 가침증가, 인두염, 비염, 천식, 부비동염, 폐렴이 나타날 수 있다.
- 내분비계 : 당뇨병이 나타날 수 있다.
- 피부 및 부속기계 : 건조한 피부, 증가, 피부비대, 알레르기성 피부반응이 나타날 수 있다.
- 감각기계 : 악시, 실명, 복시, 귀통증, 드물게 귀울림, 결막염이 나타날 수 있다.
- 비노생식기계 : 단백뇨증, 방광염, 침출혈, 점염, 드물게 빈뇨가 나타날 수 있다.
- 신장 : 신부전, 신기능이상, 드물게 BUN, 크레아티닌, 요산의 상승이 나타날 수 있다.
- 기타 : 때때로 발한, 부종, 가슴통증, 드물게 등통, 견데감, 발열이 나타날 수 있다.

※ : 자발적 보고 또는 해외에서 발생한 이상반응의 경우 빈도불명으로 표시

3) 실로스타졸에 대한 국내 시판 후 조사 결과

실로스타졸의 국내 시판 후 조사기간 동안 660례를 대상으로 실시한 안전성 평가 결과 유해사례 발현율은 인과관계 여부와 상관없이 34례에서 39건(5.24%)으로 보고되었다. 이 중 약물과의 인과관계를 배제할 수 없는 약물유해반응 발현율은 29례에서 33건(4.47%)으로 다음과 같다.

가. 중증 및 말초신경계 이상 : 두통 2.77%(18례/660례), 불안(흥분) 0.15%(1례/660례)

나. 위장관계 이상 : 설사 0.46%(3례/660례), 구역0.31%(2례/660례), 소화불량증 0.15%(1례/660례), 구토 0.15%(1례/660례), 식욕부진 0.15%(1례/660례), 복통 0.15%(1례/660례)

다. 피부 및 부속기관 이상 : 가려움증 0.15%(1례/660례), 발진 0.15%(1례/660례)

라. 정신신경계 이상 : 경면 0.15%(1례/660례)

마. 심박 이상 : 두근거림 0.15%(1례/660례)

이 중 현재 허가사항에 기재되어 있지 않은 예상하지 못한 새로운 이상반응으로 약물과의 인과관계 여부와 상관없이 골격이상, 객담증가 각 0.15%(1/649명, 1건)이있으며, 증대한 이상반응은 인과관계 여부와 상관없이 구토, 골격이상, 출혈이 각각 0.15%(1/649명, 1건)이었다.

4) 이 약의 시판 후 사용성적조사 결과

실로스타졸 및 은행엽건조엑스 복합제인 이 약에 대해 시판 후에 781례를 대상으로 사용성적조사가 진행되었다. 안전성 평가 결과 유해사례 발현율은 인과관계 여부와 상관없이 439례(56.21%)에서 860건으로 보고되었다. 이 중 약물과의 인과관계를 배제할 수 없는 약물유해반응 발현율은 40

례(5.12%)에서 49건으로 나타났다. 증대한 약물유해반응이 4례(0.51%)에서 6건으로, 안저출혈이 2례(0.26%)에서 2건, 두통, 구역, 구토, 두근거림이 각각 1례(0.13%)에서 1건 씩 나타났다. 예상하지 못한 약물유해반응은 7례(0.90%)에서 8건으로, 저혈레스타졸혈중이 2례(0.26%)에서 2건, 변비, 침변색, 침중가, 습한, 안면홍조, 결막출혈이 각각 1례(0.13%)에서 1건 씩 나타났다.

5. 일반적 주의

- 관동맥 협착의 합병증이 있는 환자에서 이 약 투여 중 과도한 맥박수 증가가 나타났을 경우에는 협심증을 유발할 가능성이 있으므로 이러한 경우에는 긴장 또는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
- 환자에게 출혈과 가벼운 타박상, 발열, 인후염과 같은 혈액질환의 조기발현을 의미하는 어떠한 징후도 신속히 보고하도록 주지시켜야 한다. 감염이 의심되거나 혈액질환의 임상적 징후가 있으면 전혈구수를 측정해야 한다. 혈액학적 이상의 임상 또는 실험실적 징후가 있으면 이 약의 투여는 즉시 중단되어야 한다.
- 이 약은 어지러움을 일으킬 수 있으므로 운전이나 기계조작 전에 주의하도록 주지시켜야 한다.
- 상호작용
- 실로스타졸은 주로 간 대사효소인 CYP3A4 및 일부 CYP2D6, CYP2C19에 의해 대사된다.
- 항응고제(와파린 등), 항혈소판제(아스피린, 티클로피딘 등), 혈전용해제(우로키나제, 알테플라제 등), 프로스타글란딘 E 제제 및 그 유도체(알프로스타딜, 리마프로스트, 알파데스 등)는 출혈을 조정할 우려가 있으므로 혈액응고능 검사 등을 충분히 실시하면서 사용한다.
- CYP3A4저해제나 CYP2C19저해제(시메티딘, 딜티아젤, 에리스로마이신, 케토코나졸, 칸소프라졸, 이트라코나졸, 미코나졸, 오메프라졸, H⁺-N⁺ 단 백분해효소 저해제 등)와의 병용에 의해 실로스타졸의 혈중 농도가 상승하여 작용이 증가할 우려가 있다. 병용하는 경우에는 긴장 또는 저용량부터 시작하는 등 주의해야 한다.
- CYP3A4나 CYP2C19의 기질이 되는 약물(사시프리드, 미다플람)과의 병용에 의해 이 약의 실로스타졸 혈중 농도가 상승하여 작용이 증가할 우려가 있다. 병용하는 경우에는 실로스타졸 용량을 감량 또는 저용량부터 시작하는 등 주의해야 한다.
- 이 약은 실로스타졸로 인하여 반사빈맥으로 추가적인 저혈압효과 있을 가능성이 있기 때문에 혈압을 저하시키는 잠재성이 있는 약물 또는 디히드로피리딘계 칼슘채널차단제와 같이 반사빈맥을 일으키는 혈관확장제와 병용할 때 주의가 필요하다.
- 임부 및 수유부에 대한 투여
- 동물실험(랫)에서 실로스타졸의 이상태자 증가 및 출생 시 저체중, 사망 증가가 보고되었으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에게는 투여하지 않는다.
- 동물실험(랫)에서 실로스타졸이 유즙 중으로 이행됨이 보고되었으므로 투여 중에는 수유를 중단한다.
- 소아에 대한 투여
- 저체중출생아, 신생아, 영·유아, 또는 소아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다(사용경험이 적다).
- 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의한다.

10. 과량투여시의 처리

사람에게 있어 실로스타졸의 급성 과량투여에 대한 정보는 제한적이다. 급성 과량투여의 증상과 징후는 중증 두통, 설사, 저혈압, 빈맥, 또는 심부정맥으로 예상된다. 환자를 주의 깊게 살펴보고 지지 및 보조적인 치료를 행한다. 실로스타졸이 높은 단백질결합을 하기 때문에 혈액투석이나 복막투석으로 효과적인 제거가 어려울 것이다. 적절한 구토나 위식적으로 위를 비워야 한다. 실로스타졸의 경우 LD50은 마우스와 랫트에서 >5.0g/kg, 개에서 >2.0g/kg 이다.

11. 저장상의 주의사항

- 직사광광을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 말전하여 보관한다.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 보관한다.
- 의약품등동성시험 정보*①

[약학적 정보]

시험약 기네스타정(에이프로젠제약(주))과 대조약 리넥신정(에스케이제약(주))을 2×2 교차시험으로 각 1정 씩 건강한 성인에게 공복 시 단회 경구 투여하여 26명의 혈중 실로스타졸을 측정한 결과, 비교평가항목치(AUC, C_{max})를 로그변환하여 통계처리하였을 때, 평균치 차의 90% 신뢰구간이 log0.8에서 log1.25이내로서 생물학적으로 동등함을 입증하였다.

		비교평가항목		참고평가항목	
		AUC _{0-48hr} (ng·h/mL)	C _{max} (ng/mL)	T _{max} (hr)	t _{1/2} (hr)
대조약	리넥신정	8802.78 ± 2939.64	678.36 ± 250.80	3.50 (2.00 – 6.00)	7.42 ± 3.19
시험약	기네스타정	9123.54 ± 2637.25	665.16 ± 201.24	3.50 (1.00 – 6.00)	8.76 ± 4.86
90% 신뢰구간* (기준: log0.8~log1.25)		1.0014~1.0923	0.9148~1.0968	—	—

(AUC, C_{max}, t_{1/2} : 평균값±표준편차, T_{max} : 중앙값(범위), n=26)

AUC : 투약시간부터 최종 혈중농도 정량시간 까지의 혈중농도-시간곡선하면적

C_{max} : 최고혈중농도

T_{max} : 최고혈중농도 도달시간

t_{1/2} : 말단 소실 반감기

* : 비교평가항목치를 로그변환한 평균치 차의 90% 신뢰구간

※이 약은 에이프로젠제약(주)의 기네스타정과 동일한 원료를 사용하여 동일한 제조방법으로 전 공정을 에이프로젠제약(주)에 위탁 제조하였음.

13. 기타

- 실로스타졸은 PDE Ⅲ 저해작용을 가지는 약물이다. 외국에서는 PDE Ⅲ 저해작용을 가지는 감시제에 대해 유헤혈성심부전(VNHA 분류 Ⅲ~Ⅳ)환자를 대상으로 한 위약대조 장기투여비교시험에서, PDE Ⅲ 저해작용을 가지는 감시제에서의 생존율이 위약에 비하여 낮았다는 보고가 있다. 또한, 유헤혈성심부전을 나타내지 않는 환자에 있어, 실로스타졸을 포함한 PDE Ⅲ 저해제를 장기 투여한 경우의 예측은 분명하지 않다.
- 비급을 이용한 실로스타졸의 13주 및 62주 반복경구투여독성시험에서, 고용량의 경우 좌심실심내막의 비후, 관상동맥의 장애가 인정되었으며, 무독성량은 각각 30mg/kg/day, 12mg/kg/day 였으나 이러한 변화는 랫트 및 원숭이에서는 인정되지 않았다. 비급의 경우 1주 간 정맥투여한 심장 독성시험에서 좌심실심내막, 우심방심외막 및 관상동맥의 변화가 나타났으며, 원숭이의 경우 경증 좌심실심내막의 출혈성 변화가 인정되었다. 다른 PDE 저해제와 혈관확장제의 경우에도 증상에 대한 심장독성이 인정되었으며, 특히 개에서 독성발현이 쉽게 나타난다는 보고가 있다.
- 실로스타졸의 경우 유전적으로 현저하게 높은 혈압이 지속되어 뇌졸중이 발병되는 S-R-SR(뇌졸중이 발병하기 쉬운 고혈압 자연발생 랫트, stroke-prone spontaneously hypertensive rats)에서, 이 약 0.3% 혼혈십이군은 대조군과 비교해 생존기간의 단축이 인정되었다(평균 수명 : 이 약 군 40.2주, 대조군 43.6주).
- 실로스타졸의 뇌경색 재발억제 효과를 검토하는 시험에서 위약군에 비해 이 약군에서 당뇨병의 발증에 및 악화에가 많이 나타났다(이 약군 11/520례, 위약대조군1/523례).
- 실로스타졸 100mg과 HMG-CoA 환원효소 저해약 로바스타틴 80mg을 병용투여 시, 로바스타틴 단독투여에 비해 로바스타틴의 AUC가 64% 증가했다는 해의 보고가 있다.
- 부작용상 뇌경색에 대하여 실로스타졸의 뇌경색 발작억제효과에 대한 시험은 실시된 바 없다.
- 음식물과 함께 이 약을 복용하면 실로스타졸의 혈중농도가 상승하여 이상반응 발생율이 증가될 수 있으므로 필요시 적절한 감량한다. 특히, 고지방식에서 실로스타졸의 흡수가 증가하여 C_{max}는 90%, AUC는 25%의 상승을 보였으므로 고지방식을 섭취하는 환자의 경우에는 특히 주의한다.
- 신기능 장애 환자의 체내동태 : 중증 신장애 환자에게 1일 실로스타졸 100mg을 8일간 연속해서 경구투여 시, 건강한 성인에 비해 실로스타졸의 C_{max}는 29%, AUC는 39% 감소하였으나, 활성대사체의 C_{max}는 173%, AUC는 209% 증가하였다. 경증 및 중등도 환자에서는 유의적인 차이가 없었다.
- 간기능 장애 환자의 체내동태 : 실로스타졸을 경증 간장애 환자에게 100mg을 단회 경구투여 시, 혈중농도가 건강한 성인과의 차이를 보이지 않았다(C_{max}는 7% 감소, AUC는 8% 증가).
- 케토코나졸, 에리스로마이신, 오메프라졸 : 실로스타졸과 CYP3A4 저해제인 케토코나졸 400mg과 병용투여 시 C_{max}는 94%, AUC는 117% 증가하였고, 에리스로마이신 500mg과 병용투여 시 C_{max}는 47%, AUC는 73% 증가되었다. CYP2C19 저해제인 오메프라졸과 병용투여 시 대사체인 3,4-dehydro-clostrazole이 69% 증가하였다.

저장방법
기밀용기, 실온(1~30℃)보관
사용기간
제조일로부터 24개월
포장단위
30정/병, 300정/병
취급상의 주의사항

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 꾀한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 경과 하였거나 유통과정 중 변질·변태 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입하신 업체를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 본 의약품을 복용(사용)하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서는 의약품과 함께 보관하여 주십시오.

※ 최종승인일자(2019년 05월 09일) 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품등통합보시시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)의 "의약품 검색" 또는 문의(☎02-574-2541)에서 확인할 수 있습니다.

※ 부작용보고 : 한국약품안전관리원(☎1644-6223)

제조사의지자 :  정우신약(주) / 충청남도 아산시 신항면 서부남로780번길 80

제조사 :  / 경기도 화성시 양감면 두머리길 16

판매자 : (주)에이프로젠+H&G / 경기도 화성시 양감면 두머리길 18