

아크로날CR정

아세클로페낙

의약품분류	전문약약품
분류번호	114
해열, 진통, 소염제	

※ 사용기한이 지난 의약품을 사용하지 않도록 합니다.

※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.

※ 의약품을 사용하는 동안에는 첨부문서를 함께 보관하시기 바랍니다.

성분 · 함량
1정 중 · 유효성분 : 아세클로페낙(EP) 200mg · 첨가제(동용물여성분) : 유당수화물 <기원동용물 : 소, 사용부위 : 유유> · 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이퀀엑<(OY-C-7000A), 카르복시 메틸셀룰로오스나트륨, 크로스포빈, 포비돈, 히드록시프로필셀룰로오스, 히프록셀로오스
성상
흰색의 장방형 사방형 필름코팅정
효능 · 효과
류마티스관절염, 갑상선초유, 골관절염(퇴행관절염) 및 건관절염등의 관절주위염, 요통, 좌골통, 비만 질성 류머티즘으로 인한 통증
용법 · 용량
○ 성인 : 아세클로페낙으로서 1회 200mg을 1일 1회 복용한다. - 이 약은 씹거나 부수지 않고 그대로 복용한다. - 이 약의 심혈관계 이상반응을 최소화하기 위해 최저 유효 용량으로 최단 기간 동안 투여해야 한다.
사용상의 주의사항
1. 경고 1) 매월 제 장 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경 우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 위장출혈이 유 발될 수 있다. 2) 심혈관계 위험 및 뇌혈관계 위험 : 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제는 중대한 심혈관 계 질환(심부전, 심근경색증 및 뇌졸중)의 위험을 증가시킬 수 있으며, 이는 치명적일 수 있다. 올 협성 심부전(New York Heart Association(NYHA) I) 및 심혈관 질환과 관련하여 중요한 리 슴인자(예 : 고혈압, 고지혈증, 당뇨병, 흡연)를 지닌 환자는 신중하게 검토한 후에 이 약의 치료 를 시작해야 한다. 이 약의 투여로 인한 심혈관 질환의 위험성은 투여량과 투여기간에 따라 중 가될 수 있으므로, 가능한 최단기간동안 일일 최저 유효 용량으로 투여해야 한다. 환자의 증상 완화에 대한 요구와 치료에 대한 반응은 추가적으로 재평가해야 한다. 의사와 환자는 이러한 심혈관계 증상의 발현에 대하여 신중히 모니터링 하여야 하며, 이는 심 혈관계 질환의 병력이 없는 경우에도 마찬가지로 적용된다. 환자는 중대한 심혈관계 독성의 징 후 및/또는 증상 및 이러한 증상이 발현되는 경우 취할 처치에 대하여 사전에 알고 있어야 한다. 뇌혈관 출혈 병력을 가진 환자들에게는 특별히 주의하고 철저한 의료 감독 하에 이 약을 투 여해야 한다. 3) 위장관계 위험 : 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제는 위 또는 장문의 출혈, 궤양 및 천 공을 포함한 중대한 위장관계 이상반응의 위험을 증가시킬 수 있으며, 이는 치명적일 수 있다. 이러한 이상반응은 투여 기간 동안에 경도 증상 없이 발생할 수 있다. 고령자는 중대한 위장관 계 이상반응의 위험이 더 클 수 있다. 투여 기간이 길어질수록 중대한 위장관계 이상반응의 발생 가능성이 증가될 수 있으나 단기 투 여 시 이러한 위험이 완전히 배제되는 것은 아니다. 이 약을 투여하는 동안 위장관계 궤양 또는 출혈의 증상 및 징후에 대하여 신중히 모니터링 하 여야 하며, 증상의 위장관계 이상반응이 의심되는 경우 즉시 투약정지 및 평가 및 치료를 실시하여 야 한다. 비스테로이드성 소염진통제를 중증의 위장관계 이상반응이 완전히 배제될 때까지 투 여 중단하는 것도 치료법이 될 수 있다. 고위험군의 환자에게는 비스테로이드성 소염진통제와 관련 있는 다른 대체 치료제를 고려하여야 한다.

- 다음 환자(경우)에는 투여하지 말 것
 - 활동성 소화성 궤양/출혈 또는 그 병력이 있는 환자
 - 이 약 및 이 약의 구성성분 또는 같은 계열의 일부 약물(디클로페낙)에 과민반응이 있는 환자
 - 아스피린이나 다른 비스테로이드성 소염진통제(COX-2 억제제포함)에 대하여 천식, 두드러기 또 는 알레르기 반응 병력이 있는 환자(이러한 환자에서 비스테로이드성 소염진통제 투여 후 치명적 인 증상의 아나필락시스오양 반응이 드물게 보고되었다.)
 - 아스피린 또는 다른 프로스타글린단 합성효소 저해작용을 갖는 약물에 의해 천식 위험의 증가, 두 드러기 또는 급성 비염을 일으킬 수 있는 천식 환자
 - 광상동맥 우회로술(CABG) 전후에 발생하는 통증의 치료
 - 중증 심부전 환자 및 울혈성 심부전 환자(NYHA I~IV), 허혈성 심장 질환, 말초동맥 질환 및/또 는 뇌혈관 질환이 있는 환자
 - 중증 신장애 환자
 - 중증 간장애 환자
 - 과거 비스테로이드성 소염진통제 치료로 위장관 출혈 또는 천공의 병력이 있는 환자
 - 임신 말기의 일부
 - 수유부
 - 크론병 또는 궤양성 대장염과 같은 염증성 장질환 환자
 - 출혈이 있거나 혈액응고 장애가 있는 환자
 - 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유 당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

- 신장애 또는 그 병력이 있는 환자
 - 폐여지루 또는 심부전 환자
 - 이뇨제 또는 ACE억제제를 투여 중인 환자
 - 외과적 처치 후에 회복기에 있는 환자
- 고령자
- 기관지 천식 또는 그 병력이 있는 환자(비스테로이드성 소염진통제 투여로 기관지경이 보고 되었다.)
- 포르피린 대사의 선천적 장애 환자
- 고혈압 환자
- 간장애 또는 그 병력이 있는 환자
- 과거 비스테로이드성 소염진통제의 장기투여로 인한 소화관 궤양이 있는 환자로서, 이 약의 장 기투여가 필요하여 이스트로스를 동으로 소화성 궤양 치료를 병행하고 있는 환자(이스트로스 틀에 의한 치료에 저항성을 나타내는 소화성 궤양도 있으므로 이 약을 투여하는 중 충분한 경 과를 관찰한다.)
- 임신 초기, 중기의 일부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 임신을 계획하는 여성
- 항응고제를 투여 받고 있는 환자

- 이상반응
가장 흔하게 위장관계 이상반응, 어지러움, 간 효소 수치 이상이 보고되었다. 드물게 가려움, 발진 또는 포함한 피부 이상반응
1) 혈액 및 림프계 : 드물게 빈혈, 매우 드물게 백혈구 감소증, 혈소판 감소증, 호중구 감소, 융혈성 빈혈, 재생불량성 빈혈, 무과립구증
2) 과민반응 : 드물게 쇼크, 아나필락시스 반응
3) 대사 : 매우 드물게 고혈당혈증
4) 정신신경계 : 자주 어지러움, 매우 드물게 우울, 이상한 꿈, 불면
5) 감각기계 : 드물게 시각장애, 시신경염, 매우 드물게 감각이상, 건전성, 증동, 무통, 마각장애, 욕 경 제, 발열 또는 방향감각장애, 착란, 환각, 이명, 건네
6) 순환기계 : 매우 드물게 심계항진, 얼굴홍조가 나타날 수 있다. 비스테로이드성 소염진통제와 관 련하여 고혈압, 심부전 등이 보고되었다. 아세클로페낙은 디클로페낙과 구조적으로 유사하고, 디클로페낙으로 대체되기 때문에 많은 임상

- 및 역학 자료에서 동맥 혈전 질환(심근경색증 또는 뇌졸중, 특히 고혈압으로 장기간 치료 시) 위 험이 증가하는 것으로 나타났다. 또한 역학 자료에서는 아세클로페낙 투여와 관련하여 급성관상 동맥증후군 및 심근경색증의 위험이 증가하는 것으로 나타났다.
- 호흡기계 : 드물게 호흡곤란, 매우 드물게 기관지 경련, 협착을
- 소화기계 : 가장 흔히 위장관계 이상반응이 관찰된다. 소화성궤양, 천공 또는 위장 출혈이 나타 나며 때로는 심각한 경우도 있으며, 고령자에서 더 심각하다. 자주 소화불량, 복통, 구역, 설사, 때때로 복부팽만감, 위염, 변비, 구토, 입궤양, 드물게 흑색변, 매우 드물게 구내염, 도혈, 궤양, 대장염의 악화, 크론병
- 간장 : 매우 드물게 간염, 황달, AST, ALT, ALP의 상승
- 피부 : 때때로 가려움, 발진, 발적, 피부염, 두드러기, 드물게 알물 부종, 매우 드물게 자색반, 수 포성피부염, 피부정맥안종후군(스타빈스-존슨 증후군) 및 독성표피괴사증(리델증후군)을 포 함하는 피부성 반응이 나타난다. 광민감반응, 탈모
 - 피부 : 혈전 부종
 - 기타 : 말초 부종, 눈 주위 부종
- 일반적 주의
 - 이 약을 투여하기 전에 이 약 및 다른 대체 치료법의 잠재적인 위험성과 유익성을 고려해야 한다. 이 약은 각 환자의 치료 목적과 일치하도록 가능한 최단 기간 동안 최소 유효 용량으로 투여한다.
 - 위장관계 이상반응 : 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제를 권장성 질환 또는 위장관 출 혈의 병력이 있는 환자에게 처방 시 극심한 주의를 기울여야 한다. 소화성 궤양 질환 및/또는 위 장관 출혈의 병력이 있는 환자의 경우 이러한 위험성이 없는 환자에 비해 비스테로이드성 소 염진통제 투여 시 위장관 출혈의 발생 위험이 10배 이상 증가하였다. 위장관계 출혈을 증가시키 는 다른 위험인자로는 경구용 코르티코스테로이드 또는 항응고제 병용, 비스테로이드성 소염진 통제의 장기 사용, 알코올 섭취, 고령, 하악한 건강상태 등이 있다. 치명적인 위장관계 이상반응 에 대한 자발적 보고의 대부분은 고령자 및 하악자에 대한 것이므로, 이러한 환자에게 이 약을 투 여 시 특별히 주의하여야 한다.
 - 고혈압 : 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제는 고혈압을 일으키거나, 기존의 고혈압을 악화시킬 수 있으며, 이로 인해 심혈관계 유해사례의 발생률이 증가될 수 있다. 타이디드제 이 뇨제 또는 루프계 이뇨제를 복용 중인 환자가 비스테로이드성 소염진통제 복용 시 이들 요법에 대한 반응이 감소될 수 있다. 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제는 고혈압 환자에서 신 중히 투여해야 한다. 이 약의 투여 초기와 투여 기간 동안에 혈압을 관찰하 모니터링해야 한다.
 - 출혈성심부전 및 부종 : 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제를 복용하는 일부 환자에서 체액 저류 및 부종이 관찰되었다. 이 약은 체액저류 또는 심부전이 있는 환자에서 신중히 투여 해야 한다.
 - 비스테로이드성 소염진통제를 장기간 복용 시 신장유독과사나 기타 신장 손상이 일어날 수 있다. 또한, 신혈류를 유지하는데 프로스타글린단과 역할이 중요하므로, 심부전 환자, 심부전 환자, 간 부전 환자, 이뇨제나 ACE억제제를 투여 중인 환자, 고령자 등에서는 특별한 주의가 필요하다. 투 약을 중단하면 대부분 치료 전 상태로 회복된다.
 - 진행된 신질환 : 진행된 신질환 환자에서 이 약 사용에 대한 통제된 임상 시험은 실시된 바 없다. 따라서, 진행된 신질환 환자에 대해서는 이 약의 투여가 권장되지 않는다. 이 약의 투여를 개시해 야 한다면, 환자의 신장 기능에 대해서 면밀히 관찰해야 한다.
 - 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제의 투여로 간기능 수치와 상승이 나타날 수 있다. 이러 한 비정상적인 검사수치는 치료가 지속됨에 따라 악화되거나 변화가 없거나 또는 일시적일 수 있 다. 또한 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제 투여로, 황달, 치명적 전적성 간염, 간괴사, 간부전(일부는 치명적임)을 포함한 증종의 간 관련 이상반응이 드물게 보고되었다. 간기능 이상을 암시하는 증상 및/또는 징후가 있는 환자 또는 간기능 검사 결과 비정상인 환자 에 있어서는 투여기간 동안 주기 감계 간기능의 악화 여부를 관찰하고, 간질환과 관련된 임상 증 상이나 전신적인 징후(예 : 호산구증가증, 발진)가 발현되는 경우에는 이 약의 투여를 중지한다.
 - 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제의 투여로 빈혈이 나타날 수 있으므로 이 약의 장 기 투여에 의해 빈혈의 증상 또는 징후가 나타나는 경우에는 헤모글로빈치 또는 헤마토크리트 지 검사해야 한다.

- 비스테로이드성 소염진통제는 혈소판 응집을 억제하며, 일부 환자에서는 출혈 시간을 연장시키는 것이 확인되었다. 아스피린과 달리 이 약의 혈소판 기능에 대한 영향은 상대적으로 적고 지속기 간이 짧으며 가역적이다. 응고 관련 질환이 있거나 항응고제를 투여하고 있는 경우와 같이 혈소판 기능 변경에 의해 부정적인 영향을 받을 수 있는 환자는 이 약을 투여하지 않는다.
- 만성질환에 사용하는 경우에는 다음 사항을 고려한다.
 - 비스테로이드성 소염진통제를 장기간 투여하는 환자는 정기적으로 전혈구 검사(CBC) 및 이 화학적 검사를 실시해야 한다. 간질환 또는 신질환과 관련된 임상 증상이나 전신적인 징후 (예 : 호산구증가증, 발진)가 발현되거나 비정상적인 간기능 검사 또는 신기능 검사 결과가 지 속되거나 악화되면, 이 약의 투여를 중단해야 한다.
 - 약용요법 이외의 치료법도 고려한다.
- 급성질환에 사용하는 경우에는 다음 사항을 고려한다.
 - 급성염증, 통증 및 발열의 치료를 고려하여 투여한다.
 - 원칙적으로 통행한 약물과 장기투여는 피한다.
 - 원인요법이 있으면 그것을 실시한다.
- 아나필락시스오양 반응 : 다른 비스테로이드성 소염진통제와 마찬가지로 아나필락시스오양 반 응은 약물에 노출된 경향이 있는 환자에서도 일어날 수 있다. 이러한 복합 증상은 아스피린이나 다른 비스테로이드성 소염진통제 투여 후 비측 출혈을 동반하거나 동반하지 않거나 또는 정제 적으로 치명적인 증상의 기관지 경련을 나타내는 전신 환자에게 점진적으로 발생한다. 이러한 아나필락시스오양 반응이 나타나는 경우 응급처치를 실시하여야 한다.
- 피부반응 : 이 약은 발혈피부염, 피부정맥안종후군(스타빈스-존슨 증후군) 및 독성표피괴사 증(리델증후군) 같은 중대한 피부 이상반응을 일으킬 수 있으며, 이는 치명적일 수 있다. 이 를 중대한 이상반응은 경도 증상 없이 발생할 수 있다. 대부분의 경우 이러한 이상반응은 투여 초기 1개월 이내에 발생한다. 환자는 중대한 피부 발현 증상 및 증후에 대해 알고 있어야 하며 피부 발진 또는 다른 과민반응의 최초 증상 및 징후가 나타날 때 약을 투여를 중단해야 한다.
- 천식 환자 중 일부는 아스피린에 민감하게 반응할 수 있다. 아스피린 민감성 천식 환자에게 아 스피린을 사용하는 경우 지양해야 할 수 있는 증종의 기관지 경련과 관련될 수 있다. 이러한 아스피 린 민감성 환자에서 아스피린과 다른 비스테로이드성 소염진통제 간의 기관지 경련을 포함한 는 교차반응이 보고되었다. 그러므로 이 약은 이러한 아스피린 민감성 환자에게는 투여하지 않 도록 하며, 천식 환자에게는 주의 깊게 사용해야 한다.
- 이 약은 코르티코이드 체제를 대체하거나 코르티코이드 결핍증을 치료하기 위한 약물로 사용 할 수 없다. 코르티코스테로이드의 갑작스러운 투여 중단은 코르티코스테로이드 반응성 질환의 악 화를 초래할 수 있다. 장기간 코르티코스테로이드를 복용해 온 환자에게 이 약을 투여하고자 할 경우에는 서서히 용량을 감소시켜야 한다.
- 이 약의 여러학적 특성 상 염증의 다른 증상과 징후를 발현시키하여 통증 및 비강염성 조건하 에서 감염성 합병증의 진단을 지연시킬 수 있다.
- 어지러움 혹은 기타 중추신경계의 장애(졸음, 피로, 시각이상)를 느끼는 환자는 운전을 하거나 위험한 기계를 다루는 일을 해서는 안 되며, 특별한 주의가 필요한 환경을 피한다.
- 여성의 임신능력을 저하시킬 수 있으므로 임신을 계획 중인 여성은 복용하지 않는 것이 좋다. 비 스테로이드성 소염진통제를 장기간 복용하는 여성에서 일시적인 불임이 보고되었다. 임신이 어 렵거나 불임치료를 하고 있는 여성은 이 약의 투여를 중지하는 것이 바람직하다.
- 소염진통제에 의한 치료는 원인요법이 아닌 대증요법임에 유의한다.

- 상호작용
1) 환자가 다른 약물 특히 디곡신, 항응고제, 경구용 당뇨병용제 또는 이뇨제를 복용하고 있는 경우 에는 의사와 상의하도록 한다.
2) ACE억제제 또는 안지오텐신 II 수용체 길항제 : 비스테로이드성 소염진통제에 의해 ACE억제제 또는 안지오텐신 II 수용체 길항제의 항고혈압효과가 감소될 수 있다는 보고가 있으므로 이 약 과 ACE억제제 또는 안지오텐신 II 수용체 길항제를 병용 투여하는 경우 이러한 상호작용을 염 두에 투여야 한다.
3) 아스피린 : 아스피린과의 병용이 비스테로이드성 소염진통제의 사용과 관련된 중대한 심혈관계 혈전증등의 위험을 증가시킬 수 있다는 일관된 증거는 없다. 다른 비스테로이드성 소염진통제와 마찬가지로 이 약과 아스피린의 병용에 의해 증종의 위장관계 이상반응의 발생 위험이 증가될 수 있으므로 두 약물의 병용은 일반적으로 권장되지 않는다.
- 이뇨제
 - 임상시험 및 시판 후 조사 결과 이 약의 신장애와 프로스타글린단 합성 억제에 의해 일부 환자에서 부로세미드 및 타이디드제 이뇨제의 나트륨노폐물 효과가 감소할 수 있음이 확인 되었다. 이들 약물과 비스테로이드성 소염진통제를 병용 투여하는 동안 심부전 징후를 면 밀히 관찰해야 한다.
 - 칼륨보존이뇨제와 병용 시, 혈청 중 칼륨 농도가 증가할 수 있으므로 혈중 칼륨 농도를 관찰 해야 한다. 벤드로플루자이드와 병용 시 혈압조절에 영향을 미치는지 알려지지 바 있으나, 다른 이뇨제와의 상호작용은 배제할 수 없다.

- 리튬 : 비스테로이드성 소염진통제는 신장에서의 프로스타글린단 합성 억제에 의해 혈청 리튬의 농도를 증가시키고 리튬의 신장소실을 감소시킬 수 있다. 따라서 비스테로이드성 소염진통제와 리튬의 병용 투여 시 리튬의 독성 징후를 주의 깊게 관찰해야 한다.
- 메트트렉세이트 : 비스테로이드성 소염진통제와의 병용투여로 신세노관에서 메트트렉세이트의 배설이 지연되어 치명적인 메트트렉세이트의 혈액학적 독성이 증가될 수 있으므로 항암요법으로 사용하는 고용량(15 mg/주 이상)의 메트트렉세이트와는 병용 투여하지 않으며, 저용량의 메트 트렉세이트와 병용 투여 시 신중히 투여되어야 한다.
- 쿠마린계 항응고제(와르파린 등) : 위장관계 출혈에 대하여 와르파린과 비스테로이드성 소염진통 제는 상승작용을 나타낼 수 있으므로 두 약물을 함께 사용하는 환자는 단독으로 투여하는 경우에 비해 증종의 위장관계 출혈의 위험이 높아질 수 있다.
- 다른 비스테로이드성 소염진통제(선택적 COX-2억제제 포함)와 병용할 경우 이상반응의 위험이 증가할 수 있으므로 병용하지 않는다.
- 이 약은 CYP2C9에 의해 대사되므로 페토니온, 시메타민, 미코나졸, 설파페나졸, 아미오다론, 톨 부타미드, 페닐부타존과 약동학적 상호작용 가능성이 있다.
- 감염배양제 : 비스테로이드성 소염진통제는 사구체 여과율을 감소시키고 배당체의 혈중 농도를 증가시켜 심부전을 악화시킬 수 있다.
- 마페프리스트론 : 비스테로이드성 소염진통제는 마페프리스트론의 효과를 감소시키기 때문에 마페 프리스트론 복용 후 8~12일 동안 투여해서는 안 된다.
- 퀴놀론계 항생제 : 비스테로이드성 소염진통제와 병용 투여 시 경련이 발생할 위험이 증가할 수 있다는 동물실험 데이터가 있으므로 주의한다.
- 혈청소산치 및 선택적 세로토닌 재흡수 억제제(SSRI) : 이 약과 병용 시 위장관 출혈의 위험 이 증가할 수 있다.
- 시클로스포틴 및 테크로리우스 : 비스테로이드성 소염진통제와 병용 투여로 신독성의 위험 이 증가할 수 있다.
- 지도부딘 : 비스테로이드성 소염진통지와 병용 투여 시 혈액학적 독성이 증가할 수 있다. HW(+) 혈우병 환자에게 지도부딘과 이부프로펜을 병용 투여했을 경우 혈관질환과 혈종의 발생 위험 이 증가했다는 증거가 있다.
- 당뇨병용제 : 디클로페낙은 경구 혈당강하제와 병용 시 경구 혈당강하제와의 임상적 효과에 영 향을 주지 않는다는 임상결과가 있었으나, 이 약의 치료 중에 저혈당과 고혈당 효과가 드물게 보 고되었으며, 저혈당약의 용량을 조절해야 한다.
- 코르티코스테로이드 : 이 약과 병용 시 위장관 궤양 또는 출혈의 위험이 증가할 수 있다.

7. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 이 약을 임부에 투여한 임상자료는 없다. 다른 비스테로이드성 소염진통제와 마찬가지로 임신 말기에 이 약을 투여 시 태아의 동맥관을 조기 폐쇄시킬 수 있으므로 임신을 계획하는 여성이나 임신 초기 및 중기의 임부에 용량 및 사용기간을 최소한으로 신중히 투여하고, 임신말기(마지 막 3분기)의 임부에게는 투여하지 않는다.
- 현재까지 알려진 자료로는 임부에 대한 안전성은 충분히 확립되어 있지 않다. 켄트에 대한 실험에 서 비스테로이드성 소염진통제는 프로스타글린단 합성을 저해하는 다른 약물과 마찬가지로 난산 의 발생 빈도를 증가시키고, 분만을 지연시키며 태아의 생존율을 감소시켰다.
- 현재까지 알려진 자료로는 수유부에 대한 안전성은 충분히 확립되어 있지 않으며, 이 약이 사람 의 모유로 분비되는지는 알려지지 있지 않다. 그러나 많은 약물들이 모유 중으로 이행될 뿐만 아니 라 이행될 경우 영아에서 심각한 이상반응의 발생이 우려되므로, 수유부에 대한 약을 투여의 중 요성을 고려하여 수유를 중단하거나 약물 투여를 중단해야 한다.

- 소아에 대한 투여
소아에 대해서는 정해진 복용량이나 적응증이 설정되어 있지 않다(소아 및 청소년에서 이 약의 안 전성과 유효성은 확립되지 않았다).

- 고령자에 대한 투여
고령자에서 비스테로이드성 소염진통제에 대한 이상반응 특히, 위장관 출혈과 천공 발생 빈도 가 증가한다. 그러므로 다른 비스테로이드성 소염진통제와 마찬가지로 고령자에게 이 약을 투여 시 주의한다.

- 과량 투여 시의 처치
과량복용으로 인한 전형적인 증상은 알려져 있지었으나, 실제로 과량 복용 시에는 관찰되는 증상에 따라 처치하도록 해야 하며, 위장관 자극, 저혈압, 호흡 저하, 경련 등에 대비하도록 한다.

- 보관 및 취급상의 주의사항
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고 원인이 되거나 품질 유지 면에서 바람직하지 않으므로 이 를 주의한다.

12. 의약품등등성시험 정보^{*)}

1) 공복시험

시험약 클란자CR정(한국콜마)과 대조약 클란자CR정(한국유나이티드제약)을 2×2 교차시험으로 각 1명의 건강한 성인에게 공복 및 식후 시 단회 경구 투여하여 혈중 아세클로페낙을 측정할 결과, 28명의 비교평가항목치(AUC, C_{max})를 로그 변환하여 통계 처리하였을 때, 평균치와 90% 신뢰구간이 log0.8에서 log1.25 이내로서 생물학적으로 동등함을 입증하였다.

(공복)

구분		비교평가항목		참고평가항목	
		AUC _{0-24hr} (μg·hr/mL)	C _{max} (μg/mL)	T _{max} (hr)	t _{1/2} (hr)
대조약	클란자CR정 (한국유나이티드제약)	22.476± 7.116	6.349± 1.763	2.16 (0.75-5.00)	4.93±2.12
시험약	클란자CR정 (한국콜마)	22.304± 7.508	6.154± 1.961	2.07 (0.75-4.00)	5.48±2.66
90% 신뢰구간*		log 0.9356 ~ 1.0411	log 0.8632 ~ 1.0657	-	-

(기준 : log0.8 ~ log1.25)

(AUC, C_{max}, t_{1/2} : 평균값±표준편차, T_{max} : 중앙값(범위), n=28)

- AUC : 투약시간부터 최종혈중농도 정량시간 t까지의 혈중농도-시간곡선하면적

- C_{max} : 최고혈중농도

- T_{max} : 최고혈중농도 도달시간

- t_{1/2} : 말단 소실 반감기

* 비교평가항목치를 로그변환한 평균치 차의 90% 신뢰구간

(식후)

구분		비교평가항목		참고평가항목	
		AUC _{0-24hr} ($\mu\text{g}\cdot\text{hr}/\text{mL}$)	C _{max} ($\mu\text{g}/\text{mL}$)	T _{max} (hr)	t _{1/2} (hr)
대조약	클란자CR정 (한국유나이티드제약㈜)	40.274 ± 17.995	9.252 ± 4.219	3.25 (1.00-6.00)	3.39 ± 1.75
	클란자CR정 (한국콜마(주))	43.181 ± 17.361	10.04 ± 3.268	2.09 (1.00-5.00)	3.34 ± 0.79
90% 신뢰구간* (기준 : log0.8 ~ log1.25)		log1.0458 ~1.1191	log1.0257 ~1.2234	-	-

(AUC, C_{max}, t_{1/2} : 평균값±표준편차, T_{max} : 중앙값(범위), n=28)

- AUC₀₋₂₄ : 투약시간부터 최종혈중농도 정량시간 t까지의 혈중농도-시간곡선하면적
 - C_{max} : 최고혈중농도
 - T_{max} : 최고혈중농도 도달시간
 - t_{1/2} : 말단 소실 반감기
 * 비교평가항목치를 로그변환한 평균치 차의 90% 신뢰구간

*) 이 약은 한국콜마(주) 클란자CR정과 동일한 원료를 사용하여 동일한 제조방법으로 타정 의 전 공정(일부공정외탁제조)을 한국콜마(주)에, 타정 공정(일부공정외탁제조)을 클란자마(주)에 위탁 제조하였음.

저장방법 및 사용기간
기밀용기, 실온보관(1~30℃) / 제조일로부터 24개월
포장단위
30정/병, 100정/병
[제조외국지]
(주)새한제약, 경기도 안성시 공단2로 50-4
[제조자]
한국콜마(주), 세종특별자치시 전의면 신단길 245 클마파마(주), 충청북도 제천시 바이오파비2로 93
※ 이 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만일 구입 시 사용기한이 경과되었거나, 변질·변패·오염 되었거나 손상된 의약품은 약국 개설자 및 약약을 판매업자에 한하여 교환하여 드립니다. ※ 식약처 고시「의약품 표시 등에 관한 규정」제9조제7항에 따라, 약품의 부작용 피해구제 신청을 한국약의약품안전관리원(www.drugsafe.or.kr)에 하실 수 있습니다.