

※ 의약품 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 의약품과 함께 보관하십시오.

일반의약품
분류번호 : 319

프로콘틴 600정 Procontin 600 Tab.

고함량 콘드로이틴 600 mg + 활성비타민B 복합제

【원료약품 및 그 분량】 1정(1,164밀리그램) 중

- 유효성분 : 콘드로이틴설페이트나트륨(KP) 600mg
푸르실티아민(KP) 60mg
리보플라빈부티레이트(KP) 6mg
니코틴아미드(KP) 60mg
피리독신염산염(KP) 25mg
판토틸산칼슘(KP)(칼슘(으)로서 1.2mg) 15mg
시아노코발라민1000배산(KP)(시아노코발라민(으)로서 20μg) 20mg
이노시톨(KP) 20mg
콜린타르타르산염(USP) 20mg
γ-오리자놀(KP) 5mg
- 동물유래성분 : 유당수화물(기원동물 : 소, 사용부위 : 우유)
- 기타첨가제 : 히드록시프로필셀룰로오스, 전분글리콜산나트륨, 미결정셀룰로오스, 콜로이드성산화규소, 스테아르산마그네슘, 탈칼드렌색(19W623), 랩셀드갈색(69B346)

【성상】

갈색의 장방형 필름코팅정

【효능·효과】

1. 다음경우의 비타민 B1, B2, B6 의 보급
 - 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절염(요통, 어깨결림 등)
 - 각기, 노인피로

【용법·용량】

만 12세 이상 및 성인 : 1일 1회, 1회 1정 식후 복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 고칼슘혈증(hypercalcaemia) : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장(콩팥)질환 환자
 - 2) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
 - 3) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - 4) 만 12개월 미만의 영아
 - 5) 신장(콩팥)결석 환자
 - 6) 심한 증상의 신부전 환자
 - 7) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 데트라이클로겐 제제, 제산제

- 2) 레보도파
3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - 3) 심장·순환기계기능 장애 환자
 - 4) 신장(콩팥)장애 환자
 - 5) 저단백혈증 환자
 - 6) 감심배당제를 투여 중인 환자
4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
 - 구역, 구토, 묽은 변, 설사, 구내염(입안염), 식욕부진, 복부(배부분)팽만감, 변비, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 피부발진, 어지러움, 얼굴·다리 종창(부기)
 - 2) 피리독신을 1일 500mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
 - 3) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
 - 4) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperurisemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
 - 5) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장장애, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
 - 6) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다.
 - 7) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 복용(사용))투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
 - 8) 우발적으로 과량복용 한 경우
 - 9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜야 함
 - 2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.
 - 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.
6. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것.
 - 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】

45 정/병, 90 정/병

【사용기한】

제조일로부터 36개월

【제조업체】 정우신약(주) / 충청남도 아산시 신창면 서부남로790번길 60

【제조지】 (주)시아스제약 / 경기도 화성시 향남읍 발안공단로 32

【판매지】 (주)대웅생명과학

※ 본 의약품은 KGMP적격업체에서 제조하여 엄격한 품질관리를 통한 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변색 또는 오손된 제품이 발견될 경우 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 보상받을 수 있습니다.

※ 본 의약품을 복용(사용)하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서는 의약품과 함께 보관하여 주십시오.

※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.

※ 최종승정일자(2022년 04월 18일) 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)의 '의약품 검색' 또는 문익(☎ 02-574-2541)에서 확인할 수 있습니다.

※ 부작용 피해구제신청 : 한국약품안전관리원(☎ 1644-6223)