

레바원 정

레바미피드

전문의약품

크피마레  **공미레**
유한약품 YOUNG

[성분·함량] 이 약 1정 중
 • 유효성분 : 레바미피드(KP) 100 mg
 • 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이징색(03B28796), 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 히드록시프로필셀룰로오스

[성상] 흰색의 원형 필름코팅정

[효능·효과]

1. 위궤양
2. 다음 질환의 위점막병변(미란, 출혈, 발적, 부종)의 개선 : 급성위염, 만성 위염의 급성악화기

[용법·용량]

성인 : 레바미피드로서 1회 100 mg을 1일 3회 경구투여한다. 다만, 위궤양의 경우에는 아침, 저녁 및 취침전에 투여한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것
 이 약 성분에 과민반응 병력 환자
2. 이상반응
 여기서 '드물게'는 0.1 %미만을, '때때로'는 0.1 ~ 5 %미만을, 아무런 표 현이 없는 것은 5 %이상 또는 빈도불명을 의미함
 1) 중대한 이상반응
 (1) 쇼크, 아나필락시소모양 증상(빈도불명) : 쇼크, 아나필락시소모양 증상이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
 (2) 백혈구 감소(드물게), 혈소판 감소(빈도불명) : 백혈구 감소, 혈소판 감소가 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
 (3) 간기능장애(드물게), 황달(빈도불명) : AST, ALT, γ -GTP, ALP 상승 등을 수반하는 간기능장애, 황달이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
 2) 기타 이상반응
 (1) 과민반응 : 두드러기, 드물게 발진, 가려움, 약진양 습진 등의 과민반응이 나타날 수 있으므로 이와 같은 경우에는 투여를 중지한다.
 (2) 정신신경계 : 마비, 어지럼, 졸음이 나타날 수 있다.
 (3) 소화기계 : 구갈, 드물게 변비, 복부팽만감, 설사, 구역, 구토, 속쓰림, 복통, 트림, 미각이상 등이 나타날 수 있다.
 (4) 간 : 드물게 AST, ALT, γ -GTP, ALP 상승 등 아마노전달효소가 현저히 상승한 경우나 발열, 발진 등이 동시에 나타날 경우는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
 (5) 혈액계 : 혈소판 감소, 때때로 백혈구 분획증, 분열핵구의 감소, 림프구의 감소, 드물게 백혈구 감소, 괴립구 감소가 나타날 수 있다.
 (6) 기타 : 우선증창, 유방통, 여성형 유방, 유즙분비, 유발, 심계항진, 발열, 안면홍조, 혀의 마비, 기침, 호흡곤란, 탈모 또는 드물게 월경 이상, BUN 상승, 부종, 인두부 이물감 등이 나타날 수 있다.
3. 임부 및 수유부에 대한 투여
 1) 임신중의 투여에 관한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에게는 치료상의 유익성이 위험성을

상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
 2) 동물실험에서 모유중으로 이행하는 것이 보고되어 있으므로 수유부에 게 투여하는 경우에는 수유를 피한다.

4. 소아에 대한 투여

저체중출생아, 신생아, 유아, 소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않다(사 용경험이 적다.).

5. 고령자에 대한 투여

고령자에 있어서 확인된 이상반응 종류 및 이상반응 발현율은 비고령자와 비교시 차이가 없으나, 일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 소화기 증상 등의 이상반응에 주의한다.

6. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.

7. 의약품동등성시험 정보^{*)}

가. 시험약 알레바정(레바미피드[알리코제약㈜]과 대조약 무코스타정(레바미피드[한국오츠카제약㈜]을 2×2 교차시험으로 각 1 정씩 건강한 성인에게 공복 시 단회 경구 투여하여 45명의 혈중 레바미피드를 측정 한 결과, 비교평가항목치(AUC, C_{max})를 로그 변환하여 통계처리하였을 때, 평균치 차의 90%신뢰구간이 log 0.8에서 log 1.25 이내로서 생물학적 동등함을 입증하였다.

구분		비교평가항목		참고평가항목	
		AUC _{0-10hr} (ng·hr/ mL)	C _{max} (ng/ mL)	T _{max} (hr)	t _{1/2} (hr)
대 조 약	무코스타정 (레바미피드) (한국오츠카제약㈜)	924.4±	257.8±	2.00	1.61±
		325.6	98.6	[0.75~5.00]	0.35
시 험 약	알레바정 (레바미피드) (알리코제약㈜)	884.8±	242.8±	2.00	1.60±
		318.2	97.3	[0.50~5.00]	0.41
90 % 신뢰구간 ^{*)} (기준 : log 0.8 ~ log 1.25)		log 0.8808 ~1.0439	log 0.8507 ~1.0277	—	—
(AUC, C _{max} , t _{1/2} : 평균값±표준편차, T _{max} : 중앙값(범위), n=45)					
AUC : 투약시간부터 최종 혈중농도 정량시간 t까지의 혈중농도-시간곡선하면적 C _{max} : 최고혈중농도 T _{max} : 최고혈중농도 도달시간 t _{1/2} : 말단 소실 반감기 *) 비교평가항목치를 로그변환한 평균치 차의 90% 신뢰구간					

^{*)} 이 약은 알리코제약㈜ 알레바정(레바미피드)과 동일한 원료를 사용하여 동일한 제조방법으로 전공정을 알리코제약㈜에 위탁 제조하였음.

[저장방법] 차광밀폐용기, 실온보관(~30℃)

[사용기한] 외부포장 참조

[포장단위] 30정/병, 300정/병

※ 본 의약품은 KGMF(의약품제조 및 품질관리기준)적격업체에서 생산하여 엄격한 품질 관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 유효기한 또는 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입한 약국 등 판매업소에 한하여 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. ※ 약은 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다. ※ 작성일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.daragon.com)에서 확인하실 수 있습니다. ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 의약품통합정보시스템(<https://medrug.mfds.go.kr>)의약품 정보를 참조하세요.
※ 부작용 피해구제 신청: 한국약품안전관리원 (0644-6223) • 작성일자 : 2024. 10. 18.

※ 제품 및 기타 문의 : 070-4327-0447

[제조자]



충북 진천군 광혜원면 용소2길 21

[제조외곽자]

daewon 대원제약(주)

본사 : 서울특별시 상동구 전호대로 386

공장 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단 1길 24

[판매자]

대원바이오텍주식회사

서울특별시 금천구 가산디지털1로 19,

15층 1501~1503호