

염증 및 부종(부기)이
생겼을 때

브로립신정

결정트립신 1mg
브로멜라인 40mg



(01) 08806417056508

【원료약품 및 그 분량】

이 약 1정(278mg) 중

- 유효성분 : 결정트립신(USP) 2,500 유에스피 트립신단위) 1mg
브로멜라인(KP) (20,000 브로멜라인단위) 40mg
- 타르색소 : 청색1호알루미늄레이크, 황색4호
- 동물유래성분 : 결정트립신(소(bovine)의 췌장), 유당(젖당)수화물(소(bovine)의 우유)
- 기타첨가제 : 디아세틸레이티드모노글리세리드, 미결정셀룰로오스, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 옥수수전분, 유당(젖당)수화물, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 청색1호알루미늄레이크, 탈크, 포비돈, 폴리에틸렌글리콜6000, 황색4호, 히프록셀로오스프탈레이트200731

【성상】 연녹색의 원형 장용성 필름코팅정

【효능·효과】 다음 질환 및 증상의 염증성 부종(부기)의 완화 : 수술 및 외상(상처) 후, 유즙울체(젖고임)

【용법·용량】 성인 : 첫날 1회 2정, 1일 4회, 이후 유지량으로 1회 1정, 1일 4회 복용한다.

체내에서의 작용기간은 아직 해명되지 않은 점이 많고 용량, 효과관계도 밝혀진 것이 아니므로 목적 없이 투여하지 않는다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 혈액응고이상 환자
- 2) 심한 간장애 또는 신장애(신장(콩팥)장애) 환자
- 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성(임신 중 투여에 관한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 치료상의 유익성이 위험성을 상회(웃돌)한다)고 판단되는 경우에만 투여한다.)
- 4) 항응고제를 투여하고 있는 환자(병용투여(함께 복용)에 의해, 항응고제의 작용이 증강될 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 신중히 투여한다.)
- 5) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 과민반응 : 발진, 발적(종혈되어 붉어짐) 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
- 2) 소화기계 : 설사, 변비, 때때로 식욕부진, 배가 거북함, 구역, 구토 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 3) 혈액계 : 드물게 코피, 혈액가래 등의 출혈 경향이 나타날 수 있다.

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

정해진 용법·용량을 지킬 것.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 10정/PTP

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【제조의회사】



일양약품주식회사

경기도 용인시 기흥구 하갈로 110
소비자상담실 : 090-021-1010(수신자요금부담전화)
학술상담실 : 02-570-3888 홈페이지 : www.il-yang.co.kr

【제 조 자】



MOTHER'S

PHARMACEUTICAL CO., LTD.
경상북도 경산시 진량읍 군대6로24길 18

제품 개봉 시 또는 취급 시에 포장재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.

- ※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 펼친 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되었거나 손상된 제품은 약국개설자 또는 의약품 판매업자에 한하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회에서 고시한 “소비자분쟁해결기준”에 의거, 정당한 소비자피해에 대해 보상해드립니다.
- ※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- ※ 최종 개정연월일(2019.08.07) 이후 변경된 내용은 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국 의약품안전관리원(1644-6223)

P1907-01