

리셀정

(비페닐디메틸디카르복실레이트)

전문의약품

【원료약품 및 그 분량】 1정(250mg) 중
• 유효성분 : 비페닐디메틸디카르복실레이트(별규) 25.0밀리그램
• 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(기원동물: 소(사용부위: 우유))
• 기타 첨가제 : 스테아르산마그네슘, 옥수수전분, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 포비돈

【성상】 흰색의 원형 정제

【효능·효과】
지속적으로 ALT가 상승되어 있는 만성간염

【용법·용량】
성인 : 비페닐디메틸디카르복실레이트로서 1회 25 ~ 50 mg, 1일 3회 경구투여한다.
증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응 환자
 - 이 약은 우당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 만성 활동성 간염 환자
 - 간경변 환자
- 이상반응
 - 입안마름, 메스꺼움, 피부발진이 일어날 수 있으며, 이러한 이상반응은 항과민약을 병용 투여하면 소실된다.
 - 알과성 황달이 나타날 경우도 있으나 투약을 중지하거나 황달 치료제를 병용 투여하면 소실된다.
 - 드물게 구역과 복부팽만이 발생할 수도 있으나 곧 소실된다.
- 상호작용
이노신(inosine)과 함께 투여 시에, 재발한 ALT의 상승이 개선될 수 있다.
- 임부 및 수유부에 대한 투여
임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부에는 투여하지 않는다.
- 고령자에 대한 투여
일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 신중히 투여한다.
- 임상검사치에 영향
치료 중에 다시 ALT가 상승하는 환자는 거의 없다. 투여 중지 후에 ALT는 증가할 수 있으나 이 약의 재투여로 개선된다.
- 보관 및 취급상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품오용에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관한다.

【포장단위】 30정/병, 300정/병


【저장방법 및 사용기간】 차광기밀용기, 실온보관(1~30℃), 제조일로부터 36개월

【제조외피지】 (주)중헌제약, 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 옥산산단로 28 공장동

【제조사】 (주)파마킹, 충청북도 음성군 감곡면 행군이길 87-17

※ 제품 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회고시 "소비자분쟁해결기준"에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.
※ 제품을 사용한 후 부작용(이상반응)이 발생한 경우 한국의약품안전관리원(1644-6223)에 문의하여 부작용 피해구제 신청을 할 수 있습니다.
※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽으시고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
※ 처방된 증상, 처방된 환자 이외에는 사용하지 마십시오.
※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하십시오.
※ 첨부문서에 기재되어 있지 않은 부작용이 나타날 경우, 의사나 약사 또는 식품의약품안전처에 알려십시오.
※ 사용(유효)기한이 경과한 의약품은 사용하지 마십시오.
※ 첨부문서 개정년월일 이후의 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr/searchDrug>)에서 확인하실 수 있습니다.
※ 제품관련 문의사항은 <(주)중헌제약 : 02-6928-9114>로 문의바랍니다.

>> 접지 후 모습



파마킹 제조

• 롤 폴림방향 (미출) →

날짜	2024년 10월 18일	기타	롤타입	●재질 및 색상, 수량 확인해주세요. ●전화번호, 주소 등 시안 내 중요내용 반드시 확인해주세요. ●빠진글자(내용), 틀린글자(내용), 위치 확인해주세요. ●같은 데이터라도 인쇄할 때마다 색상차이가 생길 수 있습니다. 색상이 진하고(오차범위 +5~10%) 흐림 정도(오차범위 -5~10%)로는 재작업이 진행될 수 없습니다. 예) 이전 발주는 조금 진하게 인쇄되고 이번 발주는 조금 흐리게 인쇄되었다면 그 편차는 10~20% 정도로 고객님의께서 생각하신 것과 다를 수 있습니다.
고객사	중헌제약	색상	맥색(K100) —— 칼선(인쇄되지 않습니다.)	
제품명	리셀정			
유형	매뉴얼팩			
인쇄	□양면 ▢단면			
규격	138×210mm			
접지규격	35×35mm	폰트	- 제품명 : 7포인트 이상 - 전문의약품 문구 : 7포인트 이상 - 본문 : 6포인트	
재질	캠퍼스지 50g			
관리번호	2024.10.15 (M2164-V03)			
				※ 상기 사항의 확인 실수로 인한 책임은 당사에 없음을 고지합니다. 유의하시기 바랍니다. ※ 수정된 원본 데이터는 제공되지 않습니다.