

본태고혈압 텔레미엠정40mg (텔레미스란)

【원료약품 및 그 분량】 정 중

- 유효성분: 텔레미스란(CP) 40.0mg
- 첨가제(동등유물) : 유당수화물(기원등물 : 소, 사용부위 : 우유)
- 기타첨가제 : 디에틸렌글리콜모노에틸에테르, 소이폴라키리이드, 수산화칼륨, 스티아르산나트그세움, 폴로이데싱 이산하이드소, 탄산칼슘, 포비돈

【상상】환자의 장지현형 정제

【효능·효과】

1. 본태고혈압

2. 심혈관 질환의 위험성 감소

ACE억제제를 내약성으로 투여할 수 없으며, 주요 심혈관 질환이 발병될 위험성이 높은 만 55세 이상의 환자(관상동맥질환, 말초동맥질환, 뇌졸중, 일과성 허혈 발작에 대한 과거 병력이 있거나, 말단 장기 손상의 임상적 증거가 있는 고위험성 당뇨병 환자)에서 심근경색, 뇌졸중 및 심혈관 질환으로 인한 사망의 위험성 감소

【용법·용량】

1. 본태고혈압

성인 : 텔레미스란으로서 1일 1회 40 mg경구투여할 것이 권장되며, 환자에 따라 1일 1회 20 mg으로 유효할 수 있다. 필요한 경우 1일 1회 80 mg까지 증량할 수 있다. 이 약은 히드로클로로티아지드 등의 티아지드계 이뇨제와 병용투여시 추가적인 혈압강화 효과를 나타낸다. 용량을 증가할 때는 치료사칙 후 4 ~ 8주에 최대 혈압강화 효과를 나타낸다.

2. 심혈관 질환의 위험성 감소

성인 : 이 약으로서 1일 1회 80 mg 경구투여할 것이 권장된다. 80 mg 미만 용량에서의 심혈관 질환의 이환율과 사망률에 대한 위험성 감소 효과는 알려진 바 없다. 심혈관 질환에 대한 위험성 감소의 목적으로 이 약의 치료를 시작하는 경우 혈압을 모니터링 하는 것이 권장되며, 혈압강화제의 적절한 조절이 요구될 수도 있다.

○ 간장애 환자

경증 ~ 중증도의 간장애에 환자에게는 주의하여 투여해야하며, 1일 1회 40 mg을 초과하지 않아야 한다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고

일부에게 레닌-안지오텐신-알도스테론계(RAAS)에 직접 작용하는 약물들의 투여시, 태아 및 신생아에게 손상 및 사망까지도 일어날 수 있으며, 이러한 사례는 ACE억제제를 복용한 환자에서도 세계적으로 수선례가 보고된 바 있다. 따라서 만일 임신으로 확인할 경우 즉시 이 약의 투여를 중단해야 한다(임부 및 수유부에 대한 투여 항목 참조).

2. 다른 환자에는 투여하지 말 것.

- 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응 환자
- 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부
- 중증의 간장애 환자, 담도폐쇄 또는 담즙정체 환자가 이 약은 거의 대부분 담즙으로 배설된다. 담즙 정체, 담도폐쇄성 질환이 있는 환자나 간장애 환자의 경우 간 청소능 감소를 예상할 수 있다.)
- 유전성 혈관부종 환자이거나, ACE억제제 또는 안지오텐신 II 수용체 길항제 치료시 혈관부종의 병력이 있는 환자
- 당뇨병이나 중증도~중증도의 신장애 환자(사구체여과율 <60mL/min/1.73m²에서 알리스키렌 함유제제와의 병용)
- 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

3. 다른 환자에는 신중히 투여할 것.

- 고령자
- 고혈혈충 환자 또는 혈청 칼륨치가 높아지거나 수혈 환자
- 경증에서 중증도 간장애 환자(투여중지 투여해야하며, 1일 1회 40 mg을 초과하지 않아야 한다.)
- 대동맥판 및 승모판 협착증 환자 또는 폐쇄비대칭성 환자
- 허혈성심장병, 허혈성뇌관 질환, 뇌졸중 환자(과도한 혈압강화는 심근경색이나 뇌혈류 부전으로 인한 뇌졸중을 일으킬수 있다)
- 활동성 위 또는 십이지장궤양 등 위장관계 질환 환자

- 신장혈관고혈압 환자(양측성 신동맥 협착증 환자 또는 단독기능 신장의 신동맥 협착증 환자)
- 중증의 신장애 환자(신기능을 약화시킬 우려가 있기 때문에 혈청 크레아티닌 3.0 mg/dL 이상인 경우에는 신장애를 투여한다.)
- 레닌-안지오텐신-알도스테론계(RAAS)의 이중차단 : 안지오텐신 II 수용체 길항제(ARB), ACE억제제, 또는 알리스키렌 등 레닌-안지오텐신-알도스테론계(RAAS)에 영향을 미치는 다른 약제와의 병용은 권장되지 않는다(2. 5항 참조).

4. 이상반응

1) 고혈압 환자에게 실시된 위약대조 임상시험에서 텔레미스란 투여 후 보고된 전반적인 이상반응의 발현 빈도는 위약과 유사하여 이 약 투여군에서 41.4 %, 위약 투여군에서 43.9 %였다. 이들 이상반응의 발현율은 용량과 관련 없으며 환자의 성별, 연령, 인종과도 무관하다. 심혈관 질환의 위험성 감소효과를 평가하기 위해 이 약을 투여받은 환자에서 알려진 텔레미스란 안전성 프로파일은 고혈압환자를 대상으로 실시한 임상시험에서 얻어진 것과 동일하였다. 아래의 이상반응 목록은 고혈압 환자를 대상으로 실시한 대조 임상시험과 시판 후 조사로부터 수집된 것이다. 또한, 다음의 표는 최고 6년까지 실시된 제 4회 역학 장기인 임상 시험(심혈관 질환의 위험성 감소효과와 병가를 위해 텔레미스란을 투여받은 21,642명의 환자 포함)에서 보고된 중대한 이상반응과 임상시험의 중단을 요한 이상반응을 고려하였다. 이상반응의 발생빈도는 다음과 같이 정의한다. : 때때로(≥ 1/1,000, < 1/100); 드물게(< 1/10,000, < 1/1,000); 매우 드물게(< 1/10,000) 각각의 빈도 분류 내에서는 중증도가 낮아지는 순서대로 이상반응을 기재하였다.

발현부위	증상별 발현빈도 때때로	드물게
감염증	상기도 감염 (인두염, 부비동염 포함), 오로감염(방광염 포함)	폐렴증(자영적 결과 포함)
혈액 및 림프계 면역계	빈혈	혈소판 감소증, 호산구증가증
대사 및 영양	고칼륨 혈증	저혈당
청신	우울, 불면	불안
신장계	실신	
눈		시각 이상
귀 및 미로	어지럼	
심장	서맥	빈맥
혈관	저혈압*, 기립저혈압	
호흡, 흉부 및 종격동	호흡곤란	
위장관	복통, 설사, 소화불량, 복부팽만감, 구토	복부불쾌감, 구강건조
간 및 담도		간기능 이상(간장애)**
피부 및 피하조직	발한증가, 가려움, 발진	중반, 혈관부종(자영적 결과 수반), 약물발진, 독성피부발진, 창진, 두드러기
골격근 및 결합조직	근육통, 오름에 : 최골신경통), 근육경련(다리경련)	관절통, 사지통증(다리통증), 혈중총중간염(염증성)
신장 및 비뇨기	급성신부전을 포함한 신장애	
진진 및 투여부위	가슴통증, 두력증(상악)	인물루이염(오염 질환
감사지	혈중 크레아티닌 증가	혈중 요산 증가, 간초소 증가, 혈중 크레아티닌치(CK) 상승, 헤모글로빈 감소

* 심혈관 위험성 감소를 위해 텔레미스란을 투여받은 환자 중 혈압이 조절되지 있던 환자군에서는 흔하게 보고됨.
** 일본인을 대상으로 한 시판후경향에서 보고된 경우가 대부분임.

- 대사 이상 : 저혈당(드물게)이 나타나 사례가 있으므로(당뇨병 치료중인 환자에서 나타나기 쉽다) 관찰을 충분히 하고, 무력감, 공복감, 식욕감, 소 떨림, 집중력하차, 경련, 의식장애 등이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
- 혈관부종 : 얼굴, 안술, 인두 후두, 혀 등의 부종을 증상으로 하는 혈관부종이 나타나, 후두부종 등으로 호흡 곤란을 초래한 사례도 보고되어 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 즉시 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
- 고혈혈충 : 심각한 고혈혈충증 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 즉시 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
- 신기능 장애 : 신부전을 보인 사례가 보고되어 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
- 소식, 실신, 의식 소실 : 소크 혈압강하에 따른 실신, 의식 소실이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 차가운 느낌, 구토, 의식 소실 등이 나타날 경우에는 즉시 적절한 처치를 한다. 특히 혈액 투석, 심각한 열변태, 이뇨제 투여중인 환자는 낮은 용량에서 투여를 시작하고 증강하는 경우 환자의 상태를 충분히 관찰하면서 투여를 중단해야 한다.
- 간기능 장애 : 혈당, AST, ALT, ALP, LDH의 상승 등 간기능 장애, 혈당이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
- 아나필락시스모양 증상 : 호흡 곤란, 혈압강하, 후두부종 등이 증상으로 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.

- 간질성 폐렴(빈도 불명) : 발열, 기침, 호흡 곤란, 흉부 X 선 이상 등을 수반하는 간질성 폐렴이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지하고 부신 피질 호르몬제의 투여 등 적절한 처치를 한다.
- 형문근용해(빈도 불명) : 근육통, 무력감, 크레아틴키나아제(CK) 상승, 혈중 및 오중 미오글로빈 상승을 특징으로 하는 형문근용해가 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히하고 이러한 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
- 위에서 언급한 이상반응 이외에 심계항진, 피로, 구역, 고혈부종이 보고된 바 있다.
- 국내에서 15,601명의 고혈압 환자를 대상으로 실시한 대규모 시판 후 사용성적조사결과 이상반응 발현율은 1.54 %(240례)/15,601례이었으며, 이 중 약물과의 인과관계를 배제할 수 없는 것은 12 %(183례)/15,601례이었다. 두통이 0.38 %(60례)/15,601례로 가장 많았고, 그 다음은 어지럼 0.2 %(33례)/15,601례), 기침 0.13 %(21례)/15,601례), 소화불량 0.07 %(11례)/15,601례), 심계항진 0.06 %(10례)/15,601례) 등의 순이었다. 중대한 이상반응으로 부당명 폐가 보고되었다. 약물과의 인과관계를 배제할 수 없는 것으로서, 시판 전 임상시험에서 위약대조 발현율이 낮았거나(=*로 표시) 시판 전 임상시험에서 나타나지 않았던 새로운 이상반응은 다음과 같다(괄호안의 숫자는 발현 예수임).

- 중추 및 말초 신경계 : 두통*(60), 얼굴경련(2), 감각이상(2), 마비(1),
- 호흡기계 : 기침*(2), 과호흡(1), 폐렴(1)
- 자율신경계 : 홍조(5), 발기부전(1), 식욕부진(1), 부정맥(1)
- 진진 : 무력(4), 부종(3)
- 정신신장계 : 상극감소(2)
- 피부 및 부속기관 : 열골부종(1), 발진(1), 말초증(1)
- 감각기관 : 결막염(1), 귀에서 소리가 남(1)
- 혈소판 출혈 및 용고이상 : 점상출혈(1)
이 중 신장애 환자의 이상반응 발현율은 0.9 %(4례/4452례)로 두통, 어지럼, 근육통, 피부염이 보고되었으며, 간장애 환자의 이상반응 발현율은 2.0 %(68/2962례)로 어지럼, 소화불량, 기침, 설사, 복통, 식욕부진, 무력이 보고되었다.

5. 일반적 주의

1) 신장애 및 신장이식 환자

신장애 환자에게 이 약을 투여할 때 혈청 칼륨 및 크레아티닌치의 주기적인 모니터링이 권장된다. 최근에 신장을 이식한 환자에 대해서는 이 약의 사용경험이 없다. 이 약은 혈액 투석을 받는 환자를 포함한 신장애 환자에서 용량조절이 필요 없으며, 혈액투석으로 제거되지 않는다.

2) 혈관내 혈장자하증

고용량의 이뇨제, 사이성 염분제한, 설사 및 구토 등에 의해 혈액량 및/또는 나트륨이 고갈된 환자, 혈액투석중인 환자의 경우, 특히 초회 투여 후 저혈압 증상이 나타날 수 있다. 이런 증상, 특히 혈액량 및/또는 나트륨의 고갈은 이 약 투여 전에 교정되어야 한다. 저혈압이 발생하는 경우 환자를 반드시 누하고 필요시 병사시원 주사액을 정맥주입한다.

3) 레닌-안지오텐신-알도스테론계를 자극하는 다른 조건

혈관긴장제 및 신기능이 레닌-안지오텐신-알도스테론계의 활성에 주로 의존하는 환자의 경우에도, 중증의 용혈성신부전 환자 또는 신동맥협착증을 포함한 관원적인 신질환 환자, 레닌-안지오텐신-알도스테론계에 영향을 미치는 다른 약물의 투여는 금상 저혈압, 과질소혈증, 빈뇨 및 드물게 급성신부전 및/또는 사망과 관련성이 있다. 이 약을 투여한 환자들에게서도 유사한 결과가 예측된다.

4) 전해질불균형/고칼륨혈증

레닌-안지오텐신-알도스테론계에 영향을 미치는 약물을 복용하는 경우 고칼륨혈증을 유발할수 있다. 고령자, 신부전 환자, 당뇨병 환자, 혈청 칼륨농도에 영향을 줄 수 있는 약물을 복용중인 환자 등에서 고칼륨혈증은 지양제할 수 있다. 레닌-안지오텐신-알도스테론계에 영향을 주는 약물을 병용하기 전에 유약성과 위험성을 고려해야 한다. 고칼륨혈증을 유발할 수 있는 주요 위험 요소는 다음과 같다.

- 당뇨병, 심부전, 신장장애, 고령자(> 70)
- 레닌-안지오텐신-알도스테론계에 영향을 주는 약물(칼륨보존이뇨제, 칼륨보충제, 칼륨이 함유된 염 대용물 및 칼륨치를 상승시킬 수 있는 다른 약제(파킨슨 병), ACE억제제, 안지오텐신 II 수용체 길항제, 비스테로이드소염진통제(선택적 COX-2 약제제를 포함하는 비스테로이드소염진통제), 면역억제제(시클로스포린, 테크로리무스), 테르페프롤 등들 한가지 이상 병용하는 경우.
- 탈수, 급성 심장부정기전실, 대사산중, 신장기능의 악화, 신장상태의 갑작스런 악화(예, 감염성 질환, 세포용해)에, 급성시지 허혈, 형문근용해, 화(1)와상와 같은 병발질환이 있는 경우
- 수술 전 24시간은 투여하지 않는 것이 바람직하다.
- 활동성 위 또는 십이지장궤양 등 위장관계질환 환자에게서 이 약 투여시 위장관계 이상반응이 위약 투여군보다 더 자주 나타났다. 위장관 출혈이 임상시험에서 드물게 관찰된 바 있으며 대부분 위장관 질환을 가진 환자에서 초기에 나타났다. 따라서 위장관계 질환자에게 이 약을 투여할 때는 주의하여야 한다.

가) 신장혈관고혈압 환자(양측성 신동맥 협착증 환자 또는 단독기능 신장의 신동맥 협착증 환자)를 레닌-안지오텐신-알도스테론 계에 영향을 미치는 약물로 치료할 경우에는 중증의 저혈압이나 신부전의 위험이 증가된다. 양쪽 또는 한쪽의 신동맥협착증이 있는 환자에게 이 약을 투여할 경우 ACE억제제와 마찬가지로 혈청 크레아티닌 또는 혈중 요산질소의 상승이 예측된다. 또한 신장혈류량 감소와 사구체 여과율의 저하에 의해 급속히 신장기능을 약화시킬 우려가 있으므로 치료 부득이라고 판단되는

경우를 제외하고는 사용을 못하는 것이 권장된다.

- 일반적으로 월경일도스테론증이 있는 환자는 레닌-안지오텐신-알도스테론계를 억제하는 혈압강화제에 대해서 반응성이 없으므로 이런 환자에게 이 약의 투여는 권장되지 않는다.
- 요운전 기가제초화에 대한 영향 : 이 약이 요전 기가제초화에 미치는 영향에 대한 연구는 실시되지 않았으나, 혈압강화제를 복용할 때 때때로 졸음, 어지럼이 나타날 수 있으므로 이 약을 투여중인 환자는 자동차 운전 또는 위험이 수반되는 기계적 조작시 주의해야 한다.
- 이 약은 소크리블을 함유하고 있으므로 유전적으로 과당 불내성 환자에게는 적합하지 않다(소크리블 함유제제에 한함).
- 신혈관 질환에 대한 추가적인 위험성이 있는 당뇨병 환자에 : 당뇨병과 관상동맥질환을 동반한 환자에서 안지오텐신 II 수용체 길항제 또는 ACE 차단제와 같은 혈압강화제 투여 시 지장적인 심근경색 및 예상하지 못한 심혈관 질환으로 인한 사망 위험성이 증가할 수 있다. 당뇨병 환자에서 관상동맥질환에 대한 중대한 진단 평가에는, 이에 대해 진단되지 않을 수 있으므로 당뇨병 환자 에게 이 약을 투여하기 전에 관상동맥질환에 대한 적절한 진단 평가(예 : 운동 부하 검사)를 우선적으로 실시해야 한다.

6. 상호작용

- 안지오텐신 II 수용체 길항제(ARB), ACE억제제 또는 알리스키렌의 병용투여에 의한 레닌-안지오텐신-알도스테론계(RAAS)의 이중차단은 이러한 약물의 단독요법과 비교시 저혈압, 실신, 고칼륨혈증 등 신기능의 변화(급성 신부전 포함) 위험을 증가시키는 것과 관련이 있다. 이 약과 RAAS에 작용하는 다른 약물을 병용투여하는 환자의 경우, 혈압, 신기능 및 전해질을 면밀히 모니터링해야 한다. 당뇨병이나 중증증~중증의 신장애 환자(사구체여과율 <60 mL/min/1.73m²)에게 이 약과 알리스키렌 함유제제를 병용투여하지 않는다(2. 5항 참조).
- 이 약은 다른 혈압강화제의 혈압강화효과를 증가시킬 수 있다. 임상적으로 유약성 있는 다른 상호작용은 확인된 바 없다.
- 이 약과 와르핀, 히드로클로로티아지드, 클라켄클라리드, 이부프로펜, 이세티미노펜, 스프라노딘 및 암로디핀의 병용투여에 의해 임상적으로 유약한 상호작용은 나타나지 않았다.
- 다극산 : 다극산과 이 약의 병용투여에 의해 혈청 다극산의 최고농도의 중앙값이 49 %증가하였고, 기저농도의 중앙값이 20 %증가(예에서 39 % 증가)하였다. 그러므로 이러한 경우 혈청 다극산치의 모니터링이 권장된다.
- 라이미필 : 텔레미스란과 라이미필의 병용투여 시험결과, AUC_{0-24h} 수치 및 라이미필과 라이미필랫트의 C_{max} 수치가 2.5 배까지 증가하였다. 텔레미스란과 라이미필 병용투여시 약력학적 상지점 및 라이미필/라이미필랫트의 증가된 노출로 인하여 효과가 증강될 수 있다. 이 약과 라이미필의 병용투여는 권장되지 않는다.
- 리튬 : ACE억제제와 리튬을 병용투여하였을 때, 혈청 리튬치의 가역적인 증가/감 독성이 보고된 바 있다. 이 약을 포함하여 안지 오텐신 II 수용체 길항제 또한 이런 독성이 보고되었다. 따라서 이 약과 리튬을 병용투여하는 동안 혈청 리튬치의 신중한 모니터링이 권장되며, 일반적으로 병용투여는 권장되지 않는다.
- 이 약은 CYP-450 시스템에 의해 대사되지 않으며, 일부 CYP2C19억제제를 제외하고는 실험실상(in vitro)에서 CYP-450 효소에 영향을 미치지 않았다. CYP2C19에 의해 대사되는 약물의 대사를 저해할 가능성을 제외하고는 이 약과 CYP-450 효소에 의해 대사되는 약물 및 CYP-450 효소를 저해하는 약물과의 상호작용은 예측되지 않는다.
- 비로렌, 이미포스틴, 알코올, 비르비투르신염, 마약, 항우울제에 의해 기립저혈압이 심화될 수도 있다.
- 비스테로이드소염진통제(NSAID) : 안지오텐신 II 수용체 길항제가 비스테로이드소염진통제(예, 선택적인 COX-2억제제, 아세틸살리실산* > 3 g/day), 비선택적 비스테로이드소염진통제와 병용시 혈압강화효과가 감소할 수 있다. ACE억제제와 같이, 안지오텐신 II 수용체 길항제와 비스테로이드소염진통제의 병용은 신기능을 악화, 급성 신부전을 유발시킬 수 있고, 혈청 칼륨을 증가시킬 수 있다. 병용시 주의해야 하며, 특히 고령자 또는 유효혈압감 감소환자(이뇨제 치료 중인 환자)를 포함는 주의한다. 병용치료 시작 후예 환자에게 적절한 수분이 공급되어야 하며, 신기능을 주기적으로 모니터링 해야한다.
- 칼륨보존이뇨제 또는 칼륨보충제 : 텔레미스란과 같은 안지오텐신 II 수용체 길항제는 칼륨 소실을 통한 이뇨 효과를 약화시킨다. 칼륨보존이뇨제(스피로노락톤, 에플레레네, 트리암테네 또는 이리로리), 칼륨보충제 또는 칼륨이 함유된 염 대용제는 혈청 칼륨 농도를 증가시킬 수 있다. 저칼륨혈증으로 인하여 이 약을 병용투여하는 경우 혈청 칼륨 농도에 대해 빈번한 모니터링하면서 주의하여 투여한다. 일반적으로 병용투여는 권장되지 않는다.
- 부신피질호르몬(코르티코스테로이드, 진진 투여) : 이 약과 병용투여시 혈압강화효과가 감소될 수 있다.
- 이뇨제(타이아지드 또는 루프이뇨제) : 이 약으로 치료 시작 전후, 루프이뇨제(푸로세미드) 그리고 타이아지드이뇨제(히드로클로로티아지드)와 같은 이뇨제의 고용량 사용은 체액고갈, 저혈압의 위험성을 증가시킬 수 있다.

7. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 생식능 : 이 약이 사람의 생식능에 미치는 영향은 연구되지 않았다. 알컷 및 수컷 켄트를 이용한 비임상시험에서 수태능에 대한 이 약의 영향은 관찰되지 않았다.
- 임산 기 중 안지오텐신 II 수용체 길항제의 사용은 권장되지 않으며 임신기간 중 이 약의 투약을 시작해서는 안 된다. 안지오텐신 II 수용체 길항제의 작용기전 때문에 태아에 대한 위험을 무시할 수 없다. 임신 2 ~ 3기 사이에 ACE억제제(레닌-안지오텐신-알도스테론계에 작용하는 특정 용량)에 노출된 임부에서 태아 및 신생아의 저혈압, 고칼륨혈증, 신생아 두팔 부종을 발발할 우려소 그리고/또는 무호중, 가역적 또는 비가역적인 신부전, 지극대 성장 지체 및 사망을 포함하여 태아 및 신생아 손상과 연관성이 있었다. 태아 신기능 감소 때문인 것으로 추측된 양수과소증이 보고되었고, 양수과소증은 태아 사구체, 두개면연 기형 및 폐혈류 부전과 연관성이 있었다. 후향적 자료에 의하면, 임신 기에 ACE억제제를 사용하는 것은 출생결함의 잠재적 위험과 연관 있었다. 또한 이 약에 의한 것이지 명확하지 않지만, 미숙, 자궁내 발육지연, 동맥관 열림증이 나타났다는 보고가

있다. 다른 레닌-안지오텐신-알도스테론계에 직접 작용하는 약물처럼 이 약도 임신 중 또는 임신을 계획하고 있는 여성에서 사용해서는 안 되며, 투약 중 임상이 확인되면 즉시 투약을 중지한다. 레닌-안지오텐신-알도스테론계에 작용하는 약물을 임신할 가능성이 있는 여성에게 처방할 경우, 의사는 임신 중 이 약의 잠재적 위험에 대하여 알려주어야 한다. 만약 임신 2기 이후로 일부가 안지오텐신 II 수용체 길항제에 노출될 경우, 태아의 신장기능과 두개골 조영과 검사가 권장된다. 또한, 자궁 내에서 이 약에 노출된 경향이 있는 신생아의 경우 충분한 배뇨, 고칼륨혈증, 혈압을 면밀히 조사해야 한다.

3) 이 약이 모유로 이행되는지의 여부는 밝혀지지 않았으나 컷에 대한 실험에서 유증 중에 이 약의 분비가 확인되었으므로 수유부가 이 약을 사용하는 것은 바람직하지 않다. 수유중인 여성에게 이 약의 투여를 피하고, 복귀이 투여하는 경우에는 수유를 중단해야 한다.

8. 소아에 대한 투여

만 18세 미만의 소아에 대한 안전성 및 유효성은 확립되지 않으므로, 이 약의 투여가 권장되지 않는다.

9. 고령자에 대한 투여

고령자에게 일반적으로 과도한 혈압강하는 바람직하지 않다고 되어있다(뇌경색 등이 일어날 우려가 있다). 고령자에 투여하는 경우에는 환자의 상태를 관찰하면서 신중히 투여한다.

10. 과량투여시의 처치

사람에서의 과량투여에 대한 유용한 정보는 제한적이다.

이 약의 과량투여시 가장 현저한 증상으로 저혈압, 빈맥, 사맥(부교감신경 자극으로 인한), 어지럼 및 급성신부전 등이 보고되었다. 치료 저혈압 증후가 나타나면 보조적인 치료를 실시해야 한다. 이 약은 혈액투석에 의해 제거되지 않는다. 환자를 주의깊게 관찰해야 하고 복용 후 경과시간 및 증상의 경중에 따라 대증적 보조적 치료를 실시한다. 구토유도를 고려할 수도 있다. 약용탄이 처치에 유용할 수도 있다. 혈청 전해질 수치와 크레아티닌 수치를 자주 모니터링 해야 한다. 저혈압이 나타나면 환자를 높이고 염분과 체액 대용제를 빨리 공급해야 한다.

11. 보관 및 취급상의 주의사항

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.

12. 약물중독등심상지침 정보*

가. 시험약 미르토징40일리그램(텔레미스란)(위더스제약(주))과 대조약 마카르디스징40일리그램(텔레미스란)(한국메링 거인(하림)(주))을 2x2 사용시험으로 각 1명씩 건강한 성인에게 공복 시 단회 경구 투여하여 36세의 활동 텔레미스란만을 측정한 결과, 비교평가항목치(AUC_{0-24h}, C_{max})를 로그 변환하여 통계처리 하였을 때, 평균치 차의 90 % 신뢰구간이 log 0.8에서 log 1.25이므로서 생물학적으로 동등함을 입증하였다.

구분		비교평가항목		참고평가항목	
		AUC _{0-24h} (ng·hr/mL)	C _{max} (ng/mL)	T _{max} (hr)	t _{1/2} (hr)
대조약	마카르디스징40일리그램 (텔레미스란)(한국메링(하림)(주))	1148 ± 693	100.5 ± 64.2	2.00 (0.75-4.00)	22.6 ± 15.5
시험약	미르토징40일리그램(텔레미스란) (위더스제약(주))	1178 ± 672	104.9 ± 84.7	1.75 (0.75-4.00)	18.0 ± 5.1
90% 신뢰구간* (기준 : log 0.8 ~ log 1.25)		log 0.9815 ~ 1.0953	log 0.9071 ~ 1.0868	-	-
(AUC _{0-24h} , C _{max} , t _{1/2} : 평균값±표준편차, T _{max} : 중앙값(범위), n=36)					
AUC _{0-24h} : 투약시간부터 최종혈중농도 측정시간 1까지의 혈중농도-시간곡선하면적 C _{max} : 최고혈중농도 T _{max} : 최고혈중농도 도달시간 t _{1/2} : 말단 소실 반감기 * 비교평가항목치를 로그변환한 평균치 차의 90%신뢰구간					

* 이 약은 위더스제약(주) 미르토징40일리그램(텔레미스란)과 동일한 원료를 사용하여 동일한 제조방법으로 정공정을 위더스제약(주)에 위탁 제조하였음.

비임상 안전성 시험결과, 정상 혈압을 가진 동물에 임상적 치료 용량에 상응하는 용량 투여시 적절한 파라미터(예, 적혈구, 헤모글로빈, 헤마토크리트)의 감소, 신장의 혈액학적 변화(혈액 요소 질소 및 크레아티닌 증가), 혈청 칼륨 증가가 보고되었다. 개에서는 신장애 확증 및 위축이 관찰되었다. 또한 위장 점막 손상(만성, 궤양 또는 염증이) 켄트와 개에서 관찰되었다. ACE 억제제 및 안지오텐신 II 수용체 길항제의 비임상시험 자료에서 보고되는, 약리학적 효과에서 비롯한 이상반응들은 생리사실증상의 경구투여로 발생되었다.

양쪽 동물중(켄트 및 개)에서 혈청 레닌 활성 증가, 신장사구체세포(renal juxtaglomerular cell)의 비대 및 증식이 관찰되었다. 이러한 변화는 ACE억제제 및 안지오텐신 II 수용체 길항제에서 보고된 것과 마찬가지로 임상적으로 유약하지 않다. 기형발생에 대한 증거는 없으나, 동물실험에서 체중증가, 개안 지연, 치아를 증가와 같은 후태아 출생 후 발생에서 텔레미스란의

잠재적인 위험이 보고되었다. 실험실 연구(in vitro study)에서 유전독성 및 염색체 비안정성에 대한 증거는 없으며, 켄트 및 마우스에서 발암성에 대한 증거는 없다.

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【포장단위】 30정/상자(10정/Alu-Alu), 30정/병

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【제조자】 위더스제약(주) / 경기도 안성시 미양면 제2공단2길 103

【제조회사】 (주)마더스제약 / 경상북도 경산시 진량읍 공단6로24길 18

- * 제품 개봉 시 또는 취급 시에 포장재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.
- * 본 제품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(GMP)에 따라 제조 및 품질검사를 통한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변색, 오손된 제품이 발견될 경우는 구입하신 약국을 통해 교환하여 드립니다.
- * 작성일자(2022.09.13) 이후 변경된 내용이나 자체낸 품목호가 또는 신고사항은 본사(070-7457-8819)로 문의하시기나 또는 식품의약품안전처의약품통합정보시스템(http://nedrug.mfds.go.kr)에서 확인할 수 있습니다.
- * 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)

작성일 : 2022년 09월 13일

40년 이상 엄마의 마음으로 여러분의 건강을 지켜온

 **(주)마더스제약** Since 1974-
MOTHER'S PHARMACEUTICAL CO., LTD.