


접착면

안티그라서방정

[사르포그렐레이트염산염] 300밀리그램



안티그라서방정 300밀리그램

전문약품	
분류번호	339

ANTIGRA SR Tab.(Sarpogrelate Hydrochloride)

[원료약품 및 그 분량] 1정 중,

■ 유효성분 : 사르포그렐레이트염산염(KP) 300,0mg
■ 기타첨가제: 말티톨, 미결정셀룰로오스, 산화폴리에틸렌, 스테아르산마그네슘, 시트르산, 오파드라이 흰색 21S680000, 카르나우바남, 카르복시메틸셀룰로오스, 콜로이드성이산화규소, 포비돈, 히드록시에틸셀룰로오스

[성상] 흰색의 장방형 필름코팅정

[효능·효과]

만성 동맥폐색증(버거씨병, 폐색성동맥경화증, 당뇨병성말초혈관병증 등)에 의한 괴양, 통증 및 냉감 등의 허혈성 증상 개선

[용법·용량]

성인 : 사르포그렐레이트염산염 서방정 300mg을 1일 1회 식후 경구 투여한다. 이 약은 씹거나 부수지 말고 그대로 복용하여야 한다.

[사용상의주의사항]

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 출혈이 있는 환자(혈우병, 모세혈관위약증, 소화관궤양, 요로출혈, 객혈, 초차체출혈등)(출혈을 증가시킬 가능성이 있다.)
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성(임부·수유부에 대한 투여 항 참고)
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 월경기간중인 환자(출혈을 증가시킬 우려가 있다.)
 - 출혈경향 및 이러한 소인이 있는 환자(출혈경향을 증가시킬 우려가 있다.)
 - 항응고제(와르파린 등) 또는 혈소판응집억제작용이 있는 약제(아스피린, 티클로피딘, 실로스타졸 등)를 투여중인 환자(출혈경향을 증가시킬 우려가 있다.)
 - 중증의 신장장애가 있는 환자(배설에 영향을 미칠 우려가 있다.)
- 고령자
- 이상반응
 - 사르포그렐레이트 서방정
 - 1) 만성 동맥폐색증 환자 149명 중 74명이 서방정 정제인 이 약을 투여하고 75명이 일반정제를 투여한 임상시험에서 이 약을 투여한 환자 중 31.1%, 일반정제를 투여한 환자 중 40.0%에서 이상반응이 보고되었다. 이 약 투여군(74명)에서 발생한 이상반응 중 이 약과 관련된 이상작용반응은 두드러기 1건이었으며 경증으로 나타났다. 이 약과의 인과관계 여부에 관계없이 단 1건이라도 발생한 이상반응은 다음과 같다.
 - 감염증 : 비인두염, 결막염, 상기도 감염
 - 위장관계 : 소화불량, 변비, 설사, 위염, 위장관 기능 이상
 - 대사 및 영양 : 저혈당, 식욕감소
 - 근골격계 : 등 통증, 근육 쇠약
 - 신경계 : 두통, 감각이상
 - 호흡기계 : 기침
 - 피부 및 피하조직 : 두드러기
 - 혈관계 : 혈압 변동
 - 심혈관계 : 심방세동
 - 장신계 : 불안
 - 신장 및 비뇨기계 : 배뇨곤란
 - 검사치 : 혈압 상승
 - 일반적인 이상 : 오한, 열감, 발열, 상처
 - 2) 국내 시판 후 조사결과

① 국내에서 재심사를 위하여 4년 동안 만성 동맥폐색증 환자 3,504명을 대상으로 실시한 시판 후 조사 결과, 이상사례의 발현은 인과관계와 상관없이 6.74%(236/3,504명, 총 327건)로 보고되었다. 이 중 인과관계와 상관없는 중대한 이상사례 및 인과관계를 배제할 수 없는 중대한 약물이상반응은 발현 빈도에 따라 아래 표에 나열하였다.

빈도	기관계명	인과관계와 상관없는 중대한 이상사례 0.91%(32/3,504명, 362건)	인과관계를 배제할 수 없는 중대한 약물이상반응 0.06%(2/3,504명, 22건)
드물게 (0.01~0.1%미만)	피부, 피하조직 장애	당뇨병성족부궤양	-
	근육·골격계 장애	골절, 근육통	골절
	중추 및 말초신경계 장애	어지러움, 수근관증후군, 척추관협착	-
	위장관계 장애	위천공, 장폐색, 크론병악화, 토혈	-
	간 및 담도계 질환	간경변	-
	대사 및 영양 질환	당뇨병악화	-
	심근, 심내막, 심막, 판막 질환	협심증, 관상동맥질환악화, 심근경색증	-
	혈관 질환	말초혈관질환, 뇌경색, 죽상경화증, 간혈성파행, 뇌졸중	-
	호흡기계 질환	후두염	-
	혈소판, 출혈, 응고 장애	멍	-
	비뇨기계 질환	신장액화	-
	신생물	담낭암	담낭암
	전신적 질환	가슴통증, 말초부종, 코골립	-
	투여부위 장애	연조직염	-
	방어기전 장애	폐렴, 신우신염	-
	기타 용어	수술후통증	-

또한, 인과관계와 상관없는 예상하지 못한 이상사례와 인과관계를 배제할 수 없는 예상하지 못한 약물이상반응은 발현 빈도에 따라 다음의 표에 나열하였다.

빈도	기관계명	인과관계와 상관없는 예상하지 못한 이상사례 3.11%(109/3,504명, 136건)	인과관계를 배제할 수 없는 예상하지 못한 약물이상반응 0.51%(18/3,504명, 18건)
드물게 (0.1~1%미만)	혈관 질환	말초혈관질환	-
	전신적 질환	사지통증, 다리통증	-
	피부, 피하조직 장애	당뇨병성족부궤양, 발궤양, 사마귀, 손발톱진균증, 습진, 원형발모증, 창미색전반비증, 접촉성피부염, 지루성피부염, 피부궤양, 피부부식	-
	근육·골격계 장애	골절, 전신통증, 근육경련, 근육통, 목/아깨통증, 견염, 건조염, 골다공증, 관절통, 근골격질환, 어깨관절근증후군, 유행낭염, 척추변형	골절, 근육통, 목/아깨통증
	중추 및 말초신경계 장애	말초신경병증, 보행곤란, 수근관증후군, 진전, 척추관협착	-
	시간장애	당뇨병성망막병증, 백내장, 안구이상, 안구출혈, 핵백내장	안구출혈
	청력 및 청정기관 장애	귀울림, 이통, 상세불명의귀질환	귀울림
	정신질환	불안증	불안증
	위장관계 장애	구강건조, 구강구진, 대장염, 대장암, 위식도역류, 위장염, 위장통증, 위천공, 장염, 장폐색, 치아손상, 치질, 크론병악화, 항문열창	구강건조, 위식도역류, 위장통증, 항문열창
	대사 및 영양질환	혈당증가, 당뇨병악화, 체중감소, 고요산혈증, 당뇨합병증, 비타민D결핍	체중감소
	일반적	심상기능장애, 울혈성심부전	-
	심근, 심내막, 심막, 판막 질환	협심증, 관상동맥질환악화, 심근경색증	-
	혈관 질환	뇌경색, 죽상경화증, 간혈성파행, 뇌졸중, 정맥류	-
	호흡기계 질환	가래질환, 비울혈	-
	백혈구, RES 장애	급성림프절염	-
	비뇨기계 질환	신장액화, 방광질환, 빈뇨, 소변량증가, 요실금	-
드물게 (0.01~0.1%미만)	생식기능 장애(여성)	외음부불편감	-
	신생물	담낭암, 부신암	담낭암
	전신적 질환	말초부종, 무력증, 눈꺼풀부종, 얼굴부종, 코골립	말초부종, 얼굴부종
	투여부위 장애	연조직염	-
	방어기전 장애	폐렴, 방광염, 건성인증후군, 기관지염, 매독, 발백선증, 신우신염	방광염
	기타 용어	수술후통증	-

② 국내에서 재심사를 위하여 1년여 동안 만성 동맥폐색증 환자 152명을 대상으로 실시한 시판 후 조사결과, 이상사례의 발현은 인과관계와 상관없이 2.63%(4/152명, 총 4건)로 보고되었다. 이 중 인과관계와 상관없는 중대한 이상사례와 예상하지 못한 이상사례는 보고되지 않았다. 아래에 명시된 정보는 사르포그렐레이트염산염 일반정제의 임상시험 및 시판 후 경험에서 수집된 것을 근거로 한 것이다.

