

전문 의약품

관절염·상기도염·치통 해열소염진통제

일성록소프로펜나트륨수화물 정 60밀리그램

■원료약품 및 그 분량:1정 중

-유효성분: ·록소프로펜나트륨수화물(JP)··········68.1mg(무수물)(으)로서60.0mg)

-첨가제(동률유래성분):·유당수화물(소,우유)

-기타첨가제:·경질수주구산,미결정셀룰로오스,스테아르산마그네슘,저지환도하드록시프로필셀룰로오스,전분글리콜산나트륨

■성상·외형상징제

■효능·효과

1. 다음 질환 및 증상의 소염·진통
 - 만성 류마티스관절염,골관절염(퇴행관절염),요통,견관절주위염,경견관중후군
2. 수술후, 외상후 및 발치후의 소염·진통
3. 다음 질환의 해열·진통
 - 급성 상기도염(급성기관지염을 수반한 급성 상기도염을 포함)

■양법·양량

1. 효능·효과 1,2의 경우
 - 성인: ·록소프로펜나트륨(무수물)으로서 1회 60 mg을 1일 3회 경구투여한다. 1회 요법시에는 1회 60~120 mg을 경구투여한다.
2. 효능·효과 3의 경우
 - 성인: ·록소프로펜나트륨(무수물)으로서 1회 60 mg을 경구투여한다. 원칙적으로 1일2회, 1일 최대 180 mg까지 투여할 수 있다. 궁극시에는 복용을 파하는 것이 바람직하다. 증상에 따라 적절히 증감한다.

■사용상의 주의사항

1. 경고
 - 1)매일 세잔 이상 정격으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 위장출혈이 유발될 수 있다.
 - 2)심혈관계 위험: 이 약을 포함한비스테로이드성 소염진통제는 중대한 심혈관계 혈전 반응, 심근경색증 및 뇌졸중의 위험을 증가시킬 수 있으며, 이는 치명적일 수 있다. 투여 기간에 따라 이러한 위험이 증가될 수 있다. 심혈관계 질환 또는 심혈관계 질환의 위험 인자가 있는 환자에서는 더 위험할 수도 있다.
 - 3)약사: 환자는 이러한 심혈관계 증상의 발생에 대하여 신중히 모니터링하여야 하며, 이는 심혈관계 질환의 병력이 없는 경우에도 마찬가지로 적용된다. 환자는 중대한 심혈관계 독성의 징후 및/또는 증상 및 이러한 증상이 발현되는 경우 위험 처치에 대하여 사전에 알고 있어야 한다.
 - 4)위장관계 위험: 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제는 위 또는 장관의 출혈, 궤양 및 천공을 포함한 중대한 위장관계 이상반응의 위험을 증가시킬 수 있으며, 이는 치명적일 수 있다. 이러한 이상반응은 투여 기간 동안에 경고 증상 없이 발생할 수 있다. 고형자는 중대한 위장관계 이상반응의 위험이 더 클 수 있다. 투여 기간이 길어질수록 중대한 위장관계 이상반응의 발생 가능성이 증가될 수 있으나 단기 투여시 이러한 위험이 완전히 배제되는 것은 아니다. 이 약을 투여하는 동안 위장관계 궤양 또는 출혈의 증상 및 징후에 대하여 신중히 모니터링 하여야 하며, 중증의 위장관계 이상반응이 의심되는 경우 즉시 추가적인 평가 및 치료를 실시하여야 한다. 비스테로이드성 소염진통제를 중증의 위장관계 이상반응이 완전히 배제될 때까지 투여 중단하는 것도 치료법이 될 수 있다. 고위험군의 환자에게는 비스테로이드성 소염진통제와 관련된 이는 다른 대체 치료제를 고려하여야 한다.
2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1)소화성 궤양 환자 2)중증 혈액이상 환자 3)중증 간장애 환자 4)중증 신장애 환자 5)중증 심부전 환자 6)이 약 및 이 약의 구성성분에 과민반응이 있는 환자
 - 7)아스피린이나 다른 비스테로이드성 소염진통제(COX-2 억제제 포함)에 대하여 천식, 두드러기, 알레르기 반응 등 그 병력이 있는 환자(이러한 환자에서 비스테로이드성 소염진통제 투여후 치명적인 중증의 아나필락시스모양 반응이 드물게 보고되었다). 8)간담낭액 우회로술(CABG)전후에 발생하는 통풍의 치료
 - 9)임신 말기의 환자 10)수유부 11)코헨병 또는 궤양성 대장염과 같은 염증성 장질환 환자 12)이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 1)소화성 궤양의 병력이 있는 환자
 - 2)과거 비스테로이드성 소염진통제와 장기투여로 인한 소화관 궤양이 있는 환자로서, 이 약의 장기투여가 필요하며 마소프라스를 등으로 소화성궤양 치료를 병행하고 있는 환자(마소프라스에 의한 치료에 저항성을 나타내는 소화성궤양도 있으므로 이 약을 투여하는 중 충분히 경각을 관찰한다.)
- 3)혈액 이상성 또는 그 병력이 있는 환자 4)간장애 또는 그 병력이 있는 환자 5)신장애 또는 그 병력이 있는 환자 6)체액저류 또는 심부전 환자 7)과민반응의 병력이 있는 환자 8)기관식 천식 환자 9)고형자 10)고혈압 환자 11)혈액응고장애가 있거나 항응고제를 투여하고 있는 환자 12)이뇨제 또는ACE억제제를 투여 중인 환자13)임신 초기, 중기의 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
4. 이상반응
 - 1)과민반응: 때때로 발진, 가려움, 발열 또는 드물게 두드러기 등이 나타나는 경우가 있으므로 이러한 증상이 나타난 경우에는 투여를 중지한다.
 - 2)소크,아나필락시스모양 증상이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상(두드러기, 호흡곤란, 혈압저하 등)이 확인될 경우 복용을 중지하고 적절한 처치를 한다.
 - 3)소크기계: 소화성 궤양, 천공 또는 소장, 대장으로부터 토혈, 하혈, 혈변 등의 소화관 출혈이 나타나고, 그것에 동반하여 소크가 나타나는 경우가 있으므로, 이런 증상이 나타나면 즉시 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다. 또한때때로 복통, 위부불쾌감, 식욕부진, 구역, 구토, 설사, 변비, 복부장막염, 소화불량, 소화불량, 구토, 설사, 변비, 복부팽만 등이 나타나는 경우가 있다.
 - 4)장전공이 나타나는 경우가 있으므로상복부 통증, 복통을 포함하여 특별한 증상이 발견되면, 즉시 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
 - 5)정신신경계: 때때로 졸음, 무감각, 어지러움, 드물게 두통 등이 나타나는 경우가 있다.
 - 6)혈액계: 드물게 빈혈, 용혈성빈혈, 백혈구 감소, 혈소판 감소, 때때로 호산구 증가가 나타나는 경우가 있다.
 - 7)용혈성빈증이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 이상이 발견되면 즉시 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
 - 8)간장: 간기능 장애(황달, ALT,AST,ALP,γ-GTP 상승 등),전격성 간염이 나타나는 경우가 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상반응이 나타난 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
 - 9)신장: 드물게 급성신부전, 비프로테제중후, 간질신염증이 나타나는 경우가 있으므로 이상이 발견되는 경우에는 투여를 중단하는 등 적절한 처치를 한다. 급성신부전 환자에서 고칼륨혈증이 나타날 수 있으므로 주의한다.
- 10)비뇨기계: 드물게 혈소, 단백뇨가 나타날 수 있다.
- 11)호흡기계: 드물게 발열, 해소, 호흡곤란, 흉부X선 이상, 호산구증가 등을 동반하는 간질성 폐렴이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타난 경우에는 투여를 중지하고, 부신피질호르몬제의 투여 등 적절한 처치를 한다. 천식발작 또는 급성호흡장애가 나타나는 경우가 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상반응이 나타난 경우에는 이 약의 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
- 12)피부·피부점막안주근소관(스티븐스-존슨 증후군), 독성표피파괴사용제(리절중후군), 급성 전신 파진성 농포증이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고, 이상반응이 나타난 경우에는 즉시 투여를 중지하고, 적절한 처치를 한다.
- 13)기타: 때때로 부종, 가슴통증, 불안감, 관대 또한 드물게 심해경전이 나타나는 경우가 있다.
- 14)무균성수막염(발열, 두통, 구역, 구토, 경부강직, 의식혼탁 등)이 나타나는 경우가 있으므로 관찰을 충분히 하고, 이상반응이 나타나는 경우 즉시 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다(특히 전신홍반루프스(SLE) 및 혼합혈청조작병(MCTD) 환자에서서 이상반응이 나타나기 쉽다).
- 15)국내 자발적 이상사례 보고자료(1989-2013년)를 분석한 결과, 이상사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 이상사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례는 다음과 같이 나타났다. 다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.
 - 혈전부종
 - 열근부종(는 주위부종, 구강부종)
- 16)소장 및 대장의 협착 및 폐색: 국의 시판 후 이상사례로 소장 또는 대장의 궤양과 연관되어 소장 및 대장의 협착 및 폐색이 보고된바 있다. 동 제제로 치료하는 동안 환자는 주의깊게 관찰되어야 하고, 만약 구역, 구토, 복통, 복부팽만 등의 증상이 발견되면 즉시 투여를 중지하고 적절한 처리를 한다.

17. 약약품 시판 후 이상사례 보고자료(1989-2013년)를 토대로 살펴본정보 분석·평가 결과 새로 확인된 이상사례는 다음과 같다. 다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.
 - 피부 및 피부조작제DRESS증후군
5. 일반적 주의

- 1) 이 약을 투여하기 전에 이 약 및 다른 대체 치료법의 잠재적인 위험성과 유익성을 고려해야 한다. 이 약은 각 환자의 치료 목적과 일치하도록 가능한 최단 기간동안 최소 유효용량으로 투여한다.
- 2) 소염진통제에 의한 치료는 원인이 아니며 대증요법에만 유의한다.
- 3) 만성 질환에서 이 약을 사용하는 경우에는 다음 사항을 고려한다.

- (1) 이 약을 장기간 투여하는 환자는 정기적으로 임상검사(요검사, 전혈구 검사(CBC) 및 이화학적 검사 등 혈액 검사, 간기능 검사 등)를 실시하고 이상이 있을 경우 감람, 휴약 등의 적절한 처치를 한다. 간질환 또는 신질환과 관련된 임상 증상이나 전신적인 징후에: 호산구증가증, 발진)가 발현되거나 비정상적인 간기능 검사 또는 신기능 검사 결과가 지속되거나 악화되면, 이 약의 투여를 중단해야 한다.
- (2) 약물요법 이외의 요법도 고려한다.

- 4) 급성질환에 이 약을 사용하는 경우에는 다음 사항을 고려한다.

- (1) 급성염증, 통증 및 발열 정도를 고려하여 투여한다. (2) 원칙적으로 동일 약물의 장기 투여를 피한다. (3) 원인요법이 있는 경우 그것을 행한다.

- 5) 환자의 상태를 충분히 관찰하고 이상반응의 발현에 유의한다.

- 과도한 체온하강, 하혈, 사지냉각 등이 나타나는 경우가 있으므로, 특히 고열을 수반하는 고형자 또는 소모성 질환을 합병하고 있는 환자에 대해서는 투여 후의 환자 상태에 충분한 주의를 기울인다.

- 6) 이 약의 의리학적 특성상 발열 및 염증의 다른 증상과 징후를 불현성화하여 통증성 및 비감염성 조건하에서 감염성 합병증의 진단을 지연시킬 우려가 있다. 이 약을 감염에 의한 염증에 사용하는 경우에는 적절한 항균제를 병용하여 충분히 관찰하면서 신중히 투여한다.

- 7) 위장관계 이상반응: 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제를 궤양성 질환 또는 위장관 출혈의 병력이 있는 환자에 비해 비스테로이드성 소염진통제 투여시 위장관 출혈의 발생 위험이 10배 이상 증가하였다. 위장관계 출혈을 증가시키는 다른 위험인자로는 경구용 코르티코스테로이드 또는 항응고제 병용, 비스테로이드성 소염진통제의 장기 사용 알고를 섭취, 고령, 허약한 건강상태 등이 있다. 치명적인 위장관계 이상반응에 대한 자발적 보고의 대부분은 고형자 및 허약자에 대한 것이므로, 이러한 환자에게 이 약을 투여시 특별히 주의하여야 한다.

- 8) 고혈압: 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제는 고혈압을 일으키거나, 기존의 고혈압을 악화시킬 수 있으며, 이로 인하여 고혈압에 유해사례의 발생률이 증가될 수도 있다. 타이저디제 이뇨제 또는 루프제 이뇨제를 복용중인 환자가 비스테로이드성 소염진통제 복용시 이들 요법에 대한 반응이 감소될 수 있다. 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제는 고혈압 환자에서 신중히 투여해야 한다. 이 약의 투여 초기와 투여기간 동안에 혈압을 면밀히 모니터링해야 한다.

- 9) 용혈성빈증 및 부종: 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제를 복용하는 일부 환자에서 체액 저류 및 부종이 관찰되었다. 이 약은 체액저류 또는 심부전이 있는 환자에서 신중히 투여해야 한다.

- 10) 비스테로이드성 소염진통제를 장기간 복용시 신장유독이나 기타 신장 손상이 일어날 수 있다. 또한, 신열류를 유지하는데 프로스타글란딘의 역할이 중요하므로, 심부전 환자, 심부전 환자, 간부전 환자, 이뇨제나ACE억제제를 투여 중인 환자, 고형자 등에서는 특별한 주의가 필요하다. 투약을 중단하면 대부분 치료 전 상태로 회복된다.

- 11) 진행된 신질환: 진행된 신질환 환자에서 이 약 사용에 대한 통제된 임상 시험은 실시된 바 없다. 따라서, 진행된 신질환 환자에 대해서는 이 약의 투여가 권장되지 않는다. 이 약의 투여를 계속해야 한다면, 환자의 신장 기능에 대해서 면밀히 관찰해야 한다.

- 12) 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제의 투여로 간기능 수치와 상성이 나타날 수 있다. 이러한 비정상적인 검사수치는 치료가 지속됨에 따라 악화되거나 변화가 없거나 또는 일시적일 수 있다. 또한 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제 투여로, 황달, 지령적 전격성 간염, 간괴사, 간부전(일부는 치명적임)을 포함한 중증의 간 관련 이상반응이 드물게 보고되었다. 간기능 이상을 암시하는 증상 및/또는 징후가 있는 환자는 또한 간기능 시험 결과 비정상인 환자에서 투여기간 동안 주의깊게 간기능의 악화 여부를 관찰하고, 간질환과 관련된 임상 징후가 아닌 전신적인 징후에(호산구증가증, 발진)가 발현되는 경우에는 이 약의 투여를 중지한다.

- 13) 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제의 투여로 빈혈이 나타날 수 있으므로 이 약의 장기 투여에 의해 빈혈의 증상 또는 징후가 나타나는 경우에는 헤모글로빈치 또는 헤마톤크리치 검사를 해야 한다.

- 비스테로이드성 소염진통제는 혈소판 응집을 억제하며, 일부 환자에서는 출혈 시간을 연장시키는 것이 확인되었다. 아스피린과 달리 이 약의 혈소판 기능에 대한 영향은 상대적으로 작고 지속기간이 짧으며 가역적이다. 응고관련 질환이 있거나 항응고제를 투여하고 있는 경우와 같이 혈소판 기능 병장애에 의해 부정적인 영향을 받을 수 있는 환자는 이 약 투여시 신중히 모니터링 하여야 한다.

- 14) 아나필락시스모양 반응: 다른 비스테로이드성 소염진통제와 마찬가지로 아나필락시스모양 반응은 약물에 노출된 경향이 없는 환자에서도 일어날 수 있다. 이러한 복합 증상은아스피린이나 다른 비스테로이드성 소염진통제 투여 후 비특 특립을 동반하거나 동반하지 않거나 또는 잠재적으로 치명적인 중증의 기관지 경련을 나타내는 천식 환자에게 전형적으로 발생한다. 이러한 아나필락시스모양 반응이 나타나는 경우 응급처치를 실시하여야 한다.

- 15) 피부반응: 이 약은 발진,피부염, 피부점막안주근(스티븐스-존슨 증후군) 및 독성표피파괴사용제(리절중후군) 같은 중대한 피부 이상반응을 일으킬 수 있으며, 이는 치명적일 수 있다. 이들 중대한 이상반응은 경고 증상 없이 발생할 수 있다. 대부분의 경우 이러한 이상반응은 투여 초기 1개월 이내에 발생한다. 환자는 중대한 피부 발현 증상 및 증후에 대해 알고 있어야 하며 피부 발진 또는 다른 과민반응의 최초 증상 및 징후가 나타날 때 약물 투여를 중단해야 한다.

- 16) 천식 환자 중 일부는 아스피린에 민감하게 반응할 수 있다. 아스피린 민감성 천식 환자에서 사용하는 경우 치명적일 수 있는 중증의 기관지경련과 관련될 수 있다. 이러한 아스피린 민감성 환자에서 아스피린과 다른 비스테로이드성 소염진통제 간의 기관지경련을 포화하는 교차반응이 보고되었다. 그러므로 이 약은 이러한 아스피린 민감성 환자에게는 투여하지 않도록 하며, 천식 환자에게는 주의깊게 사용되어야 한다.

- 17) 이 약은 코르티코이드 제제를 대체하거나 코르티코이드 결핍증을 치료하기 위한 약물로 사용될 수 없다. 코르티코스테로이드의 갑작스러운 투여 중단은 코르티코스테로이드·반응성 질환의 악화를 초래할 수 있다. 장기간 코르티코스테로이드를 복용해 온 환자에게 이 약을 투여하고자 할 경우에는 서서히 용량을 감소시켜야 한다.

- 18) 비스테로이드성 소염진통제를 장기간 복용하는 여성에서 임신적인 불임이 보고되었다.

- 19) 전신홍반루프스(SLE) 및 혼합혈청조작병(MCTD) 환자가 이 약을 복용시 무균수막염에 걸릴 위험성이 증가할 수 있다.

6. 상호작용

- 1) 다른 비스테로이드성 소염진통제와 병용투여할 경우 이상반응의 위험이 증가할 수 있으므로 병용투여하지 않는다.
- 2) 다음 약약품의 작용을 증가시킬 수 있으므로, 복용시에는 동 약약품을 감람하는 등 신중히 투여한다.: 설포닐라제에 혈당강화제(클로부타미드 등), 뉴퀴놀론계 항생제(에녹산신 등)
- 3) ACE억제제 및 안지오텐신 II 수용체 길항제: 비스테로이드성 소염진통제에 의해 ACE 억제제의 항고혈압효과가 감소될 수 있으므로 이 약과ACE 억제제 및 안지오텐신 II 수용체 길항제를 병용투여하는 경우 이러한 상호작용을 염두에 두어야 한다.
- 4) 아스피린: 아스피린과의 병용이 비스테로이드성 소염진통제의 사용과 관련된 중대한 심혈관계 혈전반응의 위험을 감소시킬 수 있다는 일관된 증거는 없다. 다른 비스테로이드성 소염진통제와 마찬가지로 이 약과 아스피린의 병용에 의해 중증의 위장관계 이상반응의 발생 위험이 증가될 수 있으므로 두 약물의 병용은 일반적으로 권장되지 않는다.
- 5) 이뇨제: 임상시험 및 시판후 조사 결과 이 약의 신장에서의 프로스타글란딘 합성 억제에 의해 일부 환자에서 루프미데 및 타이저디제 이뇨제의 나트륨노배설 효과가 감소할 수 있음이 확인되었다. 이들 약물과 비스테로이드성 소염진통제를 병용투여하는 동안 신부전 징후를 면밀히 관찰해야 한다.
- 6) 리튬: 비스테로이드성 소염진통제는 신장에서의 프로스타글란딘 합성 억제에 의해 혈청 리튬의 농도를 증가시키고 리튬의 신장소출을 감소시킬 수 있다. 따라서 비스테로이드성 소염진통제와 리튬의 병용 무리 무리 리튬의 농도를 증가될 수 있으므로 리튬의 용량을 감람하고 독성 징후를 주의깊게 관찰하는 등 신중히 투여한다.
- 7) 메토크세이트: 비스테로이드성 소염진통제와의 병용투여로 신노배관에서 메토크세이트의 배설이 지연되어 치명적인 메토크세이트의 혈액학적 독성이 증가될 수 있으므로 함양요법으로 사용하는 고용량(15 mg/수) 이상의 메토크세이트와는 병용투여하지 않으며, 저용량의 메토크세이트와 병용투여시 신중히 투여하여야 한다.
- 8) 쿠마린계 항응고제(와르파린 등): 위장관계 출혈에 대하여 와르파린과 비스테로이드성 소염진통제는 상충작용을 나타날 수 있으므로 두 약물을 함께 사용하는 환자는 단적으로 투여하는 경우에 대해 중증의 위장관계 출혈의 위험이 높아질 수 있다.
- 9) 시클로스포린 및 타크로리무스: 비스테로이드성 소염진통제과 병용하는 경우 시클로스포린, 타크로리무스의 신독성이 증가할 수 있다.
- 10) 항혈소판제 및 선택적 세로토닌 재흡수 억제제(SSRI): 이 약과 병용 시 위장관 출혈의 위험이 증가될 수 있다.
- 11) 코르티코스테로이드: 이 약과 병용 시 위장관 궤양 또는 출혈의 위험이 증가될 수 있다.

7. 임부 및 수유부에 대한 투여
- 1) 컷트에 대한 실험에서 비스테로이드성 소염진통제는 프로스타글란딘 합성을 저해하는 다른 약물과 마찬가지로 난산의 발생 빈도를 증가시키고, 분만을 지연시키며 태아의 생존율을 감소시킨다.
- 2) 이 약을 임부에게 투여한 임상자료는 없다. 다른 비스테로이드성 소염진통제와 마찬가지로 임신 말기에 이 약을 투여 시 태아의 동맥관을 조기 폐쇄시킬 수 있다. 임신 말기의 임부에게 투여하지 않는다.
- 3) 임신중증의 투여에 관한 안전성이 확립되지 않았으므로 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에게는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
- 4) 동물실험에서 유생분비가 보고되었으므로 수유 중에는 이 약을 투여하지 말아야 한다.
8. 소아에 대한 투여
- 1) 소아에 대한 안전성이 확립되지 않았다.
9. 고형자에 대한 투여
- 1) 다른 비스테로이드성 소염진통제와 마찬가지로 고형자에게 이 약을 투여시 주의한다.
10. 보관 및 취급상의 주의사항
- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 다른 용기에 바꿔 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질저하 면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.

■포장양자: 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

■지장방명: 30정/병, 600정/병

■제조국(지/원/제): 일성신약(주), 경기도 안산시 단원구 신안로 349 (B동제약, D동일반제약)

■제조자: (주)비제약, 경기도 시흥시 공단1로27번길 27

- ※ 의약품의 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽으시고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- ※ 처방된 증상, 처방된 환자 이외에는 사용하지 마십시오.
- ※ 첨부문서에 기재되어 있지 않은 부작용이 나타날 경우, 의사나 약사 또는 식품의약품안전처에 알리십시오.
- ※ 사용(유효)기한이 경과한 의약품은 사용하지 마십시오.
- ※ 본 의약품은 KGMP(의약품 제조 및 품질관리기준)에 의하여 엄격한 관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질·변해·오염되거나 손상된 의약품이 발견된 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 이 첨부문서 최종 개정 연월일 이후 변경된 내용은 www.isung-ph.co.kr 이나 소비자 상담실 02-3271-8800을 통해 확인할 수 있습니다.
- ※ 의약품 사용 후 부작용 발생 시 한국의약품안전관리원(4-3330,1644-6223)에 의약품 부작용 신고 및 피해구제 상담을 할 수 있습니다.