

일반의약품 정보

【유효성분】 1정 중

- 판크레아틴(USP) 175mg (전분당화력 250단위 이상, 단백소화력 1500단위이상, 지방소화력 100단위이상)
- 셀룰라제(KP) 50mg(섬유소당화력 13단위이상)
- 우담즙 건조엑스(생규) 25mg
- 디메티콘(NF) 25mg
- 동물유래성분 : 판크레아틴(돼지, 이자(췌장)), 우담즙건조엑시스, 알계)

【성 상】 장방형의 장용피를 한 연녹색의 필름코팅정

【효능·효과】 소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 체함, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감

【용법·용량】 만 15세 이상 및 성인 : 1회 2정 1일 3회 식후 복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 말 것.
 - 1) 만 7세 이하의 어린이
 - 2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
 - 3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
 - 4) 콩 또는 병균에 과민증이 있는 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 1) 고지단백혈증, 당뇨병성지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람
 - 2) 다른 약물을 복용하고 있는 사람
4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것. 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우
5. 기타 이 약의 복용(사용)시 주의할 사항
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것
 - 2) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 할당지침자를 점검할 것을 권장함. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절함. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.
6. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것
 - 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

【제조외곽지】 (주)바스킨바이오제약 / 경기도 안성시 원곡면 원당로 354

【제조자】 정우신약(주) / 충청남도 아산시 신창면 서부남로790번길 60

※ 의약품 부작용 신고 및 피해구제 신청 : 한국약물안전관리원(1644-6223, 14-3330)

※ 소비자상담전화 : 031-692-2900

※ 의약품통합정보시스템(nedrug.mfds.go.kr) 참조



(01)08806562050710

LD51020-0

제조번호 :
사용기한 :

4가지 복합성분 소화제

소와엔 정

빠르고 편하게 소화문제 해결



소화불량 / 복부팽만 / 과식 / 체함



10정

일반의약품 정보 (계속됨)

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【첨가제】

- 첨가제(타르색소) : 황색203호, 청색1호
- 첨가제(동물유래성분) : 유당(젖당)수화물(소, 우유)

- 기타 첨가제 : 메타규산일루민산마그네슘, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 미결정셀룰로오스, 아산화규소, 전호화전분, 전분글리콜산나트륨, 스테아르산마그네슘, 탈설드환색(19W623), 탈설드녹색(39G1628)

【사용기한】 (연, 월, 일) 케이스 측면 표시일까지

4가지 복합성분 소화제
소와엔 정