

의약품 복용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고 첨부문서를 의약품과 함께 보관하여 주십시오.

에드윈정

일반 의약품
분류번호:312

어깨결림·요통 근육통·관절통 눈의 피로 증상의 완화

■ 원료약품 및 분량 이 약 1정 중

유효성분 :
비스벤티아민(별규) 33.33mg(티아민염산염으로서 29.16mg)
피리독신염산염(KP) 33.33mg
니코틴산아미드(KP) 20.00mg
토코페롤속시나이트칼슘(KP) 34.53mg(호박산ol- α -토코페롤로서 33.33mg)
시아노코발라민(KP) 500 μ g
첨가제(타르색소) : 황색203호
동물유래성분 : 유당수화물(소, 우유), 젤라틴(소, 파루)
기타첨가제 : 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 미결정셀룰로오스, 톨크, 경질무수구산, 히드록시프로필셀룰로오스, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 스테아르산마그네슘, 아라비아고무, 백당, 콜로이드성아산화규소, 산화티탄, 침강탄산칼슘, 폴리에틸렌글리콜6000, 리보플라빈

■ 성상 노랑색의 원형 당의정

■ 효능효과

- 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림, 오십견 등), 손발의 저림, 눈의 피로
- 다음 경우의 비타민 B₁, B₆, B₁₂의 보급 : 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후의 체력저하

■ 용법·용량 1일 1회 복용하십시오.

- 15세 이상 어린이 및 성인 : 1회 2~3정
- 11~14세 어린이 : 1회 1~2정
- 5~10세 어린이 : 1회 1정을 1일 1회 복용한다

■ 사용상의 주의사항

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에의 과민반응 환자
 - 2) 5세 미만의 어린이
 - 3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
레보도파
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 임부·수유부
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 1) 발진·발적, 가려움
 - 2) 구역·구토, 위부불쾌감, 식욕부진, 복부팽만감
 - 3) 묽은 변, 설사, 변비와 같은 증상이 지속되거나 심해질 경우
 - 4) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.
 - 5) 에스트로겐을 포함한 경우용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.
 - 6) 피리독신을 1일 50 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병증(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
 - 7) 임신이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 μ g 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
 - 8) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력장애), 고요산혈증(hyperuricemia : 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
- 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
 - 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독 하에 투여할 것.
 - 3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없거나 악화될 경우에는 의사 또는 약사와 상의하여 복용할 것.
 - 4) 이 약을 물 묻은 손으로 만지지 말 것. 물 묻은 손으로 만질 경우 당의가 변색할 수 있다.
 - 5) 병 중의 패킹은 수송 중에 정제의 파손을 방지하기 위해 것이므로 개봉 후에는 필요 없으므로 버릴 것.
 - 6) 사용기한이 경과된 제품은 복용하지 말 것.
- 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관할 것.
 - 3) 오·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것.

■ 저장방법 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

■ 사용기간 제조일로부터 36개월

■ 포장단위 30정/피티피[(10정/PTP)x3], 180정/피티피[(10정/PTP)x9x2], 90정/병

- ※ 본 의약품은 KGMP업소에서 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시, 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 파손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 의약품통합정보시스템(www.nedrugs.go.kr)을 참조하시기 바랍니다.
- ※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국 의약품안전관리원(1644-6223)

ADOT 2019.07.03 (1-190703)