



소화성 궤양용제

위투정

(라니티딘염산염 / 비스무트시트르산염칼륨 / 수크랄페이트수화물)

전문의약품

■ 원료약품 및 그 분량 : 이 약 1정 중

유효성분 : 라니티딘염산염(USP) 84mg 라니티딘(이로서 75mg)
비스무트시트르산염(KP) 100mg 산화비스무트로서 40.50mg, 갈륨으로서 12.00mg
수크랄페이트수화물(USP) 300mg 자당옥타황산에스테르로서 102mg
첨가제 : 메타크산알루미늄산화물, 미결정셀룰로오스, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 코코비돈, 크로스카멜로스나트륨, 크로스카메비돈, 셀룰로오스, 폴리비닐피롤리돈, 히드록시프로필셀룰로오스, 히드록시프로필셀룰로오스, 크로스카메비돈, 셀룰로오스, 폴리비닐피롤리돈, 히드록시프로필셀룰로오스, 히드록시프로필셀룰로오스

■ 성상 : 원형의 흰색 필름코팅정제

■ 효능·효과 : 위·십이지장궤양, 위염, 출혈성-염기성증후군, 역류성식도염, 마취전 투약(벤딤온증후군 예방), 수술후 궤양, 비스테로이드소염진통제(NSAID)로 인한 위·십이지장궤양

■ 용법·용량

○ 성인

- 보통 식사와 무관하게 1회 2정을 1일 2회 오전 및 취침전에 경구투여한다.
- 위·십이지장궤양
 - 1회 2정을 1일 2회 투여하거나 1회 4정을 1일 1회 취침전에 투여한다. 특히 십이지장궤양환자에 대해서는 1회 4정 1일 2회 오전 및 취침전에 투여하면 보다 높은 치료율을 얻을 수 있다. 비스테로이드소염진통제 투여로 인한 궤양 또는 비스테로이드소염진통제 장기 투여시 위·십이지장궤양발생을 예방하기 위한 병용요법에 있어서도 용량은 같다. 보통은 4주 이내 비스테로이드소염진통제 투여로 인한 질환은 보통 8주 이내에 치유되나 간혹 환자에 따라 치유기간이 연장될 수도 있다. 이 약의 단기요법으로 효과가 우수하지만 재발성 궤양환자에게 대해서는 유지요법으로 1회 2정을 1일 1회 취침전에 투여한다.
- 역류성식도염
 - 8주 동안 1회 2정, 1일 2회 투여하거나 1회 4정을 1일 1회 취침전에 투여한다. 단 중증 역류성식도염 환자에 대해서는 1회 4정을 1일 4회로 증량할 수 있다.
- 출혈성-염기성 증후군
 - 초기용량으로서 1회 2정을 1일 3회로 치료를 시작하며 필요에 따라 증량할 수 있다. 중증질환의 경우 의사의 지시에 따라 1일 라니티딘으로서 6g까지 투여할 수 있다.
- 소화성 궤양, 급성 스트레스성 궤양 및 급성 위장관 병변에 의한 상부소화관 출혈
 - 경구 투여가 가능해지면 주사에서 경구투여로 전환하여 1회 2정을 1일 2회 투여한다.
- 마취전 투약(벤딤온증후군 예방)
 - 마취후도 2시간 전에 1회 2정을 투여한다. 이 경우 수술전에도 1회 2정을 투여하면 더욱 좋다.

■ 사용상의 주의사항

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 투여요법을 받고 있는 환자
 - 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응의 병력이 있는 환자
 - 급성 포르피린증 병력이 있는 환자
(라니티딘염산염이 급성 포르피린증 발작을 유발할 수 있음을 시사하는 임상 보고가 드물게 있다)
 - 신장에 환자
 - 상부 위장관 수술 환자
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
 - 마취, 산생이
 - 칼륨 제한식이요법 환자
- 다음의 경우에는 신중히 투여할 것.
 - 신장에 환자
 - 약물 과민반응의 병력이 있는 환자
 - 고령자
 - 신장에 병력이 있는 환자
 - 비스테로이드소염진통제를 병용 투여하고 있는 환자/특히 고령자 및 소화궤양의 병력이 있는 환자에서 이 약과 병용 투여할 경우 주기적인 관찰이 필요하다)
 - 이 약은 위암 증상을 은폐할 수 있으므로 특히, 위궤양 환자, 새롭거나 최근 변화된 소화불량증상을 보이는 중년 이상의 환자는 치료전에 악성인 아닌 것을 확인한 후 투여한다.
 - 엘리코박터 파일로리 양성인 위·십이지장궤양 환자 : 세균제거를 위한 노력이 필요하다.
 - 중증의 중환자실 환자(수크랄페이트 투여 후 위장의 상상이 보고되었다)
 - 저인산혈증 환자(수크랄페이트의 알루미늄은 소화관 내에서 인산염과 결합하여 흡수를 저해한다)
 - 삼킴곤란 환자(수크랄페이트 투여 후 후흡기 합병증이 보고되었다)
- 이상반응
 - 이상반응 발현 빈도는 다음과 같이 분류된다. 매우 흔하게 (≥ 1/10), 흔하게 (≥ 1/100, < 1/10), 흔하지 않게 (≥ 1/1,000, < 1/100), 드물게 (≥ 1/10,000, < 1/1,000), 매우 드물게 (< 1/10,000)
 - 소아 : 매우 드물게 아나필락시스 쇼크가 나타날 수 있으므로 이 약을 투여중인 환자는 주의 깊게 관찰하고 만약 이러한 증상이 나타난 경우 투약을 중지하고 적절한 조치를 하여야 한다. 이들 반응은 단회 투여 후에 보고되었다.
 - 과민반응 : 드물게 피부발진, 두드러기, 혈관신경부종, 발열, 기관지경련, 저혈압, 혼동 등의 과민반응, 혈관부종 등의 증상이 나타날 수 있다. 이러한 증상이 나타나 경우에는 투약을 중지한다. 이들 반응은 단회 투여 후에 보고되었다.
 - 혈액계 : 몇몇 환자에서 과당알코올증이 보고된 바 있으나 가역적이며 매우 드물게 가역적인 백혈구 감소, 혈소판 감소가 나타날 수 있고 혈장 요소치 상승(혈청 크레아티닌, 혈청 이미노전달효소)이 나타날 수 있다. 드물게 무과립구증, 범혈구감소증이 보고되었고 범혈구감소증이 나타난 환자에서 가끔 골수형성저하증 또는 골수형성성, 재생불량성 빈혈이 함께 보고되었다. 매우 드물게 후천성 면역결핍증상이 나타날 수 있으므로 이상이 인정되는 경우에는 투약을 중지한다. 흔하지 않게 호산구 증가가 나타날 수 있다. 초기증상으로 전신관대감, 무력, 피로, 삼킴장애, 열감, 발열 등이 나타나면 혈액검사를 실시하여 이상이 인정되는 경우에는 즉시 투약을 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
 - 간장 : 드물게 일시적이고 가역적인 AST, ALT, γ-GTP, ALP의 상승이 나타날 수 있고 매우 드물게 가역적인 황달성 또는 비합당성 간염(간세포성, 간소관성 또는 혼합형 등) 간기능장애가 나타날 수 있다. 이러한 증상이 나타날 경우에는 즉시 투약을 중지한다.
 - 순환기계 : 다른 H₂ 수용체 길항제와 마찬가지로, 매우 드물게 빈맥, 서맥, 방실실전, 초기심실수축과 같은 부정맥이 보고되었다. 매우 드물게 혈관염이 보고되었다.
 - 소화기계 : 흔하지 않게 구역, 구토, 변비, 설사, 복부팽만감, 복통, 드물게 식욕부진의 증상이 나타날 수 있다. 대변색이 변색 또는 검은색으로 되나 이는 장에서 비스무트시트르산염이 형성에 기인하는 것으로 별도로 치료할 필요가 없다.
 - 정신신경계 : 매우 드물게 어지럼, 졸림, 기억력의 저하, 강박, 흥분, 불면, 두통(때때로 중증), 두통감, 병감, 불면, 추로 증후 및 고령자에게 가역적 정신운동, 우울증 및 환각 등의 증상이 나타날 수 있다. 매우 드물게 조절불능으로 추정되는 가역적인 혼란 시기와 불수의 운동장애가 보고된 바 있다. 의식장애, 경련(간접성 등), 간대사 조절장애가 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 이상이 인정되는 경우에는 투약을 중지하거나 적절한 처치를 한다. 특히 신경계 장애를 지니고 있는 환자에서 쉽게 나타날 수 있으므로 주의한다.
 - 내분비계 : 매우 드물게 여성형유방 및 유종증비교와 같은 유방관련 증상 및 상대, 가역적인 발기부전 및 성욕감퇴 등이 보고된 바 있으나, 이 약과의 인과관계는 확립되지 않았다.
 - 근골격계 : 매우 드물게 관절통 및 근육통이 나타날 수 있다. 근육통, 무력감, 크레아틴키나아제(CK) 상승, 혈중 및 요중 미오글로빈의 상승을 특징으로 하는 근육병증(근종)이 나타날 수 있으므로 이상이 인정되는 경우에는 투약을 중지한다.
 - 피부 : 드물게 피부발진, 매우 드물게 경미한 다형홍반 및 탈모증이 보고된 바 있다.
 - 기타 : 드물게 결막, 흔하지 않게 피부가려움증이 나타날 수 있다. 간혹 허가 검게 되기도 하나 저절로 정상화된다. 기타 H₂ 수용체 길항제에서 피부점막(안주관)에 나타날 수 있는 증후군, 독성피부괴사증후군(중증), 재생불량성빈혈, 발열, 체단 등의 심한 경우, 매우 드물게 급성 간질성 신염이 나타났다는 보고가 있다.

4. 일반적 주의

- 장기간투여를 하지 않는다.
- 치료시 경과를 충분히 관찰하고 증상이 상승하여 치료상의 최소량을 사용하도록 하고 이 약의 효과가 없는 경우에는 다른 약물을 교체한다. 또한 혈액산, 간기능, 신기능 등에 주의한다.
- 고령자, 만성 폐질환, 당뇨병, 면역이 약화된 환자에서 유효성 폐렴의 발병 위험도가 증가할 수 있다. 대규모 역학 연구에서 H₂ 수용체 길항제를 복용하는 환자는 치료를 중단한 환자보다 유효성 폐렴 발병의 상대 위험도가 1.03 이었다(95 % CI, 1.07 ~ 2.48).
- 이 약을 투여하고 어지럼이나 졸음의 경험에 있는 환자는 운전이나 위험한 기계의 조작을 피한다.

5. 상호작용

- 라니티딘은 다른 약물의 흡수, 대사 또는 신배설에 영향을 줄 수 있다. 이러한 약동학적 변화로 영향 받는 약물의 용량 조절 또는 투여 중지가 필요할 수 있다. 상호작용은 다음과 같은 몇몇 기전에 의해 발생된다.
 - CYP-450과 관련된 복합기능속시제나제에 의해 일관적 치료 용량에서, 라니티딘은 이 효소계에 의해 비활성화 되는 약물(예, 디아제팜, 리도카인, 페니토인, 프로프라놀롤, 테오필린)의 작용을 증가시키지 않는다. 쿠마린 항응고제(예, 와르파린)와 병용투여 시 프로트롬빈 시간의 변화가 보고된 바 있다. 쿠마린 항응고제의 치료 지수가 좁기 때문에, 라니티딘과의 병용투여 기간에는 프로트롬빈 시간의 증가 또는 감소를 면밀하게 모니터링한다.
 - 신체요관 분비 경쟁 : 라니티딘은 일부 양이온계로 제거되기 때문에, 동일 경로로 제거되는 다른 약물의 청소율에 영향을 줄 수 있다. 라니티딘 고용량(예, 플랑카-글리신 증후군 치료 시)은 프로카인아미드 및 N-아세틸프로카인아미드의 배설을 감소시켜 이들 약물의 혈장 농도를 증가시킬 수 있다.
 - pH의 변화 : 어떤 약물의 생체이용률이 영향을 줄 수 있으며, 이는 흡수 증가(예, 트리아졸람, 미다졸람, 글리 피지드) 또는 흡수 감소(예, 케토코나졸, 아티자나비어, 델라버르딘, 케피타나비르)를 유발할 수 있다.
 - 라니티딘이 아목시실린, 메트로니다졸과 상호작용을 일으킨다는 증거는 없다.
 - 수크랄페이트는 뉴퀴놀론계 항균제 시프로플록사신염산염, 노르플록사신 등), 디곡신, 페니토인, 테트라사이클린, 테오 필린 등과 동시에 복용함으로써 병용약제의 흡수를 저해할 수 있으므로 병용약제 투여후 가급적 2시간 이상 시간간격을 두고 투여한다.
 - 비스무트시트르산염칼륨은 체산제에 의해 효과가 감소될 수 있으므로 이 약 투여 전후 30분 동안에는 체산제를 투여하지 않는다.
- 임부 및 수유부에 대한 투여
 - 임신중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신 가능성이 있는 여성에는 투여하지 않는다.
 - 모유중으로 이 약으로 수유부에는 투여하지 않는다.
- 소아에 대한 투여
 - 소아에 대한 안전성과 유효성이 확립되어 있지 않으므로 투여하지 않는 것이 바람직하다.
- 임상검사치에 대한 영향
 - 임상검사에 의한 오진(백검사에서 거짓양성)이 나타날 수 있으므로 실험실실선으로 실험하는 것이 바람직하다.
- 과량투여시의 조치
 - 외국에서 1일 6g(라니티딘으로서)까지 과량투여 보고가 있었으나 특히 중대한 영향은 나타나지 않았다. 이러한 경우에는 최초, 위세척을 행함과 동시에 적절한 치료를 행한다. 필요하면 혈액투석에 의하여 제거해도 좋다.
- 기타
 - 라니티딘의 투여로 인해 위산의 분비가 줄고 위장 내 세균 증식이 촉진될 수 있다.
 - 동물의 흡수 배설시험에서 안구과다량과 친화성이 있다는 보고가 있으므로 장기투여시 안과적 검사를 행하는 등 주의하여 투여한다.

■ 저장방법 : 밀폐용기, 실온보관(1~30℃)

■ 포장단위 : 30정/병, 300정 병

- ※ 이 첨부서 작성일자 2019년 7월 1일 이후 변경된 내용은 온라인의약품서면(<http://drug.mfds.go.kr>) 또는 **동광홈페이지** : www.dkphm.com에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 제품 사용 후 부작용이 발생한 경우 **한국약물안전관리센터**(☎1644-6223)에 부작용 피해 구제신청을 할 수 있습니다.
- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 통한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한 또는 유효기간이 경과하였거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

BK101719

제조의회사 : **동광제약주식회사**

경기도 평택시 산단로 115
● 수신처부담 소비자 상담실 : 080-776-1472

제 조 자 : **대웅제약**

충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 1

KGMP 본 제품은 오송의약품
제조관리기준에 적합
하게 제조되었습니다.