

※ 의약품 복용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 보관하여 주십시오.



일반의약품
기타의 소화기관용약

메부란정

(트리메부틴말레산염)

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

- 유효성분: 트리메부틴말레산염(KP)..... 150mg
- 첨가제(동물유래성분): 유당수화물(소-우유)
- 기타첨가제: 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 콜로이드성이산화규소, 크로스카멜로오스나트륨, 톨크, 히드록시프로필셀룰로오스

【성상】 흰색의 원형 정제

【효능·효과】

1. 주요효 효과
 - 1) 식도역류 및 열공헤르니아, 위 십이지장염, 위 십이지장궤양에 있어서의 소화기능이상 (복통, 소화불량, 구역, 구토)
 - 2) 과민성대장증후군 및 경련성 결장
 - 3) 소아 질환 : 습관성 구토, 비감염성 장관통과장애 (변비, 설사)

【용법·용량】

성인 : 말레인산트리메부틴으로서 1회 100-200mg 1일 3회 식전에 경구투여한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 부작용
 - 1) 소화기계 : 드물게 변비, 설사, 복명, 구역, 구토, 소화장애, 구갈, 구내마비감 등이 나타날 수 있다.
 - 2) 순환기계 : 드물게 심계항진이 나타날 수 있다.
 - 3) 정신신경계 : 드물게 피로감, 졸음, 현기, 권태감, 두통등이 나타날 수 있다.
 - 4) 간장 : 드물게 GOT, GPT상승이 나타날 수 있다.
 - 5) 과민증 : 드물게 발진등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.
3. 임부에 대한 투여
임신중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
4. 수유부에 대한 투여
수유중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 수유중인 부인에는 투여를 피하고 부득이 투여하는 수유를 중지한다.

【제조사】 엔비케이제약(주) 충남 천안시 동남구 풍세면 풍세로 539

【판매자】 유니메드제약(주) 서울특별시 송파구 삼전로 69 (잠실동) 유니메드빌딩

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1-30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 36 개월

【포장단위】 30정/병, 500정/병

【소비자상담번호】 080-957-7190

※ 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템 (<https://nedrug.mfds.go.kr>)을 통해 확인할 수 있습니다.
본 제품이 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.
※ 부작용 보고 및 피해구제 신청: 한국 의약품안전관리원 (1644-6223, 14-3330)
※ 첨부문서 작성일자 : 2024년 02월 27일

제조사



엔비케이제약(주)
NEO BIO KOREA PHARM. CO., LTD.

판매자



유니메드제약

서울특별시 송파구 삼전로 69 (잠실동) 유니메드빌딩