

L-Carec Tab. (L-Carnitine)

OTC

일반의약품 정보		【사용상의 주의사항】
【유효성분】 1정 중		1. 다음 환자에는 투여하지 말 것. 이 약에 과민증 환자
■ 엘카르니틴(BP) 330 mg		2. 부작용
【성상】		- 일시적인 구역 구토, 복통(배앓음) 일시 체위가 나타날 수 있다.
흰색의 원형 필름코팅정		- 이 약을 복용한 환자에서 발진 두드러기 안면부종이 보고되었다.
【효능·효과】		- 이 약을 복용한 요독증 환자에서 경증의 근육경련(근육무력증)이 보고되었다.
1. 1차성 2차성 카르니틴결핍증		3. 임부 및 수유부에 대한 투여
2. 허혈성심질환에 의한 심근대사장애 협심증 급성심근경색		1) 임신 중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회할듯 못하다/한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
【용법·용량】		2) 모유의 이행은 알려져 바 없으나 많은 약물이 모유로 이행되므로 수유 중에는 신중히 투여한다.
성인	엘-카르니틴으로서 1일 2~3 g을 2~3회 분할 경구투여한다.(먹는다. 복용한다.)	【저장방법】
■ 연령 증상에 따라 적절히 증감한다.		■ 기밀봉기, 실온(1~30℃)보존하세요.
		■ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요.

일반의약품

엘카렉 정 (엘카르니틴)

※ 본 제품은 인습성이 강화된 PTP상태로
조제·보관하여 주시기 바랍니다.

90정

일반의약품 정보 (계속됨)		※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 지났거나 변질, 변색, 오염되거나 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
【사용기한】 (연월일) 공기 하단 표시일까지		※ 사용(유효)기한이 지난 의약품을 사용하지 않도록 합니다.
【첨가제】		※ 부작용 보고 한국약품안전관리원 1644-6223
■ 기타 첨가제 : 마갈링셀룰로오스 카르복시메틸셀룰로오스칼슘 포비돈 경질무수구산 스테아르산마그네슘, 오파드라미(AMPH) 화이트(88-A180040), 히프록셀로오스, 폴리메틸렌글리콜6000, 산화티탄		※ 소비자상담전화 : 031-692-2900
【제조사】 (주)레고켐제약		※ 작성일자 이후 변경된 내용은 의약품통합정보시스템(redug.mhls.go.kr)에서 확인할 수 있습니다.
경기도 안성시 천곡면 천당로 35A		※ 작성일자 : 2019. 12. 17(Rev.0)

