

비만·부중에

일반의약품

# 아너핏정 (방기황기탕건조엑스)

[이 문서는 이 약을 사용할 시에 필요한 주의사항을 기재한 것으로 이 약과 같이 보관하십시오.]

## [원료약품 및 그 분량] 1정 중

· 유효성분 : 방기(KP)----- 418mg, 황기(KP)----- 418mg, 백출(KP)----- 250mg,  
생강(생규)----- 250mg, 대추(KP)----- 333mg, 감초(KP)----- 168mg  
(건조엑스로서 244mg)

· 첨가제(타르색소) : 황색1호, 황색4호  
· 기타 첨가제 : 경질무수구연산, 미결정셀룰로오스, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 크로스보인드, 폴리에틸렌글리콜6000, 히드록시프로필셀룰로오스, 히프로멜로오스

[성 성] 녹색의 원형 필름코팅정제

## [효능·효과]

살색이 희고, 피로하기 쉬우며, 땀이 잘 나는 감열이 있는 다음 증상 : 비만(근육에 긴장감이 없고 물살짐), 관절통, 부종

## [용법·용량]

보통 성인 1회 4정을 1일 3회 식전 또는 식간에 복용한다.

## [사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.

- 1) 고혈압 환자
- 2) 심장병 또는 신장에 환자
- 3) 부종 환자
- 4) 지금까지 약에 의해 발진·발적증현되어 불어짐, 가려움 등을 일으킨 적이 있는 환자
- 5) 의사의 치료를 받고 있는 현재다른 약물을 투여 받고 있는 환자
- 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성(임신중 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여할 것.)
- 7) 어린이(어린이에 대한 안전성이 확립되어 있지 않대사용경험이 적다.)
- 8) 고령자(일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감람하는 등 주의할 것.)
- 9) 이 약은 황색4호(타르트라진, Tartrazine)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

2. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 상응시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우  
(1) 위장도스태론증 : 요양이 감소하거나 열과와 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 할압이 높아지거나 두통 등(1일 최대 복용량이 감초로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨혈증, 할압상승, 나트륨 체액의 지류, 부종, 체중 증가 등의 위장도스태론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.)  
(2) 근병증 : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.  
(3) 피부 : 발진·발적(중합되어 불어짐), 가려움 등  
(4) 소화기계 : 식욕부진, 위부불쾌감  
(5) 간질성 폐렴 : 발열, 기침, 숨찬 호흡곤란, 폐음(생·염방음, 捻發音) 등이 나타난 경우에는 이 약의 복용을 중지하고, 신속히 흉부X선 등의 검사를 실시함과 동시에 부신 피질호르몬제 투여 등 적절한 처치를 받을 것.  
(6) 간기능장애 : 황당 : AST, ALT, ALP,  $\gamma$ -GTP 등의 상승을 동반한 간기능장애, 전신의 나른한, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띠게 됨)이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 이상이 확인된 경우 복용을 중지할 것.
- 2) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

3. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 장기간 계속하여 복용하지 않는 것이 원칙이나 부득이 장기간 계속하여 복용할 경우에는 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것(감초를 함유하는 제제를 장기간 복용할 경우 혈청칼륨치나 혈압측정 등을 충분히 하고, 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.)

- 3) 칼륨함유제제, 칼슘함유제제, 글리시리신산 또는 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제로세미드, 에타크린산) 또는 티아지드계 이뇨제(트리클로르메타이드)와 병용시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용할 것.
- 4) 다른 한약제제 등과 함께 복용할 경우에는 함유 성약의 중복에 주의할 것.

## 4. 저장상의 주의사항

- 1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것(사용 후 반드시 밀봉 보관할 것.)
- 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 3) 의약품용 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

[포장단위] 360정/병

[제조자] ㈜아이월드제약 / 인천광역시 남동구 함박외로 316 17B-2L

[제조회자] 코스맥스파마㈜ / 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 169-23

※ 본 제품은 “우수약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)”에 따라 제조 및 품질검사를 한 의약품입니다. 만약 구입한 사용기한이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입처를 통하여 교환해 드립니다.  
※ 자세한 의약품정보는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.  
※ 의약품을 사용하기 전에 반드시 첨부 문서를 주의깊게 읽어와야 하며, 첨부문서는 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.  
※ 의약품 부작용 발생 시 한국약품안전관리원 홈페이지(<https://www.drugsafe.or.kr>) 또는 (1644-6223)로 피해구제 신청을 할 수 있습니다.  
※ 소비자상담실 Tel. 043-238-8477

개정연월일 : 2019. 07. 01  
ANTI190701

COSMAXPHARMA