

사용상의 주의사항 정보(계속됨) ➡

[사용상의 주의사항] 경방환련해독탕정(단미엑스혼합제)

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 산생아
 - 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
 - 3) 수유부
 - 4) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성 (galactose intolerance), Lapp 유당(젖당) 분해효소 결핍증 (Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애 (glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.
 - 1) 현저하게 체력이 쇠약해진 환자(이상반응이 쉽게 나타나고 그 증상이 악화될 수 있다.)
 - 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고 있는 환자)
 - 3) 고령자(노인)(일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 주의할 것.)
 - 4) 어린이(어린이에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다(사용경험이 적다.))
3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.

상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

 - 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
 - (1) 간질성폐렴 : 드물게 발열, 기침, 호흡곤란, 폐음이상(염발음, 捻發音) 등이 나타난 경우에는 이 약의 복용을 중지하고, 신속하게 흉부X선 등 의 검사를 실시하여 동시에 부신피질호르몬제 투여 등의 적절한 처치를 받을 것.
 - (2) 간기능장애 : 드물게 AST, ALT, ALP, γ-GTP의 상승 등을 수반하는 간기능 장애, 황달이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우

- (3) 과민반응 : 발진, 두드러기 등
 - (4) 소화기계 : 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 복통(배아픔), 설사 등
 - 2) 1개월(코피, 숙취에 복용하는 경우에는 5~6회) 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
 4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 1) 장기간 계속하여 복용하지 않는 것이 원칙이나 부득이 장기간 계속하여 복용할 경우에는 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.
 - 2) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
 - 3) 다른 한약(생약)제제 등과 함께 복용할 경우에는 함유 생약의 중복에 주의할 것.
 5. 저장상의 주의사항
 - 1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것(사용 후 반드시 밀폐 보관할 것.).
 - 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 3) 의약품용 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.
- 자세한 의약품 정보는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템 (<https://nedrug.mfds.go.kr>)을 참조하세요.
 ■ 본 의약품은 품질관리를 위한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품은 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
 ■ 부작용보고 및 피해구제신청 : 한국약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)

개정연월일 : 2024.05.03