

비백큐 골드정

일반의약품
분류번호 : 319

원료의약품 및 그 분량: 1정 중

■ 유효성분

리보플라빈(KP)	100mg
리보틴아미드(KP)	100mg
판토텐산칼슘(KP)	108.7mg
피리독신염산염(KP)	100mg
몰산(KP)	0.1mg
클로타르타르산염(USP)	100mg
이노시톨(KP)	100mg
D-비오틴(USP)	0.1mg
산화아연(아연으로서 25mg)(KP)	31.2mg
직타용아스코르브산97%(아스코르브산으로서 97mg)(별규)	100mg
시아노코발린 1000배산(시아노코발린으로서 100μg)(KP)	100mg
티아민질산염(KP)	2mg
벤포티아민(티아민염산염으로서 36.15mg)(KP)	50mg
감마-오리자놀(KP)	10mg
산화마그네슘(마그네슘으로서 12mg)(KP)	20mg
유비데카렌(KP)	10mg

■ 첨가제(동물유래): 유당수화물(기원동물: 소, 사슴부위: 우유)

■ 첨가제(비동물유래): 적색40호, 청색1호알루미늄레이크, 황색5호알루미늄레이크

■ 기타첨가제: 경질무수구산, 미결정셀룰로오스, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 저지한도히드록시프로필셀룰로오스, 전분글리콜세나트, 크로스비드, 탭, 폴리비닐피롤리돈6000, 히드록시프로필셀룰로오스, 히프로멜로스

성상: 적갈색의 장방형 필름코팅정제

용법·용량: 만 12세 이상 및 성인: 1회 1정, 1회 1회 복용한다.

효능·효과:

- 다음 경우의 비타민 B₁, B₂, B₆, C의 보급
- 육체피로 - 임신·수유기 - 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과를 다음과 같다.
- 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절염(요하리통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부부 - 각기·눈의피로
- 아연의 보급

사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- (1) 고칼슘혈증(hypercalcaemia: 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태) 환자, 유육종증(sarcoidosis: 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장(콩팥)질환 환자
- (2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- (3) 만 12개월 미만의 영아
- (4) 신장(콩팥)결석 환자
- (5) 심한 중상의 신부전 환자
- (6) 이 약은 유당(젖당)수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토스 불내성(galactose intolerance), 락포 유당(젖당)분해 효소 결핍증(lactase deficiency), 또는 포도당-갈락토스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- (1) 인산염, 칼슘염, 강구약제는 테트라시클린계 제제, 제산제
- (2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- (1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- (2) 고칼슘혈증(hypercalcaemia: 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
- (3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- (4) 심장·순환기계기능 장애 환자
- (5) 신장(콩팥)장애 환자
- (6) 저단백혈증 환자
- (7) 강심배당체를 투여 중인 환자
- (8) 통풍 환자 또는 신장(콩팥)결석이 있는 환자
- (9) 임부
- (10) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여할 것

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이첨부문서를 소지할 것.

- (1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 - 구역, 구토, 설사, 묽은 변, 빈혈, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동 불규칙, 피부발진, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하, 위장관장애, 소화장애, 심부부(배부)부종, 폐부종(부기)
- (2) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
- (3) 피리독신은 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초 신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
- (4) 몰산이 부족한 환자에게 티아민 B12를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
- (5) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
- (6) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장장애, 고나트륨혈증, 울혈성부전 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- (7) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 골격종이 나타날 수 있다.
- (8) 항알도스테론제, 티아지드계利尿제와 병용(함께복용)하여 투여 시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
- (9) 우발적으로 과량복용한 경우
- (10) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- (1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- (2) 각종 요검사에 해당의 검사를 방해할 수 있다.
- (3) 요를 함부로 변화하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.
- (4) 녹차, 홍차 등 탄산을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.

6. 저장상의 주의사항

- (1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
- (3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보전을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

저장방법: 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

사용기간: 제조일로부터 36개월

포장단위: 10정/PTP, 50정/병, 60정/병, 100정(50정/병x2), 120정(60정/병x2), 304포(1정/포x304)

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 만일 유통과정 중 변질 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 문안은 (2019년 07월 08일) 작성되었으며 이후로 변경된 내용 및 기타 자세한 의약품정보는 미래제약 홈페이지 또는 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)-의약품동 검색

※ 부작용 보고: 한국약물안전관리원(1644-6223) ※ 소비자상담실: 02521-2308, www.miraespharmkorea.co.kr

Rev.01

제조사:  미래제약 경기도 안성시 공단2로 104

판매자:  BORYUNG 본사: 서울시 종로구 창경궁로 136 보령빌딩