

제이비정

일반의약품
분류번호 : 238
조제용

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

- 유효성분
 - 수산화마그네슘(KP) 500mg
 - 우르소데옥시콜산(KP) 10mg
 - 노회엑스(BP) 100mg(히드록시안트라센유도체(바발로인)으로서 20.0mg)
- 첨가제(동물유래) : 스테아르산마그네슘(소, 우지)
- 기타 첨가제 : 오파드라이한셀(03F680016), 전분글리콜산나트륨, 히드록시프로필셀룰로오스

[성 상] 흰색의 타원형 필름코팅정

[효능·효과]

변비, 변비에 따른 다음 증상의 완화 : 식욕부진(식욕감퇴), 복부팽만, 장내이상발효, 치질

[용법·용량]

1회 1정 성인(15세이상) 1일 3회, 11세~14세 1일 2회를 식전(식간 또는 식후)에 복용한다.
복용간격은 4시간 이상으로 한다. 다만, 초효는 최소량을 복용하고 변의 모양과 상태를 보면서 조금씩 증량 또는 감량한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 급성 복부질환(충수염, 장출혈, 궤양성 결장염 등) 환자
 - 2) 장폐색 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 1) 심한 복통 또는 구역, 구토 환자
 - 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인
 - 3) 신장에 환자
 - 4) 다른 약물을 투여받고 있는 환자
3. 부작용
이 약을 투여함으로써 심한 복통, 설사, 구토 등이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
4. 일반적 주의
 - 1) 정해진 용법,용량을 잘 지킨다.
 - 2) 소아에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여한다.
 - 3) 1주정도 투여하여도 변비의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
5. 소아에 대한 투여
 - 1) 이 약은 7세 미만의 영, 유아에게 투여하지 않는다.
6. 저장상의 주의사항
 - 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 2) 직사광선을 피하고 되도록이면 (습기가 적은) 서늘한 곳에 (밀전하여) 보관한다.
 - 3) 오염을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 500정/병

[제조사] 한국셀슨제약주 / 충청북도 음성군 금왕읍 금일로 271-8

[제조의뢰자] 코스맥스파마주 / 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 168-23

[판매자] 제이비코리아 / 경기도 김포시 고촌읍 아라욱로80

- ※ 본 제품은 “우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)”에 따라 제조 및 품질검사를 한 의약품입니다. 만약 구입시
사용기한이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입처를 통하여 교환해 드립니다.
- ※ 자세한 의약품정보는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 의약품을 사용하기 전에 반드시 첨부 문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서는 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.
- ※ 의약품 부작용 발생 시 한국의약품안전관리원 홈페이지(<https://www.drugsafe.or.kr>) 또는 (1644-6223)로 피해구
제 신청을 할 수 있습니다.
- ※ 소비자상담실 Tel, 043-238-8477

개정연월일 : 2019. 06. 14
JBT11190614