

가로규격(mm)	세로규격(mm)	원료약품(pt)	본문(pt)	컬러
115	200	7	6	Black

베스티콘 연질캡슐

(알베리시트르산염 · 시메티콘)

□원료약품 및 그 분량

1캡슐 중 • 유효성분 : 알베리시트르산염(별규)···60mg, 시메티콘(USP)···300mg • 첨가제(타르색소) : 창색1호, 창색5호, 창색203호
• 첨가제(동물유래성분) : 젤라틴(소·가축내피) • 기타첨가제 : 농글리세린, 산화티탄, 소르비톨액(비결정성), 에틸바닐린

□성상

흰색의 점조액이 든 녹색의 타원형 연질캡슐

□효능·효과

위장관계 경련의 진경 및 장내 가스 제거, 복부팽만으로 인한 소화기계 통증의 경감

□용법·용량

성인 : 1회 1캡슐, 1일 2~3회 식전에 복용한다.

□사용상의 주의사항

- 다음 환자에는 투여하지 말 것
1) 이 약의 성분에 과민증이 있는 환자 2) 저혈압 환자 3) 무력성 장폐색증 환자
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것
이 약은 창색5호(산셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- 이상반응 : 이 약을 투여하는 동안 바람직하지 않거나 불필요한 효과가 나타날 수 있다.
1) 과민반응 : 드물게 두드러기, 가려움증, 발진 및 아나필락시스를 포함하는 알러지반응이 나타날 수 있으며 후두부종, 속을 동반할 수 있다.
2) 소화기계 : 때때로 연변, 복부불쾌감, 설사, 복통, 구토, 구역, 복부중압감, 식욕부진이 나타날 수 있다.
3) 기타 : 드물게 간기능 이상이 나타날 수 있고 투여 중단 후 정상화 될 수 있으며, 드물게 두통, 어지럼증이 나타날 수 있다.
4) 국내에서 6년동안 786명을 대상으로 실시한 시판후 조사결과 변비 1례가 보고되었다.
- 일반적 주의
1) 도핑테스트를 실시할 때 양성반응을 일으킬 수 있다. 2) 정해진 용법·용량을 지켜야 한다.
3) 이 약의 복용으로 이상증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사에게 알린다.
4) 다른 약물과의 잠재적인 상호작용을 피하기 위하여 복용중인 약물을 의사 또는 약사에게 알린다.
- 임부 및 수유부에 대한 투여
1) 임부 : 동물시험에서 중대한 태아독성 또는 치기형성을 나타내지는 않았으나, 사람에 대해서는 확인되지 않았으며, 임신기간 중의 약물의 사용은 신중하여야 하기 때문에 임부에게는 투여하지 않는 것이 바람직하다.
2) 수유부 : 검토된 바가 없으므로 수유부에게는 투여하지 않는 것이 바람직하다.
- 소아에 대한 투여 : 만 18세 미만의 소아에 대한 안전성·유효성은 확립되어 있지 않다.
- 과량투여시의 처치 : 과량 투여시 저혈압 및 아트로핀 유사 독성이 나타날 수 있다. 과량투여시 처치는 저혈압에 대한 보조요법과 함께 아트로핀 해독과 동일한 요법을 행한다.
- 보관 및 취급상의 주의사항
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다. 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의할 것

□포장단위

30캡슐/병, 300캡슐/병

□저장방법

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

□제조·의뢰자 및 제조자

• 제조의뢰자 : 제이더블유신약(주) 경기도 평택시 산단로 88-24 • 제조자 : (주)동구바이오제약 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 18

□첨부문서 작성연월일

2022. 02. 14 • 이 첨부문서 작성연월일 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.jw-shinyak.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

□교환 및 제품문의

- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 통한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나, 변질·부패 또는 오손된 제품 등은 약국 등의 개설자에 한하여 교환하여 드립니다. 또한 제품에 관한 문의사항이 있으시면 연락주시요. **연락처 : 고객센터팀 1588-4675 / 080-090-6777(수신자부담)**
- 본 약제 특약 또는 복용 후 부작용(이상사례)이 발생한 경우 한국약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)으로 문의 및 보고하여 주시고, 동일기관에 의약품 부작용 피해구제 신청을 하실 수 있습니다.