

하이비백골드정

[원료약품 및 분량] 1정중

■ 유효성분

직타용아스코르브산97%(별규)(아스코르브산(으)로서 97 밀리그램)	-----	100mg
폴산(KP)	-----	0.1mg
콜린타르타르산염(USP)	-----	100mg
리보플라빈(KP)	-----	100mg
니코틴산아미드(KP)	-----	100mg
피리독신염산염(KP)	-----	100mg
시아노코발라민 1000배산(KP)(시아노코발라민(으)로서 100 마이크로그램)	----	100mg
판토텐산칼슘(KP)	-----	108.7mg
이노시톨(KP)	-----	100mg
D-비오틴(USP)	-----	0.1mg
벤포티아민(KP)(티아민(으)로서 36.15 밀리그램)	-----	50mg
γ-오리자놀(KP)	-----	10mg
유비데카레논(KP)	-----	5mg
산화아연(KP)(아연(으)로서 25 밀리그램)	-----	31.2mg

- 첨가제(동물유래) : 유당수화물(기원동물:소, 사용부위:우유)
- 첨가제(타르색소) : 적색40호, 청색1호알루미늄레이크, 황색5호알루미늄레이크
- 기타첨가제 : 경질무수규산, 미결정셀룰로오스, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 전분글리콜산나트륨, 크로스포비돈, 톨크, 폴리에틸렌글리콜6000, 히드록시프로필셀룰로오스, 히프로멜로오스2910

[성 상] 갈색 장방형의 필름코팅정제

[효능·효과]

- 1) 다음 경우의 비타민 B1, B2, B6, C의 보급
 - 육체피로
 - 임신·수유기
 - 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
- 2) 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 효과는 다음과 같다
 - 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
 - 각기
 - 눈의 피로
- 3) 아연의 보급

[용법·용량]

만 8세 이상 및 성인: 1일 1회, 1회 1정 복용

[사용상의 주의사항]

- 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장(콩팥)질환 환자
 - 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - 3) 만 12개월 미만의 젓먹이
 - 4) 신장(콩팥)결석 환자
 - 5) 심한 증상의 신부전 환자
 - 6) 이 약은 유당(젓당)수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젓당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency), 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
 - 2) 레보도파
- 3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 만 1세 미만의 젓먹이
 - 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이
 - 4) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
 - 5) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - 6) 심장.순환기계기능 장애 환자
 - 7) 신장(콩팥)장애 환자
 - 8) 저단백혈증 환자
 - 9) 강심배당체를 투여 중인 환자
 - 10) 통풍환자 또는 신장(콩팥)결석이 있는 환자
 - 11) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- 4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
 - 구역, 구토, 설사, 묽은 변, 변비, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 피부발진, 위장관장애, 소화장애, 상복부(배부분)통증, 폐부종(부기)
 - 2) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
 - 3) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
 - 4) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
 - 5) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperurisemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
 - 6) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
 - 7) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다.
 - 8) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께복용(사용))투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
 - 9) 우발적으로 과량복용 한 경우
 - 10) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
 - 1) 정해진 용법.용량을 잘 지킬 것
 - 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도.감독하에 투여할 것
 - 3) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
 - 4) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.
 - 5) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용 중, 복용전 후에는 피할 것.
- 6. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것.
 - 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

[사용기간] 제조일로부터 36 개월

[포장정보] 60 정/병, 120 정/상자((60정/병*2))

[제 조 자] 미래바이오제약 / 경기도 안성시 공단2로 104