

일반의약품

**비타민 B군을 보강한
프리미엄 고품량 활성비타민**

벤포벨

지정

| 벤포티아민 100mg, UDCA 30mg |
| 마그네슘 |

육체피로

신경통

구내염

1일 1회 1정

체력저하

눈의피로

근육통

이 약을 복용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽으시고, 약과 함께 보관하십시오.

【유효성분】 1정 중	
벤포티아민(KP).....	100.0mg (티아민염산염으로서 72.31mg)
리보플라빈(KP).....	100.0mg
피리독신염산염(KP).....	100.0mg
시아노코발라민1000배산(KP).....	100.0mg (시아노코발라민으로서 100μg)
우르소데옥시콜산(KP).....	30.0mg
니코틴산아미드(KP).....	30.0mg
d-비오틴(EP).....	200.0μg
산화아연(KP).....	20.0mg (아연으로서 16mg)
산화마그네슘(JP).....	30.0mg (마그네슘으로서 18mg)

유비데카레논(KP).....	2.0mg
이노시톨(KP).....	30.0mg
아스코르브산97%과립(별규).....	52.1mg (아스코르브산으로서 50mg)
클레칼시페롤 과립(별규).....	10.0mg (비타민D로서 1,000IU)
토코페롤아세테이트2배산(EP).....	20.0mg (비타민E로서 10IU)
판토텐산칼슘(KP).....	30.0mg
폴산(KP).....	200.0μg
셀레늄함유건조효모(KP).....	16.25mg (셀레늄으로서 32.5μg)

기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 바닐라미크론, 스테아르산마그네슘, 오파드라이 IIAMB노란색(88A220016), 오파드라이흰색(OY-C-7000A), 크로스카르멜로오스나트륨, 콜로이드성산화규소, 히드록시프로필셀룰로오스

【효능·효과】

1. 다음 경우의 비타민 D, E, B₁, B₆, B₁₂, C의 보급

- 육체피로
- 임신 · 수유기
- 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하
- 발육기
- 노년기

- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같습니다.

- 비타민D(클레칼시페롤과립) 뼈, 이의 발육불량, 구루병의 예방
- 비타민B₁(벤포티아민)

다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등), 각기, 눈의 피로

- 비타민B₆(리보플라빈), 비타민B₁₂(피리독신염산염)

다음 증상의 완화: 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

2. 아연의 보급

【용법·용량】

만 12세 이상 청소년 및 성인 : 1회 1정, 1일 1회 복용합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- (1) 고칼슘혈증(hypercalcaemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환, 신장(콩팥)질환 환자
- (2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- (3) 만 12개월 미만의 젖먹이
- (4) 신장(콩팥)결석 환자
- (5) 심한 증상의 신부전 환자
- (6) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스

흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

- (1) 인산염, 칼슘염, 경구(먹는, 복용하는)용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- (2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- (1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- (2) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 옥살염이 배설되는 상태)
- (3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- ① 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증(hypercalcaemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)을 일으킬 수 있습니다.
- (4) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자
- (5) 심장 · 순환기계기능 장애 환자
- (6) 신장(콩팥)장애 환자
- (7) 저단백혈증 환자
- (8) 감심배당체를 투여 중인 환자
- (9) 통풍환자 또는 신장(콩팥)결석이 있는 환자
- (10) 신장(콩팥)결석 병력이 있는 환자
- (11) 임부

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- (1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
 - 구역, 구토, 설사, 위부불쾌감, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 몹은 변, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 피부발진, 붉은 반점, 부전수축(심장박동 정지), 중추신경계 기능저하, 피부부, 팜 · 호흡시 악취, 탈모, 조급증, 위장관 장애, 소화장애, 상복부(배부분)통증, 폐부종(부기)
- (2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있습니다.
- (3) 에스트로겐을 포함한 경구(먹는, 복용하는)용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있습니다.
- (4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
- (5) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
- (6) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.
- (7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperurisemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.
- (8) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부

기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.

- (9) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있습니다.
- (10) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께복용(사용))투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
- (11) 우발적으로 과량복용 한 경우
- (12) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- (1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지키십시오.
- (2) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.
- (3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.
- (4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.

6. 저장상의 주의사항

- (1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
- (3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

【성상】 연한 노란색의 장방형 필름코팅정

【포장단위】 120정/병((60정/병X2))

【소비자상담실】 080-6776-080(수신자부담)

구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 파손된 제품은 사용하지 마시고 구입하신 곳에서 교환하십시오.

약은 어린이의 손이 닿지 않도록 보관해야 합니다.

KGMP(우수의약품 제조 및 품질관리기준) 적격업소 제품

㉔=등록상표

【제조의뢰자】



종근당

【제조사】



콜마파마(주)

충북 제천시 바이오펀리 2로 93 (왕암동)

본사 : 서울특별시 서대문구 충정로 8 (충정로37가)
공장 : 충남 천안시 서북구 성거읍 망향로 797-48
구입처문의 및 소비자상담실 : 080-6776-080(수신자부담)

소 비 자 중 심 경 영
광명기대위원회 1 한국소비자원

※ 제품 사용 후 이상반응(부작용)이 발생한 경우 한국약물관리안전관리원(1644-6223)에 부작용 피해구제 신청을 할 수 있습니다.
이 첨부문서 작성일자(2019. 07. 30)이후 변경된 내용은 증권당 인터넷 홈페이지(www.ckdpharm.com)나 소비자 상담전화(080-6776-080)를 통해 확인할 수 있습니다.