

일반의약품 조제용

실리마린을 함유한 간장질환용제

시리콤푸[®]

(밀크시슬열매건조엑스)

연질
캡슐

175mg

【원료약품 및 그 분량】1캡슐 중

- 유효성분 : 밀크시슬열매건조엑스(생규) 175mg
(실리마린(으)로서 98mg)
- 첨가제(동물유래성분) : 숙신산젤라틴(돼지, 가축)
- 기타 첨가제 : 소르비톨스페셜글리세린블렌드, 폴리소르베이트80, 폴리에틸렌글리콜400, 폴리옥실40·경화피마자유, 프로필렌글리콜

【성상】

갈색의 액상 내용물이 든 투명한 갈색의 장방형 연질캡슐

【효능·효과】

다음 질환의 보조치료 : 독성 간질환, 만성 간염, 간경변

【용법·용량】

성인 : 실리마린으로서 초기용량 1회 140mg(또는 실리빈으로서 1회 60mg), 1일 3회, 유지용량 1회 70mg(또는 실리빈으로서 1회 30mg), 1일 3회[또는 1회 140mg(또는 실리빈으로서 60mg), 1일 2회]복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 심한 담도(쓸개길) 폐쇄 환자
 - 2) 이 약의 과민증 환자
 - 3) 12세 이하의 소아
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
임부, 수유부
3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 1) 드물게 위통 또는 설사
 - 2) 알레르기 반응
4. 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 1) 정해진 용법·용량을 지킬 것
 - 2) 황달의 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것
 - 3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우나 장기 복용 시에는 의사 또는 약사와 상의할 것
5. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관할 것
 - 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오염(잘못 사용)에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것

【저장방법】기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】60캡슐(10캡슐/PTP X 6)

※ 본 제품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 의하여 엄격한 품질관리를 완료한 제품입니다. 사용기한이 지났거나 유통과정 중 변질, 변패 또는 오손된 제품이 있으면 사용하지 마시고, 구입한 약국이나 담당영업소에서 교환하시기 바랍니다.

※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하시기 바랍니다.

※ 첨부문서에 기재되지 않은 이상반응이 나타날 경우, 의사나 약사 또는 한국의약품안전관리원(drug safe.or.kr→의약품이상사례보고)에 알리시기 바랍니다.

※ 부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

※ 제품 개봉 시 또는 취급 시에 포자재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

※ 의약품을 사용하기 전에 사용자께서는 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다. 이 약의 올바른 복용법을 모르시거나 이 약 및 질병에 대한 의문사항이 있는 경우 의사·약사와 상담하시기 바랍니다.

“이 첨부문서 개정일자(19년 07월 26일)이후 변경된 내용은 www.kdpharma.co.kr나 02-576-6121,3 에서 확인할 수 있으며, 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)을 참조하시기 바랍니다.”

제조사 : (주)알피바이오

공장 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-7

제조의뢰·판매자 : 경동제약(주)

공장 : 경기도 화성시 양감면 제약단지로 224-3

소비자상담실 전화번호 : (02)576-6121,3



경동제약주식회사

• 작성일자 : 2019. 07. 18
• 개정번호 : 1908R