

이티민정 40mg(은행엽건조엑스)

Ginkgo Leaf Dried Extract 40mg / 80mg

일반의약품
분류번호 219

【원료약품 및 분량】1정 중

이티민정40mg(은행엽건조엑스)

• 유효성분: 은행엽건조엑스(생규) - 40mg

• 첨가제(타르색소): 황색203호, 청색1호

• 첨가제(동물유래성분): 유당수화물(소, 우유)

• 기타 첨가제: 미결정셀룰로오스, 폴리비드성아산화규소, 전분글리콜산나트륨, 히드록시프로필셀룰로오스, 카복시메틸셀룰로오스칼슘, 스테아르산마그네슘, 오파드라이AMB II 88A610016 녹색

이티민정80mg(은행엽건조엑스)

• 유효성분: 은행엽건조엑스(생규) - 80mg

• 첨가제(타르색소): 황색203호, 청색1호

• 첨가제(동물유래성분): 유당수화물(소, 우유)

• 기타 첨가제: 미결정셀룰로오스, 폴리비드성아산화규소, 전분글리콜산나트륨, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 카복시메틸셀룰로오스칼슘, 스테아르산마그네슘, 오파드라이amb II 88A610016 녹색

【성상】

이티민정40mg(은행엽건조엑스) - 연녹색의 원형 필름코팅정

이티민정80mg(은행엽건조엑스) - 녹색의 장방형 필름코팅정

【효능·효과】

1. 주효능 효과

① 말초동맥 순환장애(간헐성파행증(이따금 절뚝거림))의 치료

② 어지러움, 혈관성 및 퇴행성 이명(귀울림)

③ 이명(귀울림), 두통, 기억력감퇴, 집중력 장애, 우울감, 어지러움 등의 치매성 증상을 수반하는 기질성 뇌기능 장애의 치료

【용법·용량】

성인

① 말초동맥 순환장애, 어지러움, 이명(귀울림) : 은행엽건조엑스로서 1회 40mg 1일 3회 또는 1회 80mg 1일 2회 경구투여한다.(먹는다, 복용한다)

② 기질성 뇌기능장애 : 은행엽건조엑스로서 1회 40~80mg 1일 3회 또는 1회 120mg 1일 2회 경구투여한다.(먹는다, 복용한다)

연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 말 것

1) 이 약에 과민증 환자

2) 12세 이하의 소아(소아의 사용경험이 충분하지 않으므로 12세 이하의 소아에는 투여하지 않는다.)

3) 임부 (동물시험에서 기형발생은 없었으나 임신중의 투여에 대한 충분한 사용경험이 적다.)

- 4) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것
 - 1) 출혈 장애가 있거나 출혈의 위험을 증가시키는 약물(항응고제(예: 펜프로쿠몬, 와파린), 항혈소판제(예: 클로피도그렐, 아세틸살리실산 및 기타 비스테로이드성 항염증제)를 복용하고 있는 환자
 - 2) 수술부(모유로 이행여부가 알려지지 않음)
3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중단하고 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것. 상담시 가능한 첨부문서를 소지할 것
 - 1) 수술이 예정된 자
 - 2) 복용 3개월 후 증상의 개선이 없거나 악화되는 경우
 - 3) 이상반응
 - ① 드물게 가벼운 위장관 불편감, 두통, 알레르기성 피부반응이 나타날 수 있다.
 - ② 국내 자발적 이상사례 보고자료(1989~2013년)를 분석한 결과, 이상사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 이상사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례는 다음과 같이 나타났다. 다만, 이로서 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.
 - 어지러움
 - 가려움증
 - ③ 기타: 아나필락시스 또는 아나필락시스 반응 보고가 있다. 다만, 이로서 해당성분과 이상사례 간에 인과 관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.
4. 기타 (이약의 복용(사용)시 주의할 사항

이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 않는다.
5. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 2) 직사광선을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아, 단단히 마개로 막아) 보관한다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 30정/병, 500정/병

- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과 하였거나 유통과정 중 변질·변태 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다. 제품에 관한 문의는 전화(02)3487-7005로 하시기 바랍니다.
- ※ 본 의약품을 복용(사용)하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어아하며, 첨부문서는 의약품과 함께 보관하여 주십시오.
- ※ 본 의약품에 대한 기타 정보는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)의 '의약품검색'에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 약은 어린이의 손이 닿지 않도록 보관하여야 합니다.
- ※ 의약품 부작용 피해구제 신청: 한국약품안전관리원(1644-6223)

개정연월일: 2020년 11월 16일

【제조사】 콜마파마(주) 충북 제천시 바이오밸리2로 93

【제조회사】 (주)이든파마 충북 진천군 문백면 농다리로 1149