



Neosol™ 공법으로 효과빠른

목감기약 레드넥솔

연질 캡슐
기침 · 가래

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐(1,290mg) 중

■ 유효성분	
dl-메틸에페드린염산염(KP)	25.00mg
클로르페니라민말레산염(KP)	4.00mg
구아이페네신(KP)	80.00mg
덱스트로메토르판브로마수소산염수화물(KP)	16.00mg
■ 첨가제	
청가제(타르 색소) : 적색40호, 청색1호	
기타 첨가제 : 솔비톨스파살글리세린올렌드, 정제수, 젤라틴, 포비돈, 폴리메틸렌글리콜400, 프로판디올	

【성상】 무색 또는 옅은 적색의 투명한 내용물을 함유한 적색의 투명한 장방형 연질캡슐

【용법용량】 만 15세 이상 : 1일 3회, 1회 1캡슐

【효능효과】 기침, 가래

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- 1) 만 3개월 미만의 영아(갓난아기)
- 2) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
- 3) MAO제제(항우울제, 항장신병제, 감정조절제, 할라진제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 말 것

다른 진해(가침을 그치게 함)·거담제(가래약), 감기약, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염(코염)용 경구제, 알미약, 알레르기용약), 진정제

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것

- 1) 만 3개월 미만의 영아(갓난아기)에는 복용을 피하고 만 3개월 이상인 경우도 만 2세 미만의 영아(갓난아기) · 유아는 의사의 진료를 받아야 하며, 꼭 필요한 경우가 아니면 약을 복용시키지 않도록 한다. 만 2세 미만 영아(갓난아기) · 유아에게 이 약을 투여할 경우 보호자에게 알리고 주의 깊게 모니터링해야 한다.
- 2) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 알레르기성 비염(코염), 편두통, 음식을 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 3) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절염, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 4) 간장질환, 신장(콩팥)질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 녹내장(예 : 눈의 통증, 눈이 침침함 등), 배뇨(소변을 똥)곤란 등이 있는 사람, 고령자(노인), 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
- 5) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 6) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람

7) 다음과 같은 기침이 있는 사람

흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것

- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
발진·발적·홍반·발진·가려움, 구역·구토, 식욕부진, 어지러움, 배뇨(소변을 똥)곤란, 목마름(지속적이거나 심한), 불안, 떨림, 불면
- 2) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것
- 2) 만 7세 이하의 영아(갓난아기)·유아에게는 시럽제를 복용시킬 것
- 3) 복용시에는 음주하지 말 것
- 4) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피할 것

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것
- 3) 오염(갈뚝 사들)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

【포장단위】 10캡슐/PTP

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【소비자상담실】 02-2002-9715

【제조업】 **Rp Bio (주)알피** 바이오 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-7

- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입 시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여드립니다.
- ※ 본 제품은 공정거래위원회고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해드립니다.
- ※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어와야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- ※ 설명서 작성일자 이후 변경된 내용은 <http://nedrug.mfds.go.kr>에서 확인하실 수 있습니다.
- ※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

설명서 작성일자 : 2019년 08월 1일

※ 위 일자는 설명서 작성일자로 사용기간과 관련이 없습니다.