

소화성궤양 치료제

에소오피라졸 정 40mg (에소오메프라졸마그네슘삼수화물)

KGMP적격업체

전문 의약품
분류번호:232

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

• 유효성분 : 에소오메프라졸마그네슘삼수화물(EP) 44.5mg
(에소오메프라졸로서 40mg)

• 기타첨가제 : L-아르기닌, 미결정셀룰로오스, 산하마그네슘, 스테아릴푸마레이트나트륨, 시트르산트리에틸, 이크릴레이트 분홍색(93A640002), 오파드라이 20A680000 화이트, 크로스카멜로스나트륨, 포비돈K-30

[성상] 분홍색의 원형 필름코팅정

[효능·효과]

1. 위식도 역류질환(GERD)

- 미란성 역류식도염의 치료
- 식도염 환자의 재발방지를 위한 장기간 유지요법
- 식도염이 없는 위식도 역류질환의 증상치료요법

2. 헬리코박터필로리 박멸을 위한 항생제 병용요법

- 헬리코박터필로리 양성인 십이지장궤양의 치료
- 헬리코박터필로리 양성인 소화성궤양 환자의 재발방지

3. 비스테로이드소염진통제(COX-2 비선택성, 선택성) 투여와 관련된 상부 위장관 증상(통증, 불편감, 작열감) 치료의 단일요법

4. 지속적인 비스테로이드소염진통제 투여가 필요한 환자

- 비스테로이드소염진통제 투여와 관련된 위궤양의 치료
- 비스테로이드소염진통제 투여와 관련된 위궤양 및 십이지장궤양의 예방

5. 줄리닝-열린상 중추근의 치료

6. 정맥주사로 위궤양 또는 십이지장궤양에 의한 재출혈 예방 유도 이후의 유지 요법

[용법·용량]

이 약은 물 등의 액체와 함께 삼켜야 하며 씹거나 부수어서는 안된다.

1. 성인

1) 위식도 역류성 질환(GERD)

- 미란성 역류식도염의 치료 : 4주동안 1일 1회, 1회 40 mg를 투여한다.
- 식도염이 치료되지 않거나 증상이 계속되는 환자의 경우 4주 더 복용한다.
- 식도염 환자의 재발 방지를 위한 장기간 유지요법 : 1일 1회, 1회 20 mg
- 식도염이 없는 위식도 역류질환의 증상치료요법 :

- 1일 1회, 1회 20 mg, 4주후에도 증상 조절이 되지 않을 경우 추가 진료가 필요하다.
- 일단 증상이 완화되면 그 후 연속되는 증상은 1일 1회, 1회 20 mg를 투여하여 조절한다.
- 성인에서, 1일 1회, 1회 20 mg를 필요시마다 투여할 수 있다. 비스테로이드소염진통제 투여로 위궤양 및 십이지장궤양의 발현 위험이 높은 환자에게는 연속되는 증상 조절을 위해 필요시마다 투여하는 것을 권장하지 않는다.

2) 헬리코박터필로리 박멸을 위한 항생제 병용요법

- 약 20 mg를 아목시실린 1 g, 클라리트로마이신 500 mg과 병용하여 1일 2회, 7일간 투여한다.
- 3) 비스테로이드소염진통제(COX-2 비선택성, 선택성)투여와 관련된 상부 위장관 증상(통증, 불편감, 작열감) 치료의 단일요법

- 1일 1회, 1회 20 mg, 4주후에도 증상이 조절이 되지 않을 경우 추가진료가 필요하다. 4주를 초과하는 임상시험은 실시되지 않았다.

4) 지속적인 비스테로이드소염진통제 투여가 필요한 환자

- 비스테로이드소염진통제 투여와 관련된 위궤양의 치료 : 1일 1회, 1회 20 mg, 치료기간은 4~8주이다.
- 비스테로이드소염진통제 투여와 관련된 위궤양 및 십이지장궤양의 예방 : 1일 1회, 1회 20 mg,

5) 줄리닝-열린상 중추근의 치료

- 권장 초기 용량은 40 mg 1일 2회 투여이다. 이후 용량은 환자별로 조절되어야 하며, 임상증상이 있는 동안 치료를 지속해야 한다. 임상자료에 따르면, 대부분의 환자는 1일 80 ~ 160 mg의 용량에서 조절 가능하다. 1일 80 mg 이상의 용량은 1일 2회로 나누어 복용하도록 한다.

- 6) 정맥주사로 위궤양 또는 십이지장궤양에 의한 재출혈 예방 유도 이후의 유지 요법
- 정맥주사로 위궤양 또는 십이지장궤양에 의한 재출혈 예방 유도 이후 4주동안 1일 1회, 1회 40 mg를 투여한다.

2. 12세 이상의 청소년

1) 위식도 역류성 질환(GERD)

- 미란성 역류식도염의 치료 : 4주동안 1일 1회, 1회 40 mg를 투여한다.
- 식도염이 치료되지 않거나 증상이 계속되는 환자의 경우 4주 더 복용한다.
- 식도염이 없는 위식도 역류질환의 증상치료요법 :

- 1일 1회, 1회 20 mg, 4주후에도 증상 조절이 되지 않을 경우 추가 진료가 필요하다.
- 일단 증상이 완화되면 그 후 연속되는 증상은 1일 1회, 1회 20 mg를 투여하여 조절한다.
- 성인에서, 1일 1회, 1회 20 mg를 필요시마다 투여할 수 있다. 비스테로이드소염진통제 투여로 위궤양 및 십이지장궤양의 발현 위험이 높은 환자에게는 연속되는 증상 조절을 위해 필요시마다 투여하는 것을 권장하지 않는다.

3. 12세 미만의 소아 : 이 약을 12세 미만의 소아에 투여한 경험은 없다.

- 4. 신기능장애 : 용량을 조절할 필요는 없다. 중증의 신부전환자에 투여한 예가 많지 않기 때문에 신중히 투여해야 한다.

- 5. 간기능장애 : 경증-중등도의 간장애 환자에서 용량을 조절할 필요는 없다. 중증 간장애환자의 경우 이 약 20 mg 용량을 초과해서는 안된다.

- 6. 고려사항 : 용량을 조절할 필요가 없다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 이 약, 이 약의 구성성분 또는 벤즈이미다졸류에 과민반응 및 그 병력이 있는 환자
- 2) 페니실린계 항생제에 과민반응 환자(헬리코박터필로리 박멸을 위해 아목시실린과 병용요법시)
- 3) 마크로라이드계 항생제 과민반응 환자(헬리코박터필로리 박멸을 위해 클라리트로마이신과 병용시에 한함)
- 4) 테트라사이클, 시사프리드, 피모지드, 아스테미졸을 투여 받고 있는 환자(헬리코박터필로리 박멸을 위해 클라리트로마이신과 병용시에 한함)(상호작용항 참조)
- 5) 아타자나비르 및 넬비마비르를 투여 중인 환자(상호작용항 참조)
- 6) 수유부
- 7) 심근경색 및 그 병력이 있는 환자
- 8) 필리마틴 함유제제를 투여중인 환자 (상호작용항 참조)

2. 이상반응

- 1) 다음의 이상반응이 임상시험과 시판 후 조사에서 확인 또는 의심되었다. 용량 상관성은 없었다. 이 상반응을 빈도에 따라 분류하였다(자주) > 1/100, < 1/10 ; 때때로 > 1/1,000, < 1/100 ; 드물게 > 1/10,000, < 1/1,000 ; 매우 드물게 < 1/10,000.

- 혈액 및 림프계 : 드물게 백혈구감소증, 저혈소판증, 매우 드물게 무과립구증, 백혈구감소증
- 면역계 : 드물게 발열, 혈관부종, 아나필락시스 반응/쇼크 등과 같은 과민반응

- 대사/영양 : 때때로 말초 부종, 드물게 저나트륨혈증, 매우 드물게 저마그네슘혈증 (중증의 저마그네슘혈증은 저칼슘혈증을 유발할 수도 있다. 저마그네슘혈증은 또한 저칼륨혈증을 유발할 수 있다.)
- 정신계 : 때때로 불면, 드물게 초조, 정신 혼란, 우울, 매우 드물게 공격성, 환각

- 신경계 : 자주 두통, 때때로 어지럼(dizziness), 지각이상, 졸음, 드물게 미각장애

- 시각 : 드물게 흐린시력

- 청각 및 미로계 : 때때로 어지럼(vertigo)

- 호흡기계 : 드물게 기관지염

- 위장관계 : 배장염, 자주 복통, 변비, 설사, 복부팽만감, 구역·구토, 때때로 구강건조증, 드물게 구내염, 위장관 칸디다증, 매우 드물게 현미경적 결장염

- 간담도계 : 때때로 간초상 증가, 드물게 황달을 동반하거나 동반하지 않는 간염, 매우 드물게 간부전, 기존 간질환이 있는 환자에서 뇌병증

- 피부 및 피하조직 : 때때로 피부부여, 가려움, 발진, 두드러기, 드물게 탈모, 광감수성, 매우 드물게 다형홍반, 피부정맥안종후군(스티븐스-존슨증후군), 독성표피괴사증후군(열열증후군), 급성 전신 피진성 홍반증, 호산구 증가 및 전신 증상 동반 약물 반응(DRESS 증후군)

- 근골격계 : 골절 드물게 관절통, 근육통, 매우 드물게 근육쇠약

- 신장 및 비뇨기계 : 매우 드물게 간질신장염

- 생식계 : 매우 드물게 여성형유방

- 전신 및 투여부위 : 드물게 무력증, 발한증가

- 간염 : 클로스트리듐 디피실레성 설사(빈도불명)

- 2) 이외에 다음의 이상반응이 1 % 미만의 발생률로 이 약과 관련이 있거나 또는 관련 가능성이 있는 것으로 보고되었다.

- 전신 : 복부팽만, 알레르기 반응, 등통, 흉통, 흉골흉통, 안면부종, 안면홍조, 피로, 발열, 인플루엔자 유사증상, 일반부종, 다리부종, 권태, 통증, 경직, 무력증, 말초부종

- 심혈관계 : 흉조, 고혈압, 빈맥

- 내분비계 : 갑상선증

- 소화기계 : 대장과민증, 변비약화, 소화불량, 연하곤란, 위장관형성장애, 상복부통증, 트림, 식도장애, 잦은배변, 위장염, 위장관출혈, 딸꾹질, 흑색변, 구강장애, 인두장애, 직장장애, 위장관 증상, 혈중가스트린증가, 하해음, 허부증, 궤양성 구내염, 구토

- 감각 : 귀알이, 이명

- 혈액계 : 빈혈, 자색소빈혈, 자궁경부암피질병증,코피, 백혈구증가증, 백혈구감소증, 혈소판감소증

- 간 : 빌리루빈혈증, 간기능 이상, ALT 증가, AST 증가

- 대사/영양 : 당뇨, 고요산혈증, 저나트륨혈증, ALP증가, 구강, 비타민 B12결핍, 체중증가, 체중감소

- 근골격계 : 관절염약화, 관절병증, 경련, 섬유근육통증후군, 탈장, 류마티스성 다발성근육통, 관절통

- 정신신경계 : 식욕부진, 무감동, 기분, 우울약화, 과다근육긴장증, 초조, 감각저하, 발기부전, 불면증, 편두통, 편두통약화, 수면장애, 떨림, 어지럼(dizziness, vertigo), 시야결손, 지각이상, 졸음

- 생식계 : 월경증, 월경장애, 질염

- 호흡기계 : 천식악화, 기침, 호흡곤란, 후두부종, 인두염, 비염, 부비동염

- 피부/부속기관 : 여드름, 항문가려움, 발진, 홍반발진, 반구진성발진, 혈관부종, 피부부여, 가려움, 두드러기, 발한증가

- 특수감각 : 중이염, 이상후각, 미각소실, 미각도착

- 비뇨기계 : 소변이상, 알부민뇨, 방광염, 배뇨곤란, 진균감염, 혈뇨, 배뇨회수, 칸디다증, 생식기 칸디다증, 당뇨

- 시각 : 결막염, 시각이상

- 내이강 상에서 발견된 이상반응 : 십이지장염, 식도염, 식도협착, 식도궤양, 식도정맥류, 위궤양, 위염, 양성혈암 또는 결절, 바레트식도(Barratt's esophagus), 점막박제, 탈장

- 3) 다음은 프로토펙트약제제의 시판 후 조사를 통해 보고된 이상반응이다. 이 이상반응은 불특정 다수의 인구집단에서 자발적으로 보고된 것이기 때문에, 항상 발생률을 신중히 있게 예측하거나 약물 투여와의 인과관계를 확립할 수 있지는 않다.

- 면역계 : 전신홍반루푸스 - 피부 및 피하조직계 : 피부홍반루푸스

- 위장관계 : 위저산 용종 - 대사 및 영양계 : 저칼슘혈증, 저칼륨혈증

- 4) 황문근용해 : 황문근용해가 나타날 수 있으나 신중하게 관찰하고 근육통, 무력증, 크레아티닌키나제(CK)치환(인산화합성) 상승, 혈중 및 소변 미오글로빈 상승을 포함하는 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 취해야한다.

3. 일반적 주의

- 1) 이 약으로 인해 약성작용의 증상이 완화되거나 진단이 지연될 수 있으므로 약성 증상이 의심되는 경우 증상(의도하지 않은) 현저한 체중 감소, 재발성 구토, 삼킨곤란, 토혈, 흑색변 등이 있으면서 위궤양이 있거나 의심되는 경우 약이 1년 이상 복용한 경우 확인하고 투여해야 한다.

- 2) 이 약으로 장기간 치료할 경우(특히 1년 이상)는 정기적으로 검사를 받아야 한다.

- 3) 이 약을 필요시 투여하는 환자에게는 증상의 변화가 있을 때 의사와 상담하도록 주의시킨다. 이 약을 필요시 투여하도록 처방받은 경우 이 약의 혈중농도 변동으로 인한 다른 약물과의 상호작용을 고려해야 한다.

- 4) 헬리코박터필로리 박멸을 위한 항생제 병용요법으로 이 약과 같이 투여하는 항균제의 사용설명서를 참조해야 한다. 클라리트로마이신은 강력한 CYP3A4억제제이므로 시사프리드와 같이 CYP3A4에 의해 대사는 다른 약물을 복용하고 있는 환자에게 박멸요법을 실시할 경우에는 클라리트로마이신의 금기 및 상호작용을 고려해야 한다.

- 5) 프로토펙트약제제로 인해 위내 산도가 감소하면 위장관에 보통 존재하는 세균의 수가 증가한다. 이 약으로 치료할 때 살모넬라, 캄필로박터, 클로스트리듐 디피실레와 같은 세균에 의한 위장관의 감염 위험이 약간 증가할 수 있다. 이것은 클로스트리듐 디피실레균 설사 위험성 증가와 연관이 있으며 특히 입원환자에서 이러한 위험성이 증가되었다는 여러 관찰연구 결과가 보고되었다. 이러한 진단은 설사증세가 개선되지 않았을 때 고려되어야 한다. 클로스트리듐 디피실레균 설사는 거의 모든 항균제 사용 중 보고되고 있다.

- 6) 일부 해의 약학연구에서 프로토펙트약제제(Proton Pump Inhibitor) 치료가 기관질, 순록 및 척추 골절의 위험성 증가와 관련이 있는 가능성이 있다고 보고되었다. 골절의 위험은 권장용량을 상회하는 고용량을 투여한 환자와 1년 이상의 장기사용 환자에서 증가되었다.

- 7) 오메프라졸 및 에소오메프라졸과 글리콜중성 글질 간의 인과관계가 밝혀진 것은 아니나, 글리콜중

- 및 골다공증성 골절이 진행될 위험이 있는 환자의 경우 최신의 임상 지침에 따라 적절한 임상적 모니터링이 권고된다.
- 8) 3개월 이상 프로토펙프막제제(Proton Pump Inhibitor) 치료를 받은 환자들에서 저마그네슘혈증이 드물게 보고되었다. 1년 이상 치료를 받은 경우에 가장 많이 나타났다. 대부분의 환자들에게 저마그네슘혈증의 치료로서 마그네슘보충 및 프로토펙프막제제(Proton Pump Inhibitor) 투여 중단이 필요하다. 장기간 치료는 필요하거나 다량성 또는 저마그네슘혈증을 유발하는 약물에, 이소제를 병용투여하는 환자들은 치료 시작을 포함한 주지적 마그네슘 수치 모니터링이 필요하다. 중대한 이상반응은 강직, 부정맥, 박작을 포함한다.
- 9) 실험실적 검사와의 간섭: 중금속 Cg(As(serum chromogranin A) 수치는 신경 내분비성 검사에서 간섭을 일으킬 수 있다. 이 간섭을 피하기 위해 CgA 측정하기 적어도 5일 전 일시적으로 एस오 메프라졸 투여를 중지해야만 한다.
- 10) 메토크레이트: 프로토펙프막제제와 메토크레이트(주로 고용량을 사용하는 경우, 메토크레이트의 사용상의 주의사항 참조)를 병용하는 경우 메토크레이트 그리고/또는 그 대체제의 혈청 농도가 상승 및 지속되어 메토크레이트의 독성이 나타날 수 있다는 문헌보고가 있었다. 고용량의 메토크레이트를 사용하는 경우, 프로토펙프막제제의 일시적인 투여 중단을 고려할 수 있다 (상호작용항 참조).
- 11) 치료시 경로를 충분히 관찰하고 증상에 따라 이 약을 최소용량 및 적절한 치료기간으로 투여하여야 한다.
- 12) 피부 및 전신홍반루푸스: 프로토펙프막제제를 복용한 환자에서 피부홍반루푸스(Cutaneous lupus erythematosus, CLE)와 전신홍반루푸스(Systemic lupus erythematosus, SLE)가 보고되었다. 이러한 사례들은 새로 발생하거나 기존의 자가면역질환의 악화로 발생하였다. 프로토펙프막제제로 유발되는 홍반루푸스 사례는 대부분 피부홍반루푸스였다. 프로토펙프막제제를 복용한 환자에서 보고된 피부홍반루푸스의 가장 흔한 형태는 아급성피부홍반루푸스이며, 일부부터 노인이나 이르기까지 지속적인 약물 치료 후 수주에서 수년 이내에 발생하였다. 일반적으로 조직학적 결과는 장기침습이 없는 상태로 관찰되었다. 프로토펙프막제제를 복용한 환자에서 전신홍반루푸스는 피부홍반루푸스보다 덜 흔하게 보고되었다. 프로토펙프막제제 관련 전신홍반루푸스는 보통 비약물유발성전신홍반루푸스보다 더 가벼운 증상을 보인다. 전신홍반루푸스는 주로 젊은층의 성인부터 노인에 이르기까지 초기 약물 치료 후 수주에서 수년 이내에 발생한다. 대다수의 환자는 발진에 나타났으나, 관절통과 혈구감소증도 보고되었다. 약역작용으로 지시된 것 보다 더 오랫동안 프로토펙프막제제를 투여하지 않는다. 만약 이 약을 복용한 환자에서 피부홍반루푸스 또는 전신홍반루푸스와 일치하는 증상이나 징후가 나타나면, 약물 복용을 중단하고 적절한 전문의에게 환자 평가를 의뢰한다. 대부분의 환자들은 4 ~ 12주 내로 프로토펙프막제제 중단만을 통하여 개선되었다. 항혈청 검사에, 항핵항체(Antinuclear antibody, ANA)에서 양성으로 나타날 수 있으며, 높은 항핵항체 양성 결과는 임상 증상보다 해결되는데 시간이 더 소요될 수 있다.
- 13) 위저전 용종(Fundic gland polyps): 프로토펙프막제제 사용은 위저전 용종의 위험 증가와 관련이 있으며 특히 1년 이상 장기간 사용 시 위험이 증가한다. 프로토펙프막제제를 사용하는 환자 중 위저전 용종이 발생한 대부분의 환자들은 무증상이었으며 내시경 검사를 통해 우연히 발견하였다. 프로토펙프막제제를 치료하고 있는 증상에 맞게 최단 기간 사용해야 한다.
- 14) 중증 피부 이상 반응: 프로토펙프막제제 사용 시 스티븐스존슨증후군(SJS), 독성 표피 괴사 용해(TEN), 호산구 증가 및 전신 증상 동반 약물 반응(DRESS 증후군) 및 급성 전신 파진성 농포증(AGEP)을 포함한 중증 피부 이상 반응(SCAR)이 보고되었다. 중증 피부 이상 반응의 최초 징후 또는 과민반응이 나타나면 이 약 투여를 중단하고 추가적인 평가를 고려해야 한다.

4. 상호작용

- 1) 이 약 투여 중 위내 산도 감소로 인해 위 산도에 의해 흡수 기전이 영향을 받는 약물의 흡수가 증가 또는 감소될 수 있다. 다른 산 분비 억제제나 제산제와 마찬가지로 이 약 투여 중에는 케토탄나올과 이트라코나졸 및 엘트레티닌의 흡수가 감소될 수 있고 다국산의 흡수가 증가할 수 있다. 건강한 지원자 등에서 오메프라졸(하루에 20 mg)과 다국산의 동시투여는 다국산의 생체이용률을 10 %정도 증가시켰다(10명의 지원자중 2명은 30 %까지 증가). 이 약은 오메프라졸의 이상질체이다. 따라서 이 약을 다국산과 병용투여시 환자의 상태는 모니터링되어야 한다.
- 2) 이 약은 CYP2C19와 CYP3A4에 의해 대사된다. 그리고 이 약은 이 약의 주 대사효소인 CYP2C19를 저해한다. 디아제팜, 시탈로프람, 이미라피딘, 클로미다핀, 페니토인, 와르파린 등과 같이 CYP2C19에 의해 대사되는 약물과 병용시 이들 약물의 혈장 농도가 증가될 수 있으므로 이들 약물의 강량이 필요할 수 있다. CYP2C19 기질인 디아제팜과 이 약 30 mg의 병용투여로 디아제팜의 청소율이 45 % 감소되었다. 간질환자에게 페니토인과 이 약 40 mg의 병용투여로 페니토인의 혈장 농도도 최저치가 13 % 증가되었다. 이 약을 투여하기 시작하거나 중단할 때 페니토인의 혈장 농도를 모니터링하도록 한다. 오메프라졸(1일 1회 40 mg 투여)은 비코리나졸(CYP2C19 기질)의 C_{max}와 AUC_{0-∞}를 각각 15 % 및 41 % 증가시켰다. 임상시험에서 와르파린을 투여하고 있는 환자에서 이 약 40 mg을 병용 투여하였을 때 응고 시간은 정상 범위에 포함되었다. 그러나 시판 후 조사에서 두 약물을 병용투여하는 동안 임상적으로 유의한 INR과 프로토펙프막제제의 상승이 몇 건 보고되었으며 이는 비정상적혈소판 기능에 사망까지 초래할 수 있다. 그러므로 와르파린 또는 다른 쿠마린 유도제와 이 약의 병용투여를 시작하거나 중단할 때 모니터링이 필요하다.
- 3) 이 약은 CYP2C19와 CYP3A4에 의해 대사된다. 이 약과 CYP3A4 저해제인 클레르티로마신(500 mg 1일 2회 투여)을 동시에 투여하면 이 약의 AUC가 2배로 증가된다. 이 약과 CYP2C19, CYP3A4 저해제와의 병용투여는 이 약의 노출을 두 배 이상 증가시킬 수 있다. CYP2C19, CYP3A4 억제제인 아지나나졸은 오메프라졸의 AUC_{0-∞}를 280 %까지 증가시켰다. 이 때문에 이 약의 용량을 조절할 필요는 없다. 그러나 중증의 간기능 장애에 포함될 수 있으므로, 이러한 환자에게는 용량조절을 고려하여야 한다.
- 4) CYP2C19나 CYP3A4 혹은 두가지 모두를(예, 리람피신과 세인트존스워트) 유도한다고 알려진 약물들은 एस오메프라졸 대사를 증가시킬으로써 एस오메프라졸 혈청 농도를 감소시킬 수도 있다. 이 약과 리람피신 또는 세인트존스워트의 병용투여를 피한다.
- 5) 이 약 뿐만 아니라, 오메프라졸도 CYP2C19의 억제제로서 작용한다. 교차연구에서 건강한 지원자 예로 40 mg의 오메프라졸을 투여한 경우 실마스타틴의 C_{max}와 AUC가 각각 18 %와 26 % 증가하였고 실마스타틴의 혈장 대체제 중 하나인 C_{max}와 AUC는 각각 29 %와 9 % 증가하였다.
- 6) 건강한 지원자에게 오메프라졸(40 mg 1일 1회 투여)과 아지나나졸 300 mg/리토나비르 100 mg을 병용투여했을 때 아지나나비르의 노출이 감소하였다(AUC, C_{max}, C_{min}이 75 % 감소). 아지나나비르 400 mg 1일 4회 투여는 오메프라졸의 아지나나비르 노출에 대한 영향을 상쇄시킬 수 없다. 이 약을 포함한 프로토펙프막제제들은 아지나나비르와 병용투여할 수 없다.
- 7) 오메프라졸은 몇 개의 항 바이러스제와 상호작용이 있는 것으로 보고되었다. 이 보고된 상호작용은 임상적 중요성과 기전은 불명지다. 오메프라졸 투여의 위내 산도 감소는 항 바이러스제의 흡수를 증가시킬 수 있다. 가능한 상호작용의 또 다른 기전은 CYP2C19이며, 아지나나비르 및 넬비나비르와 같은 항바이러스제에서는 오메프라졸을 병용 투여시 혈청수치 감소가 보고되었으며 병용투여는 안정되지 않는다. 그 외 사퀴나비르와 같은 항바이러스제에서는 혈청수치 증가가 보고되었다. 오메프라졸과 병용 투여시 혈청수치가 변하지 않는 항바이러스제 또한 존재한다. 오메프라졸과 एस오메프라졸은 유사한 약력학/약동학적 특성을 갖고 있으므로 아지나나비르 및 넬비나비르와 같은 항바이러스제에 약물과 병용투여해서는 안된다.
- 8) 건강한 지원자에게 시사프리드와 이 약 40 mg을 병용투여했을 때 시사프리드의 AUC가 32 % 증가되고 배설 반감기가 31 % 연장되었다. 최고 혈장 농도의 유의한 증가는 없었다. 이러한 상호작용으로 임상적 중요성에 대한 시사프리드의 영향이 변경되지 않았다. 즉, 시사프리드 단독 투여에 의한 QTc 간격의 근소한 연장 외에 이 약과 시사프리드의 병용투여에 의해 더 이상 QTc 간격이 연장되지는 않았다.
- 9) 이 약은 아비스실린 또는 퀴니딘의 약동동역학에 임상적으로 유의한 영향을 미치지 않았다.

- 10) 이 약과 나프록센 또는 로페카시브의 병용 투여를 단기간 평가한 시험에 의하면 임상적으로 연관 있는 약동학적 상호작용이 나타나지 않았다.
- 11) 건강한 지원자로부터의 연구결과로부터 클로피도그렐(중간 300 mg/ 유지용량일 75 mg)과 एस오메프라졸(경구투여 1일 40 mg)은 약동학/약력학적인 상호작용이 있는 것으로 보여졌으며, 이것은 평균 14 % 정도 혈소판 응집을 감소시키는 것으로 보여졌으며 클로피도그렐의 활성 대사체의 노출을 평균 40 % 정도 감소시키는 것으로 나타났다. 이 결과에 근거하여 एस오메프라졸과 클로피도그렐은 병용투여하지 않도록 한다.
- 12) 이상반응 사례 보고, 집단약동학 연구(population pharmacokinetic studies) 및 후향적 연구 등에서 메토크레이트(주로 고용량을 사용하는 경우, 메토크레이트의 사용상의 주의사항 참조)와 프로토펙프막제제를 병용하는 경우 메토크레이트 그리고/또는 그 대체제인 히드록시메토크레이트의 혈청 농도가 상승 및 유지되어 메토크레이트의 독성이 나타날 수 있다고 보고되었다. 그러나 고용량의 메토크레이트와 프로토펙프막제제에 대한 정식 약물상호작용연구는 수행되지 않았지만 일반적인 주의항 참조).
- 13) 이 약과 타크로리무스를 병용하면 타크로리무스의 혈청치가 증가할 수 있다.
- 14) 헬리코박터필로리 박멸을 위한 항생제병용법: 클레르티로마신 및/또는 에리트로마이신을 피모지드와 병용 투여시 심부정맥(QT 연장, 심실성 빈맥, 심실세동, Torsades de pointes 포함)이 나타나고 이는 클레르티로마신 및 에리트로마이신에 의해 이들 약물의 간대사가 방해받기 때문인 것으로 약국의 시판후 조사결과 보고되었으며 치명적인 사례도 보고되었다.
- 15) 이 약과 필리바린의 병용 시 필리바린의 혈장농도가 감소할 수 있으므로(위장 pH 증가) 병용 투여해서는 안된다. 이는 필리바린의 치료효과를 저하시킬 수 있다.
5. 임부에 대한 투여
이 약의 임신 중 노출에 대한 데이터는 제한되어 있다. 동물실험 결과 배태자 발달과 관련하여 적·간접의 유해작용은 나타나지 않았다. 라세티메 혼합물의 동물실험 결과 임신, 분만 또는 분만후 발달에 대한 적·간접의 유해작용도 나타나지 않았다. 그러나 이 약을 임부에 처방할 주의해야 한다.
6. 수유부에 대한 투여
이 약이 사람의 모유 중으로 이행하는지 여부는 알려져 있지 않다. 수유부를 대상으로 한 시험은 실시되지 않았으며, 이 약을 수유 중 투여해서는 안된다.
7. 과량 투여시의 처치
계속된 과량투여(240 mg/day용량의 제한된 경험)와 관련하여 나타나는 증상들은 일시적이다. 이 약 80 mg을 1회 투여한 경우 별다른 문제가 없었다. 특이적인 해독제는 알려져 있지 않다. 이 약은 단백질 결합율이 아주 높기 때문에 투석되지 않는다. 따라서 과량투여시 대증요법 및 일반 유지요법을 사용하여야 한다.

8. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.

9. 의약품동등성시험 정보

- 가. 시험약 एस오메프라졸마그네슘상승화물정(주)마더스제약)과 대조약 넥시움정40밀리그램एस오메프라졸마그네슘(한국아스트라제네카(주))를 2x2 교차시험으로 각 1정씩 건강한 성인 57명에게 공복 시 단회 경구투여하여 혈중 एस오메프라졸을 측정한 결과, 비교평가항목치(AUC_{0-∞}, C_{max})를 로그변환하여 통계처리하였을 때, 평균치 차의 90% 신뢰구간이 log0.8에서 log1.250이내로서 생물학적으로 동등함을 입증하였다.

구분		비교평가항목		참고평가항목	
		AUC _{0-12hr} (ng · hr/mL)	C _{max} (ng/mL)	T _{max} (hr)	t _{1/2} (hr)
대조약	넥시움정40밀리그램 (에스오메프라졸마그네슘) 한국아스트라제네카(주)	4342±2331	1544±541	2.00 (0.67~4.00)	1.46±0.47
시험약	에스오메프라졸마그네슘상승화물정 (주마더스제약)	4605±2641	1801±760	2.00 (0.33~6.00)	1.46±0.48
90% 신뢰구간* (기준: log 0.8 ~ log 1.25)		log 0.9290~ 1.1077	log 0.9776~ 1.2298	-	-

(AUC_{0-12hr}, C_{max}, t_{1/2}: 평균값±표준편차, T_{max}: 중앙값(범위), n=57)

AUC_{0-12hr}: 투약시간부터 최종혈중농도 정량시간 t_{1/2}까지의 혈중농도-시간곡선하면적
C_{max}: 최고혈중농도
T_{max}: 최고혈중농도 도달시간
t_{1/2}: 말단 소실 반감기

* 비교평가항목치를 로그변환한 평균치 차의 90%신뢰구간

(AUC_{0-∞}, C_{max}, t_{1/2}: 평균값±표준편차, T_{max}: 중앙값(범위), n=57)
AUC_{0-∞}: 투약시간부터 최종혈중농도 측정시간 1까지의 혈중농도-시간곡선하면적
C_{max}: 최고혈중농도
T_{max}: 최고혈중농도 도달시간
t_{1/2}: 말단 소실 반감기
* 비교평가항목치를 로그변환한 평균치 차의 90%신뢰구간

* 이 약은 (주)마더스제약 एस오메프라졸40밀리그램(एस오메프라졸마그네슘상승화물)과 동일한 원료를 사용하여 동일한 제조방법으로 전 공정을 (주)마더스제약에 위탁 제조하였음.

[포장단위] 28정(14정/Alu-Alu×2)

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[제조외국지] 케이엠에스제약(주) 경기도 수원시 영통구 신원로 236

[제조자] (주)마더스제약 경성북도 경산시 진량읍 공단6로 24길 18(원효침랑~코팅, 포장 공장)
(주)마더스제약 전라북도특별자치도 익산시 삼기면 신안로5길 38 마더스제약 제2공장
(인쇄 및 선별 공장)

본 제품은 흡습성이 우려되므로 PTP(Alu-Alu)포장 상태로 조제 및 보관하여 주시기 바랍니다.
제품 개봉 시 또는 취급 시에 포장재(용기, 케이스)에 상처를 입힐 수 있으니 주의하십시오.

- * 본 약품은 엄격한 품질검사를 통한 제품이며, 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변색, 변형 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
* 약품들을 사용하기 전에 사용자에게서 설명서를 주의 깊게 읽고하고 설명서를 약품과 함께 보관하십시오.
* 이 약은 의사 또는 치과의사의 처방에 의하여 복용(사용)할 수 있는 전문의약품입니다. 이 약의 올바른 복용(사용)법을 모르거나 이 약 및 질병에 대한 의사사항이 있는 경우 의사·약사와 상담 하시기 바랍니다.
* 약품명 용어설명 및 기타 자세한 약품 정보는 식품의약품안전처 약품통합정보시스템 (<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.
* 부작용 피해구제 신청: 한국의약품안전관리원(1644-6223)

작성년월일: 2022. 04. 19

개정년월일: 2024. 09. 02

KMS 케이엠에스제약(주)
KOREA MEDICINE STANDARD

본 약/사: 경기도 수원시 영통구 신원로 232

공정/연구소: 경기도 수원시 영통구 신원로 236

대표번호: 031)215-5456 Fax:031)215-5925

KMS090224