



[성상]

주황색의 정방형 필름코팅정

[원료약품 및 그 분량]

1정(471.35밀리그램) 중

판크레아틴 장용과립

(단백소화력으로서 3,240단위 이상, 지방소화력으로서 7,920단위 이상)(별규) 72mg

육계 가루(생규) 92mg

회향 가루(JP) 24mg

웅담 가루(생규) 15mg

정향 가루(생규) 12mg

우르스대옥시콜산(KP) 10mg

- 첨가제(타르색소) : 적색40호, 황색4호, 황색5호, 황색203호
- 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(네덜란드 또는 미국산 2~7년 건강된 소의 우유)
- 기타첨가제 : 메타규산알루미늄산화물, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이 오펜자색(85F43034), 오파드라이흰색(03B28796), 유당수화물, 이산화규소, 적색40호, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 크로스카멜로오스나트륨, 히드록시프로필셀룰로오스

[효능 · 효과]

식욕감퇴(식욕부진), 위부팽만감, 소화불량, 과식, 체할, 구역, 구토, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감

[용법 · 용량]

만 8세 이상 : 1일 3회, 1회 1정 복용

복용간격은 4시간 이상으로 하십시오.

[사용상의 주의사항]

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것
 - 만 7세 이하의 어린이
 - 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
 - 다른 약물을 복용하고 있는 사람
 - 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

- 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여할 것.
- 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 상당시 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
 - 어린이 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여할 것.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것.
 - 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[사용기간]

제조일로부터 36개월

[포장단위]

10정/PTP

[저장방법]

밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

- ※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 펼친 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질 · 변패 · 오염되거나 손상된 제품은 약국개설자 또는 의약품판매업자에 한하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회에서 고시한 "소비자 분쟁해결기준"에 의거, 정당한 소비자피해에 대해 보상해 드립니다.
- ※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- ※ 첨부문서 최종 개정연월일(2019.07.26)이후 변경된 내용은 식물의약품안전처 온라인 의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 제품의 사용기한은 외부 포장에 표기되어 있습니다.
- ※ 부작용보고 및 피해구제신청 : 한국약물관리안전관리원(1644-6223)

[제조 · 판매자]



일양약품주식회사

경기도 용인시 기흥구 하갈로 110
 소비자상담실 : 080-021-1010(수신자요금무담전화)
 학술상담실 : 02-570-3888 홈페이지 www.ilyang.co.kr